



23,414 / 5

Larp



PRAXEOS MEDICAE VNIVERSAE PRAECEPTA



AVCTORE

IOSEPHO FRANK

AVGVSTISSIMO IMPERATORI ET TOTIVS ROSSIAE AVTOCRATORI
A CONSILIIIS COLLEGIORVM, EQVITE ORD. ST. WLODIMIR IV.
CLASS. THERAPIAE SPECIALIS ET CLINICES IN CAESAREA VNI-
VERSITATE VILNENSI PROFESSORE, AC SEMINARII MEDICI IM-
PERATORIS MVNIFICENTIA CONDITI PRAEFFECTO, CONSILII ME-
DICI PETROPOLITANI ET CAESAREAE ACADEMIAE MEDICO-
CHIRVRGICAE, SOCIETATVM PHILANTHROPICAE PETROPOLITA-
NAE, NATVRAE SCRVTATORVM MOSQVENSIS, MEDICORVM ET
BENEFICORVM VILNENSIS, ACADEMIAE MEDICORVM VENETAE,
SOCIETATIS AGRICVLTVRAE STUDIOSORVM FLORENTINAE, SCIEN-
TIARVM ET ARTIVM ARGENTORATENSIS, ACADEMIAE MEDICAE,
SOCIETATVM GALVANICAE ET MEDICAE PARISIN. R. IENNERIA-
NAE, MEDICORVM ET NOSOCOMII A GVYO LONDINI DENOMINA-
TAE, ORDINIS MEDICO-CHIRVRGORVM LVCCENSIS, SOCIETATIS
PHYSICO-MEDICAE ERLANGENSIS, MEDICAE MARSILIANAE
ETC. ETC. SODALI.

PARTIS PRIMAE VOLV MEN SECVNDVM,

CONTINENS


DOCTRINAM DE MORBIS CVTIS.

LIPSI AE

SVMP TIBVS BIBLIOPOLII KUEHNIANI

CICIDCCCXV





CONSPECTUS

RERUM, PARTIS I. VOL. I. ET II. HUIUS OPERIS PERTRACTARUM.

Vol. I.

PROLEGOMENA.

- §. I. Praxeos medicae doctrinae definitio 1.
utilitas 2.
difficultas 3.
historia 4. p. XIII.
seq.
- §. II. Medicinae origo 1.
Medicina Aegypti et
Graeciae 2.
Hippocrates 3.
Dogmatici 4.
Empirici 5.
Asclepiades 6. p. XV—
XVII.
- §. III. Methodici 1.
Pneumatici 2.
Eclectici 3.
Theosophi 4.
Schola Alexandrina 5.
Secula barbara 6.
p. XVII—XIX.
- §. IV. Arabes 1.
Schola Salernitana 2.
Seculum XIII 3.
XIV 4.
XV 5.
p. XIX—XXII.
- §. V. Scholae Hippocraticae sec. XV. et initio seq. 1.
Anatomia 2.
Conciliatores 3. p. XXII
—XXVI.
- §. VI. Paracelsus 1.
Medium et finis seculi
XVII 2.
Van Helmont 3.
Jatro-chemici 4.
p. XXVI—XXIX.
- §. VII. Jatro-mathematici 1.
Newtoni principia medicinae adaptata 2.
Boerhaave 3. p. XXIX—
XXXI.
- §. VIII. Medicina dynamica. Stahl 1.
Fr. Hoffmann 2.
Conciliatores 3.
Cullen 4.
Brown 5.
Darwin 6.
Novi jatro-chemici,
philosophi etc. 7.
p. XXXI—XXXII.
§. IX.

- §. IX. Sydenham. 1.
 Baglivi. 2.
 Auctores descriptionum
 epidemicar. 3.
 topographiar. medi-
 car. 4.
 de morbis aetatum 5.
 sexuum. 6.
 monographiarum. 7.
 de usu remedior. car-
 din. 8.
 Collectiones observatio-
 num. 9.
 Scriptores de anatomia
 patholog. 10.
 compendiorum. 11.
 repertiorum. 12.
 p. XXXIX—LXI.

- §. X. Tractandi ratio au-
 ctoris. 1.
 Philosophia. 2.
 Chemia. 3.
 Mathesis? 4.
 Solidum vivum? 5.
 Observatio. Experien-
 tia. 6.
 Conclusio. 7. p. LXII—
 LXV.

- §. XI. Symptomatum ob-
 servatio. 1.
 Autopsia cadaverum. 2.
 Causarum indagatio. 3.
 Diagnos. 4.
 An semiotica aut aetio-
 logia ad diagnosin in-
 stituend. magis inser-
 viant? 5.
 Distinctio morborum.
 6.
 Quomodo de indole
 morbor. judicandum?
 7. p. LXVI—LXXI.

- §. XII. Diathesis inflam-
 matoria. 1.
 rheumatica. 2.
 gastrica. 3.
 arthritica. 4.
 atonica. 5.
 scorbutica. 6.
 typhodes. 7.

- spasmodica. 8.
 scrophulosa. 9.
 carcinomatica. 10.
 venerea. 11.
 Aliae diatheses. 12.
 p. LXXI—LXXIX.

- §. XIII. De complicatio-
 ne diathesium. 1.
 Doctrinae dignitas. 2.
 Duo complicationum ge-
 nera; realis et appa-
 rens. 3.
 Complicatio apparens in
 realem transire potest.
 4.
 An diatheses oppositae
 indolis complicari
 possint? 5. p. LXXX—
 LXXXII.

- §. XIV. Nosologia. 1.
 Ejus utilitas. 2.
 defectus. 3. p. LXXXII
 seq.

- §. XV. Prognosis. 1.
 Ejus fontes. 2.
 De morborum succes-
 sionibus. 3.
 Cautelae. 4.
 De prognosi in morb.
 acutis. 5.
 Crises. 6.
 De prognosi in morb.
 chron. 7. p. LXXXII—
 XC.

- §. XVI. Therapiae divi-
 sio. 1.
 Prophylactica. 2.
 Cardines praecipui pro-
 phylacticae. 3.
 Cura praeservativa. 4.
 — morbi. 5.
 Medicina expectatrix. 6.
 — — activa. 7.
 Sola experientia limites
 hic determinat. 8.
 Indicatio ex diagnosi.
 9.
 — — laedent. et ju-
 vant. 10.

Auxilia

Auxilia empirica. 11.

— nova. 12.

Remediorum actio. 13.

— — consociatio,
administratio. 14.

Régimen diaeteticum,
15.

Convalescentiae cura.
16.

Medicina fucata. 17.

Morientium cura. 18.

Superstitum cura. 19.

p. XC—XCV.

CAPUT I.

*De febribus in gene-
nere.*

*De argumento genera-
tim.* §. XVII.

Febris indicia. 1.

doctrinae momentum.

2.

scriptores. 3. p. 1—4.

Symptomata. §. XVIII.

Eorum divisio. 1.

symptomata prodroma.

— — constituenta.

3.

calor animalis. 4.

pulsus. 5.

aliae functiones lae-

sae. 6. p. 5. 6.

Causae. §. XIX.

Earum divisio. 1.

causae praedisponentes.

2.

— excitantes. 3.

causa proxima. 4. p. 7.

Diagnosis. §. XX.

signa diagnostica. 1.

divisio febr. in primar.
et secundar. 2.

— — — intermitt.

et contin. 3.

divisionis hujus neces-
sitas. 4. p. 7. 8.

CAP. II.

*De febribus inter-
mittentibus.*

*De argumento genera-
tim.* §. XXI.

definitio. 1.

doctrinae momentum. 2.

scriptores. 3.

tractationis ordo. 4.

p. 9 seq.

*Febres intermittentes
evidentes.* §. XXII.

definitio, periodus, sta-
dia. 1.

stadium frigoris. 2.

caloris. 3.

sudoris. 4.

apyrexiae. 5.

anomaliae. 6. p. 10—14.

*Febres intermittentes
larvatae.* §. XXIII.

definitio. 1.

febris subcontinua. 2.

aliae larvatae. 4. p. 14. 15.

*Febres intermittentes
benignae et perni-
ciosae.* §. XXIV.

divisio. 1.

de febr. interm. perni-
ciosis in specie. 2.

p. 16 seq.

*Febres intermittentes
regulares et irregu-
lares.* §. XXV.

febres intermitt. in re-
gul. et irregular. di-
viduntur. 1.

febres interm. regul. 2.

p. 17—20.

Autopsia

Autopsia cadaverum.

§. XXVI. p. 20.

Causae. §. XXVII.

paludosae exhalationes.

1.

quomodo febres

intermittentes

produc. 2.

an ob oxygenis de-

fectum? 3.

an ob humidita-

tem? 4.

an ob effluvium

specificum? 5-

miasma. 6.

eius differentia a

contagio. 7.

quando paludes

praecipue fe-

bres intermitt.

generant. 8.

aliae causae. 9.

causa proxima. 10. p. 21

— 28.

Diagnosis. §. XXVIII.

februm intermitt. evi-

dent. 1.

febres interm. a febr. se-

cundar. quibusd. di-

stinguuntur. 2.

diagnosis febr. subcon-

tin. 3.

aliar. febr. lar-

vat. 4.

febr. intermitt.

apud infan-

tes. 5.

febr. interm. be-

nign. et per-

nicios. 6.

typorum in ge-

nere. 7.

febr. quotidian.

8.

— tertianae.

9.

— quartanae.

10.

— quintanae.

11.

indolis morbi.

12.

febr. interm.

simpl. 13.

— — inflam-

mat. 14.

— — rheum.

15.

— — gastri-

cae. 16.

p. 28—43.

Prognosis. §. XXIX.

in genere 1.

prognosis stadiorum. 2.

febr. intermitt.

pernicios. 3.

typorum. 4.

febr. intermitt.

simpl. et

complic. 5.

p. 43—48.

Cura. §. XXX.

prophylactica. 1.

curae divisio. 2.

cura imminent. paroxys-

mi. 3.

stadii frigoris. 4.

— caloris. 6.

— sudoris. 6.

parox. febr. interm.

larv. 7.

— — inflam-

mat. 8.

— — rheum.

9.

— — gastric.

10.

— — simpl.

11.

cinchona off. 11.

ejus species. 12.

— administrandae

tempus. 14.

— — — forma.

15.

ejus dosis etc. 16.

— correctiva. 17.

— praeparata. 18.

— administr. ra-

tio

CONSPECTUS.

v

tio in infantib.

19. 20.

— surrogata in
genere. 21.

radices variae. 22.

herb. nonnullae. 23.

cortices varii. 24.

flores. 25.

semina, fructus. 26.

narcotica, excitantia.

27.

urias ammoniac. 28.

antimonium. 29.

mar. 30.

mercurius. 31.

arsenicum. 32.

gelatina. 33.

remedia externa. 34.

— alia. 35.

diaeta. 36. p. 49—8r.

Recidivae et sequelae.

§. XXXI.

recidivae periculum. 1.

quomodo evitandae. 2.

cura recidivae. 3.

revocatio febris interm.
intempestive sanatae.

4.

sequelae in genere. 5.

lien. tumor. 6.

hepatis obstructio.

7.

oedema pedum. 8.

arthrit. 9.

dyspepsia. 10.

aton. 11.

mania. 12. p. 81—

88.

CAP. III.

De febribus continuis in genere.

De argumento generalit. §. XXXII.

definitio. 1.

doctrinae dignitas. 2.

scriptores. 3. p. 89.

Decursus morbi. §. XXXIII.

invasio. 1.

cruditas, coctio. 2.

remissio, exacerbatio.

3. 4.

exacerbationes accidentales. 5. p. 90 seq.

Causae et Diagnosi.

§. XXXIV.

causae praedispon. et

excitant. 1.

causa proxima. 2.

diagnosi. 3.

divisio. 4.

p. 91—93.

CAP. IV.

De febribus typhoidibus.

De argumento in genere. §. XXXV.

definitio. 1.

divisio. 2.

rerum ordo. 3.

februm typhod. acutissim. divisio. 4.

p. 93 seq.

De peste.

De argumento in genere. §. XXXVI.

definitio. 1.

historia. 2.

scriptores. 3.

Symptomata. §. XXXVII.

in genere. 1.

bubo. 2.

anthrax. 3.

carbunculus. 4.

observationes. 5.

autopsia cadaverum. 6.

p. 97—100.

Causae.

Causae. §. XXXVIII.

- opinionēs variae. 1.
 contagiū. 2.
 observatio. 3.
 facta varia. 4.
 natura contagi et leges
 propagationis. 5.
 causa proxima. 6. p. 100
 — 108.

Diagnosis. §. XXXIX.

- illius difficultas. 1.
 differentia bubonis et
 anthracis pestil. 2.
 diagnosis e causae in-
 dagatione instir. 3.
 indoles morbi. 4. p. 108
 — 111.

Prognosis. §. XL.

- in genere. 1.
 semionica. 2.
 observationes. 3. p. 111
 — 114.

De febre sudatoria
Britannica.

Historia. Symptomata.

§. XLI. p. 115 seq.

Causa. Prognosis. §.
 XLII. p. 116.

De febre flava Ame-
ricanorum.

De argumento genera-
tiv. §. XLIII.

- historia. 1.
 scriptores. 2. p. 117 seq.

Symptomata. Causae.
 §. XLIV.

- symptomatum enumera-
 tio. 1.
 autopsia cadaverum. 2.
 causa in contagio. 3.
 p. 118 — 121.

Diagnosis. Prognosis.

§. XLV. p. 121 seq.

De hemitritaeo Da-
ciae.

Notio. Symptomata.

§. XLVI.

- autopsia cadaver. 3.
 p. 122 — 125.

*Causae. Diagnosis.**Prognosis.* §. XLVII.

- causae. 1.
 diagnosis. 2.
 distinctio hemitritaei
 ab aliis morbis. 3.
 prognosis. 4. p. 125 seq.

De febre typhode
acuta.

De argumento genera-
tiv. §. XLVIII.

- notio. 1.
 scriptores. 2.
 ordo rerum. 3. p. 127 seq.

Symptomata. §. XLIX.

- curriculum morbi. 1.
 nervorum turbac. 2.
 vasorum sanguiferor.
 turbac. 3.
 cutis condition. 4.
 oris — — 5.
 vocis — — 6.
 abdominis — 7.
 vesicae urinar. — 8.
 convalescentia et morbi
 reliquiae. 9.
 autopsia cadaverum. 10.
 p. 128 — 137.

Causae. §. L.

- in genere. 1.
 aer. 2.
 alimenta. 3.
 animi pathemata. 4.
 motus

motus corporis. 5.
 observationes. 6.
 contagium. 7.
 observationes gener. 8.
 — — special. 9.
 causa proxima in gen.
 10.
 putredo humor. 11.
 asthenia. 12.
 defectus oxygenii. 13.
 conclusio. 14. p. 138 —
 149.

Diagnosis. §. LI.
 generatim. 1.
 virium jactura. 2.
 febris conditio. 3.
 nervorum turbae. 4.
 peticulae, miliaria, pa-
 rotis. 5.
 conclusio. 6.
 affinitas c. aliis diathe-
 sibus. 7.
 typhus c. aliis morbis
 confundi potest. 8.
 typhi varietates. 9.
 an differentia inter fe-
 brem nervosam et
 putridam? 10.
 complicatio inflammato-
 ria. 11.
 rheumati-
 ca. 12.
 gastrica. 13.
 verminosa.
 14. p. 149
 — 157

Prognosis. §. LII.
 in genere. 1.
 signa mala. 2.
 — bona. 3.
 dies horaque mortis. 4.
 p. 157 — 160.

De febre typhode
 lenta.

*Definitio. Scriptores. Sympto-
 mata.* §. LIII. p. 160 — 163.

Causa. Diagnosis. Prognosis. §. LIV. p. 163 —
 166.

Cura. §. LV.
 prophylactica in gene-
 re. 1.
 antidota. 2.
 regimen febris pestilent.
 et typhi. 3.
 cura invasionis. 4.
 — morbi in genere.
 5.
 regimen in genere. 6.
 atmosphaerae
 status, atque
 temperatura
 7.
 adpersio frigi-
 da. 8.
 cubiculum, le-
 ctus. 9.
 potus. 10.
 cibi. 11.
 animus. 12.

methodus expectatrix.
 13.
 nitrum. 14.
 acida. 15.
 digitalis. 16.
 arnica, valeriana, ange-
 lica, serpentar. etc.
 17.
 vesicatoria, sinapismi.
 18.
 camphora. 19.
 moschus. 20.
 assa foetida. 21.
 castoreum. 22.
 spiritus cornu cervi. 23.
 aether. 24.
 opium. 25.
 phosphorus. 26.
 frictiones. 27.
 cinchona. 28.
 mercurius. 29.
 observatio. 30.
 complicatio inflamma-
 tor. 31.
 rheumatica. 32.
 gastrica

gastrica. 33.
 verminosa. 34.
 symptomata. 45.
 vigiliae. 35.
 sopor. 37.
 delirium. 38.
 convulsiones.
 39.
 haemorrhagiae.
 40.
 bubo pestilentialis. 41.
 carbunculus et
 anthrax. 42.
 parotis. 43.
 decubitus. 44.
 vomitus. 45.
 diarrhoea. 46.
 alvi obstructio.
 47.
 meteorismus.
 48.
 retentio urinae.
 49. p. 166 —
 214.

Cura convalescentiae. §. LVI.

recidiva. 1.
 regimen. 2.
 dyspepsia. 3.
 debilitas. 4.
 sensuum imbecillitas. 5.
 pectoris affectio. 6.
 ulcerum sanatio. 7.
 crinium resectio. 8. p. 214
 — 218.

CAP. V.

De febribus gastricis.

De argumento in genere.
 §. LVII.

definitio. 1.
 divisio. 2.
 rerum ordo. 3. p. 219.

De febre gastrica primaria e repletione. §. LVIII.

symptomata. 1.
 diagnosi. 2.
 prognosis. 3.
 cura. 4. p. 219 — 222.

De febre gastrica ex alimentis pravae indolis. §. LIX.

observatio. 1.
 fungi. 2.
 mytili. 3.
 pisces. 4.
 caro animalium morbis
 enecatorum. 5.
 prophylactica. 6.
 cura. 7. p. 222 — 229.

De febre gastrica secundaria generatim, et in specie de febre biliosa. §. LX.

de febre gastrica secundaria generatim. 1.
 scriptores de febre biliosa. 2.
 ejusdem symptomata. 3.
 autopsia cadaveris. 4.
 causae excitantes. 5.
 causa proxima. 6.
 diagnosi. 7.
 fallacia symptomatum.
 8.
 distinctio ab aliis morbis. 9.
 febris biliosa simplex.
 10.

inflammat. 11.
 rheumat. 12.
 typhodes. 13.

observatio. 14.
 prognosis. 15.
 cura generatim. 16.
 — febr. bilios. simplic. 17.

inflammat. 18.
 rheumat. 19.
 typhod. 20. p. 229
 — 242.

De febre

De febre pituitosa.

§. LXI.

- scriptores. 1.
- symptomata. 2.
- autopsia cadaveris. 3.
- causae. 4.
- diagnosis. 5.
- prognosis. 6.
- cura. 7. p. 242—246.

De febre verminosa.

§. LXII.

- notio. 1.
- symptomata. 2.
- causae. 3.
- diagnosis. 4.
- prognosis. 5.
- cura. 6. p. 247—252.

C A P. VI.

De febribus rheumaticis et catarrhalibus.

De argumento generatim.
§. LXIII.

- introductio. 1.
- rerum tractand. ordo. 2. p. 253.

De febre rheumatica.

§. LXIV.

- definitio. 1.
- historia. 2.
- symptomata. 3.
- causae. 4.
- diagnosis. 5.
- prognosis. 6. p. 253—258.

De febre catarrhali.

§. LXV.

- definitio. 1.
- historia. 2.
- symptomata. 3.
- autopsia cadaverum. 4.

causae. 5.

diagnosis. 6.

de febre catarrhali sim-

plic. 7.

inflammat. 8.

gastric. 9.

typhod. 10.

prognosis. 11. p. 258—266.

De cura febrium rheumaticar.

et catarrhalium. §. LXVI.

prophylaxis. 1.

cura morbi simplicis. 2.

inflammatorii.

3.

gastrici. 4.

typhodis. 5.

convalescentiae. 6. p. 266—274.

De febre catarrhali infantum.

§. LXVIII.

notio. 1.

symptomata. 2.

causae. 3.

diagnosis. 4.

prognosis. 5.

cura. 6. p. 274—277.

C A P. VII.

De febribus inflammatoriis.

De argumento generatim.

§. LXVIII.

definitio. 1.

notio. 2.

p. 278.

Symptomata. §. LXIX.

prodroma. 1.

constitutiva. 2. p. 279 seq.

Caussae. §. LXX.

praedisponentes. 1.

excitantes. 2.

proxima. 3. p. 280—282.

Diagnosis

CONSPECTUS.

Diagnosis. §. LXXI.

signa gentilitia. 1.
causarum examen. 2.
morbi, quibuscum con-
fundi potest. 3.
complicationes. 4. p. 282
— 284.

Prognosis. §. LXXII.

generatim.
reliquiae: metastases. 2.
morbus neglectus. 3.
p. 284 seq.

Cura. §. LXXIII.

prophylaxis. 1.
cura invasionis. 2.
regimen. 3.
pharmaca. 4.
venae sectio. 5.
acida. 6.
diapnoica. 7.
cura metastaseos. 8.
— convalescentiae. 9.
p. 286—289.

Appendix.

De inflammatio- nibus in genere.

De argumento generatim. §. LXXIV.

observatio. 1.
doctrinae momentum.
2.
scriptores. 3. p. 290.

Symptomata. §. LXXV.

inflammationis indicia.
1.
rubor. 2.
calor. 3.
tumor. 4.
dolor. 5.
secretio perturbata. 6.
pseudomembranae. 7.
p. 291—292.

Causae. §. LXXVI.

praedisponentes. 1.
excitantes. 2.
proxima. 3. p. 293 seq.

Diagnosis. §. LXXVII.

generatim. 1.
divisio. 2.
inflammatio localis. 3.
universalis. 4.
observatio. 5.
inflammatio ex diathesi
inflammatoria. 6.
rheumatica.
7.
gastrica. 8.
typhode. 9.
atonica. 10.
periodica. 11.
scrophulosa.
12.
scorbutica.
13.
arthritica.
14.
carcinomati-
ca. 15.
venerea. 16.
complicatio inflamma-
tionum. 17. p. 294—300.

Prognosis. §. LXXVIII.

generatim. 1.
resolutio. 2.
— — perfecta. 3.
— — imperfecta. 4.
hydrops acutus. 5.
suppuratio. 6.
febris hectica. 7.
de pure generatim. 8.
origo puris. 9.
indoles — 10.
exulceratio. 11.
gangraena. 12. p. 300 —
309.

Cura

Cura. §. LXXIX.

generatim. 1.

cura inflamm. localis.

2.

symptomat. 3.

exitum. 4.

febris hecticae. 5.

p. 309—313.

VOL. II.

DE MORBIS CUTIS.

CAP. I.

De morbis cutis in genere.

De argumento generatim. §. I.

Cutis consideratio. 1.

Scriptores. 2.

Docirinae difficultas. 3.

Ordo rerum. 4. p. 1—10.

Symptomata. Autopsia ca-

daver. Analysis chemica,

§. II.

In genere. 1.

Stigma. 2.

Macula. 3.

Furfur. 4.

Squama. 5.

Crusta. 6.

Papula. 7.

Taberculum s. phyma.

8.

Vesica. 9.

Phlyctaena. 10.

Pustula. 11.

Pruritus. 12.

Cadaverum autopsia. 13.

Analysis chemica. 14.

p. 10—13.

Caussae. §. III.

Generatim. 1. 2.

Aetas. 3.

Sexus. 4.

Constitutio corporis. 5.

Clima. 6.

Vestes. 7.

Immundities. 8.

Opificia. 9.

Insecta. 10.

Vermes. 11.

Vegetabilia. 12.

Contagia. 13.

Pharmaca et venena. 14.

Alimenta. 15.

Sanguis. 16.

Transpiratio. 17.

Urina. 18.

Bilis. 19.

Semen. 20.

Menstrua. 21.

Lochia. 22.

Lac. 23.

Adeps. 24.

Antici pathemata. 25.

Motus et vigiliae. 26.

Connubium plurium

caussarum. 27.

Caussa proxima. 28.

p. 13—22.

Diagnosis

Diagnosis. §. IV.

Generatim. 1.
Diagn. formae in uni-
versum. 2.

— indolis — — 3.

Exanthematum divisio.
4.

Exanthemata sympto-
matica. 5.

— — primaria. 6.

Stadia varia. 7.

Stadium latentis conta-
gii. 8.

invasionis. 9.

eruptionis. 10.

efflorescentiae.

11.

desquamationis.

12.

suppurationis.

13.

exsiccationis.

14.

Convalescentia. 15.

Indoles exanthemat. pri-
marior. 16.

Exanthemata primaria
simplicia. 17.

Complicatio inflamma-
toria. 18.

gastrica. 19.

typhodes. 20.

Observatio. 21.

Impetiginum divisio. 22.

Impetigines primariae.

23.

secundariae. 24.

inflammatoriae.

25.

gastricae. 26.

arthriticae. 27.

carcinomaticae.

28.

scrophulosae.

29.

scorbuticae. 30.

venereae. 31.

spasmodicae. 32.

Observationes. 33.

p. 23—38.

Prognosis. §. V.

Exanthematum sympto-
maticor. 1.

primarior. 2.

Impetiginum primarior.

3.

secundariar. 4.

p. 39—43.

Cura. §. VI.

Generatim. 1.

Ars cosmetica. 2.

Prophylactica. 3. 4. 5.

Exanthematum sympto-
maticor. 6.

primariorum. 7.

primar. simplic. 8.

inflammat. 9.

gastricor. 10.

typhodum. 11.

Monitum. 12.

Retropulsorum exanthe-
mat. 13.

Convalescentiae 14..

Impetiginum in genere.

13.

localium. 16.

per manum chirur-
gicam. 17.

remedia abstergen-
tia. 18.

res insectis contra-
riae. 19.

remedia emollien-
tia. 20.

irritantia. 21.

adstringentia.

22.

narcoctica. 23.

caustica. 24.

Impetiginum sympto-
maticar. 25.

inflammatoriar.

26.

gastricarum. 27.

arthriticarum.

28.

carcinomaticar.

29.

scrophulosar.

30.

scorbu-

scorbuticar. 31.
venerear. 32.
spasmodicar. 33.
c. aliis morb.
complicata-
rum. 34.
retrogressarum.
35. p. 43
— 66.

CAP. II.

De peticulis.

Definitio. 1. *Historia.* 2.
§. VII. p. 67—70.
Symptomata. 1. *Autopsia*
cadaverum. §. VIII.
p. 70—74.

Causae. §. IX.
Praedisponentes. 1.
Excitantes. 2.
Proxima. 3. p. 74 seq.

Diagnosis. §. X.
Facilis confusio. 1.
Distinctio a morsibus
pulicum. 2.
Peticulae sunt exanthe-
ma symptomaticum. 3.
in febribus inter-
mitt. 4.
typhodibus. 5.
gastricis. 6.
aliis morbis. 7.
p. 76—79.

Prognosis. Cura. §. XI.
p. 79—82.

CAP. III.

De miliaribus.

Definitio. Historia. §. XII.
p. 82—84.
Symptomata. Autopsia ca-
daverum. §. XIII.
p. 84—88.

Causae. §. XIV.
praedisponentes. 1.
excitantes. 2.
proxima. 3. p. 88—90.

Diagnosis. §. XV.
facilis confusio. 1.
complicatio c. peticulis.
3.
exanthema interd. sym-
ptomatic. 4.
in febribus intermitt.

5.
typhodibus. 6.
gastricis. 7.
catarrhalibus. 8.
p. 90—92.

Prognosis. Cura. §. XVI.
p. 93—96.

CAP. IV.

De bullis.

Definitio. Historia. §. XVII.
p. 97 seq.

Symptomata. Causae.
§. XVIII. p. 99—
102.

Diagnosis. §. XIX.
facilis confusio. 1.
distinctio a vesicis ac-
cident. 2.
a miliaribus. 3.
interdum symptomaticae. 4.

in febribus inter-
mitt. 5.
typhodibus. 6.
gastricis. 7.
arthritide. 8.
peripneumonia.
9.
dysenteriiis. 10.
p. 102—105.

Prognosis. Cura. §. XX.
p. 105 seq.

CAP. VI.

CAP. V.

De urticaria.

Definitio. Historia. §. XXI.
p. 106 seq.

Symptomata. Causae.
§. XXII. p. 108 —
110.

Diagnosis. §. XXIII.
facilis confusio. 1.
distinctio a maculis,
tubercul. etc. 2.
miliar. rubris. 3.
interdum symptomati-
ca. 4.
in febr. intermitt.
5.
rheumatic. 6.
gastricis. 7.
typhodibus. 8.
p. 110 — 114.

Prognosis. Cura. §. XXIV.
p. 115.

CAP. VI.

De erysipellate.

Definitio. Historia. Sedes.
§. XXV. p. 116 seq.

*Symptomata. Autopsia cada-
verum.* §. XXVI.

in genere. 1.
erysipelas universale. 2.
faciei. 3.
trunci et recens
nator. 4.
extremitatum.
6.
intertum. 6.

Autopsia cadaverum. 7.

Causae. §. XXVII.

Divisio. 1.
locales. 2.

universales sunt aut
praedispon. 3. 4.
excitant. 5.
proxima. 6. p. 125 — 127.

Diagnosis. §. XXVIII.
facilis confusio. 1.
distinctio a bullis. 2.
ab urticaria. 3.
indoles varia. 4.
locale. 5.
rheumaticum.
6.
inflammatori-
um. 7.
gastricum. 8.
typhodes. 9.
recens nator. 10.
arthriticum. 11.
scorbuticum.
12.
carcinom. et le-
pros. 13. p. 127
— 133.

Prognosis. §. XXIX.

generatim. 1.
exitus. 2.
resolutio. 3.
oedema. 4.
induratio. 5.
suppuratio. 6.
exulceratio. 7.
gangraena. 8. p. 133 —
137.

Cura. §. XXX.

erysipelatis localis. 1.
rheumatici. 2.
inflammatorii.
3.
gastrici. 4.
typhodis. 5.
arthritici. 6.
scorbutici. 7.
convalescentiae. 8.
exituum. 9.

p. 137 — 144.

CAP. VII.

CAP. VII.

De furunculo.

Definitio. Historia. § XXXI.
p. 144.

Symptomata. *Caussae.*
§. XXXII. p. 145 —
147.

Diagnosis. §. XXXIII.
facilis confusio. 1.
distinctio ab urtic. no-
dosa. 2. p. 147.

Prognosis. Cura. §. XXXIV.
p. 148 — 151.

CAP. VIII.

*De anthrace et
carbunculo.*

Definitio. Historia. §. XXXV.
p. 151 — 154.

Divis. Symptom. Autopsia
cadaverum. §. XXXVI.

Divisio. 1.
Symptomata. 2.
Autopsia symptomat. 3.
p. 154 — 157.

Caussae. §. XXXVII.
contagium epizooti-
cum. 1.
insecta. 2.
cachexia. 3. p. 158 —
160.

Diagnosis. §. XXXVIII.
facilis confusio. 1.
distinctio ab erysipel. 2.
a furunculo. 3.
differentia inter anthra-
cem et carbunculum.
4.
epinectis thermintum
quid? 5. p. 161 — 164.

Prognosis. Cura. §. XXXIX.

Prognosis. 1.
Prophylactica. 2.
Cura in genere. 3.
localis. 4.
universalis. 5.
p. 164 — 169.

CAP. IX.

De zostere.

Definitio. Historia. §. XL.
p. 169 seq.

Symptomata. Caussae. §. XLI.
p. 170 — 172.

Diagnosis. §. XLII.
Facilis confusio. 1.
Distinctio a miliaribus.
2.
a bullis. 3.
ab erysipelat. 4.
p. 173 — 175.

Prognosis. Cura. §. XLIII.
p. 176.

CAP. X.

*De exanthemate
mercuriali.*

Definitio. Historia. §. XLIV.
p. 177.

Symptomata. Caussae.
§. XLV. p. 178 — 180.

Diagnosis. §. XLVI.
Nominis ratio. 1.
Facilis confusio. 2.
Distinctio a miliaribus.
3.
ab urticaria. 4.
a zostere. 5.
p. 180 — 182.

Prognosis. Cura. §. XLVII.
p. 182 seq.
CAP. XI.

CAP. XI.

*De scarlatina.**Definitio. Historia.*§. XLVIII. p. 183—
190.*Symptomata. Autopsia cada-*
verum. §. XLIX.*Symptomata in genere.*

1. scarlat. simplic. 2.
- inflammat. 3.
- gastricae 4.
- typhodis. 5.

Autopsia cadaverum. 6.
p. 190—195.*Causae.* §. L.

- praedisponentes. 1.
- excitans. 2.
- proxima. 3.

p. 195—198.

Diagnosis. §. LI.*symptomatum illustra-*

- tio. 1.
- faucium adfectio. 2.
- febris. 3.
- eruptio cutanea. 4.
- Facilis confusio. 5.
- Distinctio a miliaribus.

6.

ab urticaria. 7.

— erysipelate. 8.

Specierum consideratio

in gen. 9.

Scarlatina simplex. 10.

inflammatoria.

11.

gastrica. 12.

typhodes. 13.

cum dentitione.

14.

p. 198—214.

Prognosis. §. LII.*Periculum.* 1.*Semiotica.* 2.*Mala residua.* 3.*Secunda infectio.* 4.

p. 214—221.

Cura. §. LIII.

prophylactica. 1.

scarl. simplicis. 2.

inflammatoriae.

3.

gastricae. 4.

typhodis. 5.

convalescentiae et reli-

quiarum. 6. p. 221—

233.

CAP. XII.

*De morbillis.**Definitio. Historia.* §. LIV.

p. 234—236.

*Symptomata. Autopsia cada-**verum.* §. LV.

sympt. morbillor. sim-

plic. 1.

inflammator. 2.

gastricor. 3.

typhodum. 4.

autopsia cadaverum. 5.

p. 236—239.

Causae. §. LVI.

praedisponentes. 1.

excitantes. 2.

proxima. 3.

p. 239—241.

Diagnosis. §. LVII.*symptomatum illustra-*
tio. 1.

animi irritabilitas. 2.

affectio catarrhalis. 3.

febris. 4.

eruptio cutanea. 5.

facilis confusio. 6.

distinctio a febre catar-

rhal. 7.

peticulis. 8.

miliaribus. 9.

urticaria.

urticaria. 10.
scarlatina. 11.

indoles varia. 12. p. 241
— 250.

Prognosis. §. LVIII.

periculum. 1.
semiotica. 2.
mala residua. 3.
secunda infectio. 4. p. 250
— 255.

Cura. §. LIX.

prophylactica. 1.
morbill. simplicium. 2.
inflammatorior.
3.
gastricor. 4.
typhodum. 5.
malorum residuorum. 6.
p. 255 — 260.

CAP. XIII.

De rubeola.

Definitio. Historia. §. LX.
p. 260.

Symptomata. Caussae.
§. LXI. p. 261 seq.

Diagnosis. §. LXII.
facilis confusio. 1.
distinctio a miliar. ru-
bris. 3.
ab urticaria pa-
pul. 3.
— exanth. me-
cur. 4.
a scarlatina. 5.
— morbillis. 6.
p. 263 — 266.

Prognosis. Cura. §. LXIII.
p. ead.

CAP. XIV.

De variolis.

Definitio. Historia.
§. LXIV. p. 266 —
629.

*Symptomata. Autopsia cada-
verum.* §. LXV.
sympt. variol. simplic.
1.
inflammator. 2.

Frank Prax. I. 2.

gastricor. 3.
typhodum. 4.

autopsia cadaverum. 5.
p. 269 — 276.

Caussae. §. LXVI.

praedisponentes. 1.
excitantes. 2.
proxima. 3.

p. 276 — 279.

Diagnosis. §. LXVII.

Symptomata invasionis.

1.
eruptio cutanea. 2.
facilis confusio. 3.
distinctio a peticulis. 4.
bullis. 3.
morbillis. 6.

complicatio c. aliis mor-
bis. 7. p. 279 — 284.

Prognosis. §. LXVIII.

periculum. 1.
semiotica. 2.
mala residua. 3.
secunda infectio. 4.
p. 284 — 289.

Prophylactica. §. LXIX.

exstirpatio. 1.
mitigatio. 2.
emptio et insitio variol.
3.
vaccinationis ratio et hi-
storia. 4.

argumenta pro 5.
contra. 6.

opinio auctoris. 7.

origo vaccinae. 8.

curriculum. 9.

observationes. 10.

vaccina spuria. 11.

observationes. 12.

insitionis opus. 13.

p. 289 — 313.

Cura. §. LXX.

regulae generales. 1.
cura variol. simplic. 2.
inflammator.

3.

gastric. 4.

typhodum. 5.

symptomatum. 6.

convalescentiae et reli-

quiar. 7. p. 314 — 323.

CAP. XV.

b

CAP. XV.

De varicella.

Definitio. Historia.
 §. LXXI. p. 324.
Symptomata. Caussae.
 §. LXXII. p. 325 seq.
Diagnosis. §. LXXIII.
 facilis confusio. 1.
 distinctio a bullis. 2.
 variolis. 3.
 p. 327 seq.
Prognosis. Cura. §. LXXIV.
 p. 328.

CAP. XVI.

De vitilagine.

Definitio. Formae. Caussae.
 §. LXXV.
 definitio. 1.
 formae: vitiligo alba.
 2.
 nigra. 3.
 caussae. 4. p. 329. 330.
Diagnosis. §. LXXVI.
 facilis confusio. 1.
 divisio. 2.
 vitiligo naevus. 3.
 leprosa. 4.
 cicatrix. 5.
 matrum. 6.
 p. 331 seq.
Prognosis. Cura. §. LXXVII.
 p. 332.

CAP. XVII.

De lentigine.

Definitio. Caussae.
 §. LXXVIII. p. 333.
Diagnosis. §. LXXIX.
 divisio. 1.
 lentigo naevus. 2.
 leprosa. 3.
 aestiva. 4.
 ab igne. 5.
 distinctio a lenticulis. 6.
 p. 334.
Prognosis. Cura. §. LXXX.
 p. 335. 336.

CAP. XVIII.

De chloasmate.

Definitio. Caussae. §. LXXXI.
 p. 337.
Diagnosis. §. LXXXII.
 divisio. 1.
 chloasma gravidar. 2.
 e cachexia. 3.
 p. 338 seq.
Prognosis. Cura. §. LXXXIII.
 p. 339 seq.

CAP. XIX.

De ecchymomate.

Definitio. Formae. Caussae.
 §. LXXXIV. p. 341.
 — 343.
Diagnosis. §. LXXXV.
 facilis confusio. 1.
 distinctio a gangraena.
 2.
 — peticulis. 3.
 ab aliis macul.
 4. p. 344. 344.
Prognosis. Cura. §. LXXXVI.
 p. 346 — 349.

CAP. XX.

De erythemate.

Definitio. Caussae.
 §. LXXXVII. p. 350.
Diagnosis. §. LXXXVIII.
 facilis confusio. 1.
 distinctio ab erysiipel. 2.
 divisio. 2.
 erythema naevus. 4.
 gutta rosea. 5.
 pernio. 6.
 solare. 7.
 intertrigo. 8.
 recens nator. 9.
 oedematodes.
 10. p. 351 —
 353.
Prognosis. Cura. §. LXXXIX.
 p. 354 — 356.

CAP. XXI.

C A P. XXI.

De porrigine.

Definitio. Formae. Caussae.

§. XC. p. 357—360.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

§. XCI. p. 360—362.

C A P. XXII.

De rhagadibus, callis, cornubus cutaneis, ichthyosi, et hystriiciasi.

Rhagades. §. XCII.

definitio. 1.

sedes. 2.

caussae. 3.

divisio. 4.

prognosis. 5.

cura. 6. p. 363—365.

Calli. §. XCIII.

definitio. 1.

sedes. 2.

caussae. 3.

divisio. 4.

prognosis. 5.

cura. 6. p. 365—368.

Cornua cutanea. Ichthyosis.

Hystriiciasis. §. XCIV.

definitiones. 1.

sedes. 2.

caussae. 3.

diagnosis. 4.

prognosis. 5.

cura. 6. p. 368—371.

C A P. XXIII.

De verruca et condylomate.

Verruca. §. XCV.

definitio. 1.

sedes. 2.

formae. 3.

caussae. 4.

diagnosis. 5.

prognosis. 6.

cura. p. 372—376.

Condyloma. §. XCVI.

definitio. 1.

sedes. 2.

formae. 3.

caussae. 4.

diagnosis. 5.

prognosis. 6.

cura. 7. p. 376—380.

C A P. XXIV.

De vitiiis unguium.

Historia. Variarum species.

§. CXVII.

historia. 1.

species variae. 2.

maculae. 3.

curvatura. 4.

fissurae. 5.

tineae. 6.

mollities. 7.

lapsus. 8.

pterygium. 9.

p. 380—382.

Caussae. 1. Diagnosis. 2.

Prognosis. 3. Cura. 4.

§. CXVIII. p. 383—385.

C A P. XXV.

De vitiiis pilorum.

Generatim. §. CXIX.

introductio. 1.

scriptores. 2.

varia vitia. 3.

color abnormis. 4.

copia abnormis. 5.

figura abnormis. 6.

peculiaris consideratio.

7.

p. 385 seq.

Canities. §. C.

definitio. 1.

symptomata. 2.

caussae. 3.

prognosis. 4.

cura. 5. p. 386 seq.

Lapsus pilorum. §. CI.

scriptores et divisio. 1.

madesis. 2.

alopecia. 3.

ophiasis. 4.

phalacroscia. 5.

caussae. 6.

diagnosis. 7.

prognosis.

prognosis. 8.

cura. 9.

p. 383—394.

CAP. XXVI.

De strophulo.

Definitio. 1. Historia. 2.

Formae. 3. Causae. 4.

§. CII. p. 394—396.

Diagnosis. §. CIII.

facilis confusio. 1.

distinctio ab erysipelate

recens nator. 2.

a morbillis. 3.

ab erythemate.

4. p. 395—397.

Prognosis. Cura. §. CIV.

p. 398.

CAP. XXVII.

De urticatione.

Definitio. 1. Historia. 2.

Symptomata. 3. Causae.

4. §. CV. p. 399 seq.

Diagnosis. 1. Prognosis. 2.

Cura. 3. §. CVI. p. 401.

CAP. XXVIII.

De hydroa.

Definitio. 1. Causae. 2.

§. CVII. p. 402.

Diagnosis. §. CVIII.

divisio. 1.

hydroa sudamen. 2.

febrile. 3.

nervosum, criticum. 4.

facilis confusio. 5.

distinctio a miliaribus. 6.

bullis. 7.

zostere. 8.

strophulo. 9.

p. 403—405.

Prognosis. 1. Cura. 2.

§. CIX. p. 406.

CAP. XXIX.

De pemphigo.

Definitio. 1. Historia. 2.

Symptomata. 3. Causae.

4. §. CX. p. 407—411.

Diagnosis. 1. Prognosis. 2. Cura. 3. §. CXI.

p. 411 seq.

CAP. XXX.

De psora, psoriasi et phthiriasi.

Psora.

Definitio. 1. Historia. 2.

Symptomata. 3. §. CXII.

p. 412—414.

Causae. §. CXIII.

praedisponentes. 1.

excitantes. 2.

Diagnosis. §. CXIV.

facilis confusio. 1.

distinctio ab hydroa. 2.

divisio. 3. p. 418 seq.

Prognosis. §. CXV.

periculum. 1.

retrocessus. 2.

psora critica. 3.

psorae salubritas. 4.

p. 419, 420.

Cura. §. CXVI.

prophylactica. 1.

cura psorae simplic. 2.

complicat. 3.

monitum. 4.

retrocessus. 5.

p. 421—427.

Psoriasi. §. CXVII.

definitio. 1.

scriptores. 2.

causae. 3.

diagnosis. 4.

prognosis. 5.

cura. 6.

p. 427—429.

Phthiriasi. §. CXVIII.

definitio. 1.

scriptores. 2.

sedes. 3.

causae. 4.

cura. 5.

p. 429—431.

CAP. XXXI.

De psydracia.

Definitio. 1. Historia. 2.

Symptomata. 3. Causae.

4. §. CXIX. p. 432 seq.

Diagnosis.

Diagnosis. §. CXX.
facilis confusio. 1.
psyræcia ab insector.
ictib. 2.
distinctio a furunculo.

3.
strophulo. 4.
ab urticatione. 5.
hydroa. 6.
a psora. 7.

divisio. 8.
psyræcia artificum. 9.
ab immunditie.
10.
thermalis. 11.
a plethora. 12.
gastrica. 13.
critica. 14.
venerea. 15.
scorbutica. 16.
vaccina. 17.

p. 433—438.
Prognosis. 1. *Cura.* 2.
§. CXXI. p. 438 seq.

CAP. XXXII.

De herpete.

Definitio. 1. *Historia.* 2.
§. CXXII. p. 440 seq.
Symptomata. *Autopsia* ca-
daverum. *Analysis* che-
mica. §. CXXIII. a.
sympt. herpet. farinosi.
1. 2.
miliaris. 3.
rodentis. 4.
autopsia cadaverum. 5.
analysis chemica. 6.

p. 442—445.
Causae. §. CXXIII. b.
praedisponentes. 1.
excitantes. 2.
proxima. 3. p. 446 seq.
Diagnosis. §. CXXIV.
generatim. 1.
similitudines herpet. fa-
rinos. 2.
miliaris. 3.
rodentis. 4.
indoles varia. 5.
herpes arthriticus. 6.

scorbuticus. 7.
syphiliticus. 8.
serophulosus. 9.
carcinomaticus.
10.

complicationes. 11.

p. 447—450.
Prognosis. §. CXXV.

salutaris. 1.
metastasis. 2.
difficultas sanationis. 3.
periculum. 4. p. 451 seq.

Cura. §. CXXVI.
generatim. 1.
remedia interna. 2.
externa. 3.
connubium remed. in-
tern. et externor. 4.
p. 452—460.

CAP. XXXIII.

De tineæ.

Definitio. *Historia.*
§. CXXVII. p. 460 seq.
Symptomata. *Autopsia* cada-
verum. *Analysis* che-
mica. §. CXXVIII.
symptomat. in genere.
1.
tin. cap. benignae.
2.
— malignae. 3.
faciei benign. 4.
— malign. 5.
autopsia cadaverum. 6.
analysis chemica. 7.
p. 461—465.

Causae. §. CXXIX.
praedisponentes. 1.
excitantes. 2.
proxima. 3. p. 465 seq.
Diagnosis. §. CXXX.
facilis confusio. 1.
distinctio a strophulo. 3.
ab hydroa. 3.
— herpete. 4.
indoles tineæ. 5.

p. 466 seq.
Prognosis. §. CXXXI.
periculum. 1.

retro-

retrocessus. 2.
 semiotica. 3. p. 468 seq.
Cura. §. CXXXII.
 prophylactica. 1.
 cura tineae capitis. 2.
 faciei. 3. p. 469—
 475.

CAP. XXXIV.

De lepra.

Definitio. *Divisio.* *Variae*
species. *Autopsia cadave-*
rum. §. CXXXIII.
definitio. 1.
divisio. 2.
variae species. v. c.
lepra alba. 3.

squamosa. 4.
 elephantiasis. 5.
 partialis. 6.

autopsia cadaverum. 7.
 p. 476—489.

Causae. §. CXXXIV.
 praedisponentes. 1.
 excitantes. 2.
 proxima. 3. p. 489—491.

Diagnosis. §. CXXXV.
 signa gentilitia. 1.
 species variae. 2.
 distinctio leprae albae
 a candore cutis albi-
 nor. 3.
 — squamosae ab ichthy-
 osi, hystriasi etc. 4.
 — elephant. a syphili-
 de. 5.
 extensio leprae. 6. p. 492
 — 494.

Prognosis. §. CXXXVI.
 an sanabilis? 1.
 mutatio unius speciei in
 alteram. 2.
 longitudo morbi. 3.

Cura. §. CXXXVII. p. 495.
 generatim. 1.
 remedia interna. 2.
 externa. 3.
 regimen diaeteticum. 4.
 p. 496—499.

CAP. XXXV.

De pellagra.

Definitio. *Historia.*
 §. CXXXVIII. p. 500
 seq.

Symptomata. *Autopsia cada-*
verum. §. CXXXIX.
 p. 502—504.

Causae. §. CXL.
 praedisponentes. 1.
 excitantes. 2.
 proxima. 3. p. 504 seq.
Diagnosis. §. CXLI.
 est species leprae. 1.
 uni Insubriae propria. 2.
 complicationes. 3. p. 506
 seq.

Prognosis. *Cura.* §. CXLII.
 p. 507 seq.

CAP. XXXVI.

De plica.

Definitio. *Historia.*
 §. CXLIII. p. 509—514.
Symptomata. *Autopsia ca-*
daverum. *Analysis che-*
mica. §. CXLIV.

generatim. 1.
 labes universalis. 2.
 evolutio plicae. 3.
 formatio — 4.
 reliquiae. 5.
 plica rec. acquisita. 6.
 autopsia cadav. 7.
 analys. chem. 8. p. 514—
 524.

Causae. §. CXLV.
 praedisponentes. 1.
 excitantes. 2.
 proxima. 3. p. 524—528.

Diagnosis. §. CXLVI.
 est species leprae. 1.
 affinitas c. pellagra. 2.
 an plica in aliis regio-
 nibus obveniat? 3.
 plica spuria. 4.
 — recondita. 5.
 plicae var. species. 6.
 complicationes 7. p. 528
 — 532.

Prognosis.

Prognosis. §. CXLVII.
 periculum. 1.
 semiotica. 2. p. 532 seq.
Cura. §. CXLVIII.
 prophylactica publica. 1.
 plicae reconditae. 2.
 recens evolutae. 3.
 senescentis. 4.
 p. 533—539.

CAP. XXXVII.

De morb. rubr. Cayennae, morbo Crimensi, Radesyge Norvegiae, Herpete Aleppi, Rosa Asturica, Yaws et Pians.

Morbus ruber Cayennae.

§. CXLIX.

definitio. 1.
 scriptores. 2.
 symptomata. 3.
 diagnosis. 4.

Morbus Crimensis. §. CL.

definitio. 1.
 scriptores. 2.
 symptomata. 3.
 caussae. 4.
 diagnosis. 5.
 prognosis. 6.

cura. 7. p. 541 seq.

Radesyge. §. CLI.

definitio. 1.
 scriptores. 2.
 symptomata. 3.
 caussae. 4.
 diagnosis. 5.
 prognosis. 6.

cura. 7. p. 542—545.

Herpes Aleppicus. §. CLII.

definitio. 1.
 scriptores. 2.
 symptomata. 3.
 caussae. 4.
 diagnosis. 5.
 prognosis. 6.

cura. 7. p. 546 seq.

Yaws. §. CLIV.

definitio. 1.
 historia. 2.

symptomata. 3.
 autopsia cadaverum. 4.
 caussa. 5.
 diagnosis. 6.
 prognosis. 7.
 cura. 8. p. 547—550.
Pians. §. CLV.
 definitio. 1.
 symptomat. 2.
 caussae. 3. p. 551—553.

CAP. XXXVIII.

De vitiis transpirationis.

De argumento in genere.

§. CLVI.

transpiratio et sudor. 1.
 insensibilis. 2.

sudor. 3.

aberrationes. 4. p. 554 seq.

Transpirationis defectus.

§. CLVII.

varia origo. 1.

observatio. 2. p. 555 seq.

Transpiratio, copia et qualitate peccans. §. CLVIII.

in genere. 1.

hyperhidrosis. 2.

varia phaenomena. 3.

autopsia cadaverum. 4.

caussae. 5.

diagnosis. 6.

prognosis. 7.

cura. 8. p. 556—566.

CAP. XXXIX.

De vitiis tactus.

Generatim. §. CLIX.

argumenti dignitas. 1.

divisio. 2.

vitia. 3. p. 566 seq.

Tactus auctus et perversus.

§. CLX.

augmentum. 1.

perversitas. 2. p. 567 seq.

Prurigo. §. CLXI.

definitio. 1.

scriptores.

scriptores. 2.
 symptomata. 2.
 causae. 4.
 diagnosis. 5.
 prognosis. 6.
 cura. 7. p. 568—576.
Tactus deletus. §. CLXII.
 generatim. 1.
 causae. 2.
 cura. 3. p. 576—578.

CAP. XL.

De polyponia.

Textus cellulosi momentum.
Definitio. Scriptores.
 §. CLXIII. p. 578 seq.
Symptomata. Autopsia cada-
verum. Analysis chemic.
 §. CLXIV.
 symptomata generatim.

I.

polyp. univers.

2.

partial. 3.

autopsia cadaverum. 4.

analysis chemica. 5.

p. 580—582.

Causae. §. CLXV.

praedisponentes. 1.

excitans. 2.

proxima. 3. p. 582 seq.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

§. CLXVI. p. 584.

CAP. XLI.

*De hydrope anasarca et oedemate.**Definitio. Scriptores.*

§. CLXVII. p. 586 seq.

Symptomata. Autopsia cada-
verum. §. CLXVIII.

symptom. hydr. ana-

sarca. 1.

oedematis cap.

2.

— — scroti.

3.

— — vul-

vae. 4.

symptom. oedematis

vagi. 5.

autopsia cadaver. 6.

p. 587—591.

Causae. §. CLXVIX.

praedisponentes. 1.

excitantes. 2.

caussa proxima. 3. p. 591

—594.

Diagnosis. §. CLXX.

facilis confusio. 1.

divisio. 2.

hydr. anasarca et oede-

ma ex atonia. 3.

— — — rheum. 4.

— — — inflamma-

tor. 5.

p. 594—596.

Prognosis. §. CLXXI.

generatim. 1.

hydr. anas. et oedema

primar. 2.

— — — secundar.

3.

p. 596 seq.

Cura. §. CLXXII.

indicationes. 1.

cura morbi atenici. 2.

rheumatici. 3.

inflammatorii.

4.

e scarlatina. 5.

empirica. 6.

chirurgica. 7.

cura oedematis capitis.

8.

scroti. 9.

vulvae. 10.

pedum. 11.

p. 597—608.

CAP. XLII.

*De emphysemate.**Definitio.* 1. *Scriptores.* 2.*Divisio.* 4. *Autopsia cada-**verum.* 5. §. CLXXIII.

dividitur in emphyse-

ma universale. 4.

— — — partiale. 5.

p. 609—611.

Causae. §. CLXXIV.

praedisponentes. 1.

excitan-

excitantes. 2.
proxima. 3. p. 611 — 614.

Diagnosis. §. CLXXV.
facilis confusio. 1.
distinctio ab hydr. ana-
sarca. 2.

— aliis tumor.
3.
— inflat. arti-
fic. 4. p. 614
seq.

Prognosis. *Prophylactica.*
Cura. §. CLXXVI.
p. 616.

Combustio spontanea.
§. CLXXVII.
notio. 1.
phaenomena. 2.
causae. 3.
cura. 4. p. 617. 618.

CAP. XLIV.

*De induratione textus
cellulosi.*

Definitio. *Scriptores.*
§. CLXXVIII. p. 619.

Symptomata. *Autopsia ca-
daverum.* §. CLXXIX.
p. 620 seq.

Causae. §. CLXXX.
praedisponentes. 1.
excitans. 2.
proxima. 3. p. 621 seq.

Diagnosis. §. CLXXXI.
generatim. 1.
distinctio ab erysipel.
rec. nat. 2.
complicationes. 3.
aliae cutis indurationes.
4. p. 623 seq.

Prognosis. *Cura.*
§. CLXXXII. p. 624.

CAP. XLV.

De rheumatismo acuto.

Definitio. *Sedes.* §. CLXXXIII.
p. 625.

Symptomata. *Autopsia ca-
daverum.* §. CLXXXIV.
rheumatismi acuti uni-
versalis. 2.

capitis. 3.
cervicis. 4.
pectoris. 5.
abdominis. 6.
dorsi. 7.
lumborum. 8.
humeri et co-
xae. 9.
extremitatum.
10.
internus. 11.
autopsia cadaverum. 12.
p. 626 — 633.

Causae. §. CLXXXV.
praedisponentes. 1.
excitantes. 2.
proxima. 3. p. 633 seq.

Diagnosis. §. CLXXXVI.
facilis confusio. 1.
distinctio a contusioni-
bus, et luxationibus.
2.

a morbo tricho-
matoso. 3.
a viscerum in-
flammationi-
bus. 4.
p. 634 seq.

Prognosis. §. CLXXXVII.
generatim. 1.
resolutio. 2.
suppuratio. 3.
hydrops acutus. 4.
rigiditas. 5.
atrophia, paralysis. 6.
gangraena. 7.
p. 635 — 637.

Cura.

Cura. § CI XXXVIII.

- antiphlogistica. 1.
- diapnoica. 2.
- remedia externa. 3.
- diuretica. 4.
- cinchona. 5.
- cura exituum. 6.

p. 638 — 640.

Hydrops articuloꝝ.
§. CLXXXIX.

definitio. 1.

historia. 2.

divisio. 3.

hydrops arti-
culoꝝ. acutus.

4.

— — chro-
nicus. 5.

autopsia cadaverum. 6.

causae. 7.

diagnosis. 8.

prognosis. 9.

cura. 10.

p. 641 — 650.

DE
MORBIS CUTIS.

THE END OF THE WORLD

CAP. I.

De morbis cutis in genere.

§. I.

De Argumento generatim.

1. **A**natomia et physiologia docent ¹⁾, *cutim simul* ^{Cutis consideratio.} *cum unguibus et pilis*, corpori humano, veluti cortex arboribus, extensum sistere indumentum; eam ad internas caveas intrare, ac vasis, tum sanguinis circulo dicatis, tum lymphaticis et glandulis varii generis, nec non conspicuis nervis abundare, atque cum singulis visceribus, praesertim autem cum pulmonibus ²⁾, ventriculo, intestinis, hepate, A 2 reni-

1) BICHAT *Abhandlung über die Häute im allgemeinen und im besondern. A. d. Franz. übersetzt von CH. FR. DÖRNER. Tübing. 1802. 8. — Recherches anatomiques sur le système cutané de l'homme. Paris 1811. — KELLIE historical and critical analysis of the functions of the skin. VIDE the Edinburgh medical and surgical Journal Vol. 2. p. 170. April 1805. — WALTHER Physiologie des Menschen. Landshut 1807. CURTII SPRENGEL Institutiones medicae. Amstelod. 1810. 8. T. II. p. 41.*

2) MECKEL Diss. pulmonum cum cute commercium etc. illustratum. Halae 1789.

renibus, vesica urinaria, partibusque genitalibus, arctissimum alere commercium et postremo non solum organum tactus continere, sed et officii exhalationis et inhalationis praeesse. Patet igitur, cutim in oeconomia animali eminentem et supra quam vetustas crediderat ³⁾, occupare locum. Atque ita non in secunda tantummodo valetudine, sed vel in morbis fere omnibus ⁴⁾.

Scriptores. 2. GRAECI mala cutis imperfecte descripserunt, si morbi integumentorum capitis, sique erysipelas et phlegmone excipiantur; ac in eo potissime peccarunt, quod diversos admodum morbos sub uno eodemque nomine comprehenderint, quodque contra ea varios unius ejusdemque morbi gradus diversis nominibus insigniverint. ROMANI, excepto CELSO ⁵⁾, Graecorum vestigia secuti sunt. ARABES praeprimis doctrinam vitiorum cutis acutorum excoluerunt, verum saepe nomina morborum praeter necessitatem multiplicarunt. Instauratis in Europa scientiis, de morbis cutis egerunt MERCURIALIS ⁶⁾, MINADO ⁷⁾ et HAFEN-

REF-

3) Quam leviter vetustas de cutis dignitate cogitaverat, testatur HIPPOCRATES in libro de ossibus et GALENUS in Commentariis ad TIMAEUM et in libro de causis morborum Cap. VI.

4) De cute ut signo in morbis lege scriptores de semiotice, in P. I. Vol. I. §. XV. 2. praesentis operis enumeratos.

5) De Medicina.

6) De morbis cutaneis. Venetiis 1572.

7) De humani corporis turpitudinibus cognoscendis et curandis L. III. Patav. 1600. fol.

REFER⁸⁾, ex quorum auctorum operibus, multa patientia munitus, irritis infinitis hypothesebus, plurimas tamen utiles medendi rationes effodit. Continet earum haud paucas liber, caeterum empiricus, TOBIAE VOGELII⁹⁾. Docte porro de morbis cutis egit TURNER¹⁰⁾; doctissime autem elegantissimus atque classicus scriptor LORRY¹¹⁾. Multum ordinis demum hanc in doctrinam introduxit SAUVAGES¹²⁾, multumque simplicitatis SWEDIAUER¹³⁾. Breviter nimis ac superficialiter, at clare et plene, eam exposuit PLENK¹⁴⁾. Hypotheses systematis CULLENII in opere JAKSONII¹⁵⁾, germanica versione plane indigno, invenies. Ita hypothesebus pathologiae humoralis abundat opus, caeterum non spernendum, RETZII¹⁶⁾. REILII

8) Πανδοχσιον αιολοδεσμεν, in quo cutis — affectus omnes traduntur. Tub. 1630. Ulm 1660.

9) Curieuse Hautdiener, vorstellend der menschlichen Haut Schönheit und Hässlichkeit. Grätz 1693.

10) Abhandlung von den Krankheiten der Haut. A. d. E. Altenburg 1766.

11) De morbis cutis tract. Par. 1777. 4. Habetur translatio germanica: Abhandlung von den Krankheiten der Haut. Leipz. 1779. 8.

12) Nosologia methodica.

13) Novum nosologiae methodicae systema. Halae 1812.

14) Lehre von den Hautkrankheiten, a. d. L. übersetzt, und mit einigen Zusätzen vermehrt von WASSERBERG. 2. Aufl. Wien 1789.

15) Dermato-Pathologie. A. d. E. Erfurt 1794. 8.

16) Des maladies de la peau. Paris 1790. 12.

systematis notam refert SCHMIDTII diligenter exaratum opusculum ¹⁷⁾. Aliis hypothesebus scatet recentissimus ingeniosi MARCUS liber ¹⁸⁾. Multa atque memoratu digna facta opus exhibet CHIARUGI ¹⁹⁾. Nullus vero ex allatis auctoribus WILLAN ²⁰⁾, virum, omni nostra laude superiorem, attingit. Operis illius pretium, doctis animadversionibus, quibus FRIESE germanicam locupletavit versionem ²¹⁾, permultum auctum est. Displicet solummodo, quod auctor thesaurum observationum suarum in angustos artificialis systematis limites coegerit. Posse enim vel intricatam morborum cutaneorum doctrinam sine hoc erroneo artis adminiculo in ipsorum tyronum usum tradi, ea J. P. FRANK epitomes pars docet, quae morbos cutis amplectitur ²²⁾. Idem testatur splendidissimum de morbis cutis opus, auctore ALIBERT ²³⁾.

Pla-

17) Cutis morbi, ex materia animalis mixtura et forma mutatis cognoscendi. Diss. inaug. Halae 1799. 4.

18) *Entwurf einer speciellen Therapie.* 3. Th. 1. Abth. Nürnberg 1812.

19) *Saggio teorico pratico sulle malattie cutanee sordide, osservate nel R. Spedale di Bonifacio di Firenze.* Firenze 1799. Habetur nova et locupletata editio. A. 1807.

20) *Description and treatement of cutaneous diseases.* Lond. 1798. Necdum ad nos continuatio hujus operis, ordinem tertium et quartum exhibens, pervenit.

21) *Die Hautkrankheiten und ihre Behandlung.* A. d. E. Breslau 1799. 4.

22) Vol. III et IV.

23) *Description des maladies de la peau observées à l'hôpital*

Placuisset modo celeberrimo viro nexum inter proprias et alienas observationes accuratius exhibere, a subtilissimis nonnullis morborum divisionibus, quae plus adspectui, quam intrinsecae rerum naturae superstruuntur, abstinere, ac majori aequitate de antecessorum laboribus judicare ²⁴). Verum, sat de generali morborum cutaneorum litteratura *)! Qui enim hanc medicinae partem vel in operibus universam praxin medicam amplectentibus ²⁵), vel in monographiis perfecerunt scriptores, hi debitum grati animi tributum in curriculo hujus libri accipiant.

3. In tanta multitudine scriptorum, nihilominus doctrina de morbis cutis magnis adhuc premittitur difficultatibus, ac valde ab eo absolutionis gradu

Doctrinae
difficultas.

pital Saint-Louis et exposition des meilleures méthodes suivies pour leur traitement. à Paris 1806. Et: Précis théorique et pratique sur les maladies de la peau. Paris 1810.

24) Nullo certe pacto intelligi potest, quomodo cl. ALIBERT, post tot tantaque clarissimorum in morbis cutis excolendis tentamina, asserere potuerit: „*J'entre dans une carrière presque déserte, où peu d'hommes ont pénétré avant moi, où aucun travail antérieur ne m'a servi de guide etc. (§. 1).* Et infra: „*J'éloigne de cet ouvrage les discussions futiles auxquelles se sont livrés mes prédécesseurs. (Des teignes. §. 1.)*

*) Necdum ad me pervenit: A practical synopsis of cutaneous diseases etc. By BATEMAN. Lond. 1813.

25) P. I. Vol. I. §. IX. 12. ac adde respectu morborum cutaneorum SENNERTUM (op. omn. T. IV.) et ETTMÜLLERUM (Op. omn. T. II. art. 7.).

gradu distat, quem aliae medicinae partes jam attingerunt. Nemo autem, nisi ipsa rerum natura, ob id criminari potest. Arduum enim vel plane impossibile foret, cohortem morborum *verbis* exacte designare, quorum haud exigua pars, pro varia mali duratione, pro varia aegrorum aetate, constitutione, pro scalptu, pro varia cutis colore, pro varia illius cura et munditie, pro vario climate, pro varia denique medendi ratione, formas ad infinitum diversas exhibere solet. *Picturis* quidem verbis succurrere praesenti aevo satagerunt; at ipse WILLAN jure meritoque fatetur, picturas nec ad varios gradus pelluciditatis pustularum, nec ad copiam et qualitatem materiae ex ulcusculis scaturientis, nec ad mutationes, quae sub decursu morbi contingunt, ostendendas, idoneas esse. Idem fere de *imaginibus* morborum cutaneorum *ceraefformatis* valet. Tyronibus igitur commendamus, ut nullam opportunitatem morbos cutis *in natura* observandi negligant ²⁶⁾).

Ordo non-
ster.

4. Mediam viam inter scriptores, qui genera morborum cutis maxime multiplicant et qui ea nimis circumscribunt, legendo, limites ab utilitate practica desumendo, certamque doctrinae bonitatem incertae illius perfectioni anteponendo, sequen-

26) Vitia cutis prae aliis morbis in clinica instituta suscipienda forent, saltem ut diagnosis instituat. Et medici juvenes itineratores in nosocomiis magna praepriis studio morborum cutaneorum incumbere deberent.

quentem eligimus ordinem. Innixi scilicet proposito nostro, confinia medicinae potius transiliendi, quam coarctandi ²⁷⁾, ad chirurgiam duntaxat *vulnera* et *ulcera* cutis primaria remittimus. Tractatum reliquorum morborum et vitiorum cutis ordinur, adspectum in universam coniiciendo rem. In ea nempe versamur opinione, In scientiis *excolendis* a factis specialibus ad generalia ascendendum, in iis vero *docendis* a generalibus ad specialia descendendum esse. Praeterea, posito sic firmo rerum tradendarum fundamento, multas in speciali doctrina evitare licet repetitiones. Hanc vero doctrinam incipimus ab efflorescentiis, quae febrium sistunt symptomata, id est, a *peticulis*, a *miliaribus*, a *bullis* et ab *urticaria*. Sic praesens ad praecedens alligamus volumen. Sequuntur tractatus *erysipelatis*, *furunculi*, *anthracis*, *carbunculi*, *zosteris* et *exanthematis mercurialis*. Huic annectitur doctrina *scarlatinae*, *morbilorum*, *rubeolae*, *variolarum* atque *varicellae*. Examinatis ita morbis cutis *acute* decurrentibus, ad deformitates et aegritudines *chronicas* systematis cutanei pervenimus, quibus adnumerantur *vitiligo*, *lentigo*, *chloasma*, *ecchymoma*, *erythema*, *porrigo*, *rhagades*, *calli*, *cornea cutanea*, *ichthyosis*, *hystriciasis*, *verrucae*, *condylomata*, *vitia unguium*, item *pilorum*, *strophulus*, *urticatio*, *hydroa*, *pemphigus*, *psora*, *psoriasis*, *phthiriasis*, *psudracia*, *herpes*, *tinea*, *lepra*, *pellagra*, *plica polonica*, *marbus ruber Cayennae*,

27) P. I. Vol. I. Praefat. p. IX.

nae et Crimeae, radesyge Norvegiae, herpes Aleppi, rosa Asturica; Yaws et Pian. Absolutâ horum morborum doctrinâ, ad alias aegritudines pervenimus quae, etiamsi cutis *colorem* non immutent, nihilominus ad morbos systematis cutanei pertinent, ad *vitia* scilicet *officii transpirationis et sensus tactus.* Quoniam vero systema cutaneum arcte cum textu celluloso subcutaneo, hic vero similiter cum musculis subjacentibus et quodammodo cum articulis cohaeret; nec harum partium morbos hic praeter-eundos esse existimavimus, unde postremo sermo fit de *polypionia*, de *anasarca*, de *emphysemate*, de *induratione telae cellulosa*, de *rheumatismo*, saltem *acuto* ²⁸⁾, et de ejusdem reliquiis.

§. II.

Symptomata. Autopsia cadaverum. Analysis chemica.

Generatim. 1. Quam multifaria sint *symptomata* deformitatum et morborum cutis, ex curriculo praesentis libri elucebit. Hic simpliciores duntaxat formas explanabimus, *terminos* sic statuendo *technicos.* His enim sive neglectis sive arbitrariò in usum deductis, tota doctrina, rite monente WICHMANNO ²⁹⁾, corrui, vel potius condi nequit.

Stigma. 2. *Stigma* est cutis punctum (purpureum, bruneum, flavum, lividum, nigrum) sine elevatione epidermidis ³⁰⁾.

3. *Ma-*

28) Rheumatismi chronici doctrina simul cum ea arthritidis traditur, Part. III. Vol. II.

29) *Ideen zur Diagnostik.* 2 Th. §. 101.

30) WILLAN op. cit. Tab. I. fig. 5.

3. *Macula* ³¹⁾ est recessio coloris consueti et *Macula*. normalis in una alterave cutis parte ³²⁾.

4. *Furfur* est parva exfoliatio epidermidis sub *Furfur*. forma, ab ipso nomine satis indicata ³³⁾.

5. *Squama* est lamina epidermidis plerumque *Squama*. inspissata, albescens, opaca ³⁴⁾.

6. *Crusta* est substantia dura, superficiem ex- *Crusta*. ternam partis exulceratae cooperiens, ac decidua, saepe iterum renascens ³⁵⁾.

7. *Papula* est minima atque acuminata pro- *Papula*. minentia sub epidermide cum basi inflammata, nullum liquidum continens, in suppurationem haud desinens, plerumque desquamatione furfuracea terminata ³⁶⁾.

8. *Tuberculum*, sive *Phyma*, est tumor durus, *Tubercu-* superficialis, circumscriptus, apice plerumque sup- lum. purans, interdum gangraenescens ³⁷⁾.

9) *Vesica* est prominentia epidermidis, magnam *Vesica*. circumferentiam exhibens, basi irregulari, fluidum serosum et pellucidum continens ³⁸⁾.

10. *Phlyc-*

31) *Macula*, veteribus dicebatur *panus* sive *pannus* (ARNOLDUS de *Villa nova*: Opp. p. 1158).

32) WILLAN l. c. fig. 8.

33) l. c. fig. 1.

34) l. c. fig. 2.

35) l. c. fig. 3.

36) l. c. fig. 6.

37) l. c. fig. 9.

38) l. c. fig. 10.

Phlyctaena. 10. *Phlyctaena* est vesicula super basi profunde rubra sive plumbei coloris ³⁹⁾.

Pustula. 11. *Pustula* est elevatio epidermidis figurae nunc globosae, nunc conicae, pus sive serum continens.

Pruritus. 12. *Pruritus* est molesta sensatio, ad scalpendum imperiose incitans.

Cadaverum autopsia. 13. *Cadaverum autopsia* hominum, ex nonnullis morbis cutaneis defunctorum, docet: eadem phaenomena, quae in variis partibus integumentorum *externorum* cernuntur, plus minus vel in membranis *internis* ac in partibus contiguis observari. Plurimi autem extant morbi cutis, praesertim chronici, quorum doctrina vel exiguum, vel nullum lucrum ab autopsia cadaverum obtinet, eo quod magna pars vitiorum cutis cum vita evanescat, et multi non directe morbis cutis, sed aliis caussis succumbant. Caeterum nisi ubique per sectiones cadaverum, saltem per examen microscopicum, hoc compertum habetur: morbos cutis pro re nata sedem figere in epidermide, in rete mucoso, in tela cellulosa et membrana adiposa, in glandulis tum lymphaticis tum sebaceis et earum ductibus excretoriis, in vasis tum sanguinis circulo dicatis, tum lymphaticis, in papillis nerveis, in unguibus, bulbis et vaginis capillorum vel, uti plerumque accidit, in plurimis partibus simul. Nihil enim a veritate magis alienum est, quam consueta nunc sedis morbosae uno eodemque in

orga-

organo, in varia, ex quibus componitur, systemata, citra visus confinia, collocatio. Maxime sub hoc respectu cl. MARCUS ⁴⁰⁾ nobis errasse videtur.

14. *Analysis chemica* nuper a cl. ALIBERT ad Analysis
chemica. morbos cutis illustrandos in auxilium ducta est. Quamvis verò parum utilitatis, pro medicina, saltem practica, inde expectandum esse censeamus, libenter tamen et huic examini subscribimus, optamusque, ut chemici hoc in opere medicis amicam porrigere velint manum. Nunquam enim facta, quaecunque demum, inutiliter colliguntur.

§. III.

C a u s s a e.

1. Non omnes sane *causae* morborum cutis Genera-
tim. notae sunt. Ad notas, sive praedisponentes, sive excitantes, pertinent: vitia haereditaria et congenita, influxus aetatis, sexus, constitutionis corporis, climatis et vestium, porro immundities, opificia, insecta, vermes, vegetabilia, contagia, venena et pharmaca, tandem alimenta quantitate aut indole peccantia; sanguinis conditio abnormis; secretio morbose transpirationis, urinae, bilis, seminis, menstruorum, lochiorum, lactis, adipis; postremo, animi pathemata ingrata, ac errores in motu et quiete, in somno et vigiliis.

2. Varia cutis conditio, varias apud gentes ⁴¹⁾ et

⁴⁰⁾ l. c. p. 35.

⁴¹⁾ BLUMENBACH de generis humani varietate nativa. Goetting. 1795. 8.

familias ⁴²⁾, abunde de influxu stirpium in systema cutaneum (praecipue in epidermidem et rete mucosum) testatur. Influxum hujusmodi sese vel ad *morbos cutis* extendere, ex pluribus praesentis libri locis elucebit. Elucebit simul, vel citra vitia *haereditaria*, defoedationes cutis dari *congenitas*.

Aetas. 3. Quaevis *aetas* ad proprias defoetationes cutis disponit. Confirmatur id magna factorum copia, a recens natis, ab infantibus, a pubertate, ab aetate media et a senio desumta. Legi de hoc argumento merentur J. P. FRANK ⁴³⁾ aut ALIBERT ⁴⁴⁾.

Sexus. 4. Quamvis cutis conditio in utroque sexu quodammodo differat ⁴⁵⁾, attamen nullus datur systematis cutanei morbus, qui *sexui* uni alterive exclusive proprius dici posset. Plurimi vero morborum cutis longe frequentius feminas invadunt, quam mares. Evirati immunitate quadam gaudere videntur ⁴⁶⁾.

5. Sunt

42) Familias novi, quarum singula individua cutim exhibebant vel planam, candidam, mollem instar panni bombycini; vel unctuosam et foedam; vel asperam et furfuribus obtectam.

43) Op. c. Vol. IV. p. 31.

44) Op. c. §. 17. — ALIBERTUM hic FRANKIUM ad verbum in suum opus transscripsit, quod ex supra dictis vix expectari potuisset!

45) ACKERMANN Diss. de discrimine sexuum praeter genitalia. Mogunt. 1788. 3.

46) Cutis quidem eviratorum citissime rugosa fit; de reliquo autem, quamvis magnum spadonum numerum

in

5. Sunt morbi cutis, qui nulli fere *constitutio*-^{Constitutio corporis.}
ni corporis parcent, sunt qui praecipue vel debiles,
 vel robustos aggrediuntur. Praeterea nonnullorum
 hominum cutis, ita constituta est, ut a quacunque
 demum caussa, sive externa, sive interna, facillime
 afficiatur 47).

6. Nemo mirabitur, *clima* magnum exserere ^{Clima,}
 imperium in morbos superficiei corporis externae,
 cum vel in morbos viscerum reconditorum influat.
 De influxu illo testantur inprimis morbi cutis *ende-*
mici, et observatio, quod sicuti eadem vegetabilia
 hoc sub coelo plantam inermem, — in illo fruti-
 cem aculeatum referunt; ita iidem morbi cutanei,
 sub vario coelo, variam induere videntur formam.
 In effectu climatis eruendo inprimis ad aërem,
 ad lucem et ad calorem respiciendum, quarum
 rerum influxum in morbis systematis cutanei ex-
 citantis plurima facta ostendunt. Interim ne cli-
 mati effectus adscribas, qui alias caussas agnoscant,
 e. c. contagia, in certas regiones bellorum et com-
 mercii ope introducta.

7. Et *vestium cultusque* ratio sibi locum in *Vestes.*
 aetiology morborum cutis vindicat. Notatu digna
 est *lepra vestium*, de qua MOSES loquitur 48). Ita usus
 in Italia cognoverim, non recorder me inter eos morbos
 cutaneos, nec exceptis variolarum foveis, observasse.

47) Constitutio psorica HUFELANDII. (*Journal der prak-*
tischen Heilkunde. 21. B. 4. St. S. 14.) Forte aptius con-
 stitutio impetiginosa vocaretur.

48) MICHAELIS *Mosaisches Recht.* 4. Th, S. 261,

Romanorum, vestes urinâ expurgandi ⁴⁹⁾. Debitis palam fiet locis, quid in morbis cutis excitan-
dis valeant pelles, lana, fucus aliaque cutis orna-
menta ⁵⁰⁾. Indusia lintea morbis cutaneis potius
obstant; interea et ea saepe contagiorum sunt ve-
hicula.

Immundit-
ies.

8. Plebs immunda praecipue morbis cutaneis
subjicitur, quod tum ex *immunditie* directe repe-
tere, tum ex eo, quod ista contagiis et insectis
cuti infensis faveat, ac transpirationi obstet ⁵¹⁾,
explicari licet. Verum nec nimiam munditiam e
catalogo caussarum morborum cutis excludendam
esse censemus ⁵²⁾.

Opificia.

9. Ob immunditiam, aliquando specificam,
nec non ob alias caussas et *opifices* haud pauci mor-
bis cutaneis subjiciuntur ⁵³⁾; exemplo sint textor-
es, sartores, homines, in fodinis carbonum fos-
silium, salis et metallorum viventes, pistores,
nautae ⁵⁴⁾, mercatores vestium antiquarum, lotri-
ces, aurigae, laniones, rustici etc.

Insecta.

10. Copia *insectorum* cuti humanae infensorum

49) PLINII Historia naturalis. L. XXVIII. 6.

50) De valetudine hominis nudi et cooperti diss. praeside
GOTTL. RICHTERO. Goetting. 1763. 4.

51) PLATER de morbis ex immunditie. In Opusc. Vol. I.

52) PLAZ Diss. de morbis ex munditie intempestiva.
Lips. 1746. 4.

53) Op. cit. P. I. Vol. I. §. IX. 7.

54) BLANE Beobachtungen über die Krankheiten der See-
leute. S. 195.

infinita est ⁵⁵), praecipue in plagis calidis humidisque ⁵⁶). Nec rara sunt exempla insectorum, casu in ulcera delatorum ⁵⁷), aut contagiis pro vehiculo in-

55) HEISE Diss. de insectorum noxio effectu in corpus humanum Halae 1757. — BUCHOZ, *histoire des insectes nuisibles à l'homme*. Paris 1784. — JOERDENS *Entomologie und Helminthologie des menschlichen Körpers*. Hof 1802.

56) Insecta hîc homini praecipue infensa sunt: *pulex penetrans*, vulgo *chique*, *nigua*, *biecho* (DON ANT. de ULLOA *voyage historique de l'Amérique méridionale*. T. I. p. 58. — J. G. STEDMANN *voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane* T. II. p. 52. — SAVARESY de la *fièvre jaune* p. 94.), *acarus indicus*, *aequinocialis* et *batatas*, *culex pipiens* et *pulicularis* (FERG *Bemerkungen über die durch ihren Stich den Menschen schädlichen Insekten in Surinam*. Vide HARLES *Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie* 1. B. 1. Heft. S. 149. 1813.), *bibius sanguinarius*, vulgo *moskara* (PALLAS *Reisen durch Russland* 1. B. S. 193. *oestrus humanus* (HUMBOLDT *essay sur la géographie des plantes, accompagné d'un tableau physique des régions équinoxiales*. Paris 1806. p. 136.) *aliaque* (SCHÖNBAUER *Geschichte der Columbacher Mûken im Banat*. Wien 1795. — COGROSSI in *nuove ed erudite osservazioni storiche, mediche e naturali*. p. 49. Venezia 1731).

57) JO. PILAS de verme ex spina dorsi. (Ephem. nat. cur. Dec. I. an. II. p. 180) — CHRIST. STENEVELT Diss. de ulcere verminoso. Lugd. Bat. 1697. p. 4. — S. CONRAD ZACHMANN Diss. de vermiculis in vulnere. Basil. 1704. — BOSSE sur les vers trouvés dans les pustules de la peau. (Journal de médecine. T. 32. p. 336.)

Frank. Prax. I. 2.

B

inservientium, aut ab aliis animalibus acquisitorum ⁵⁸). Ad insecta vero homini propria, ac in aetiology morborum cutaneorum memorabilia, pertinent: *pediculus humanus*, *pediculus pubis*, sive *morpio*, et *acarus exulcerans*.

Vermes. 11. *Vermium* cuti infensorum duntaxat *filariam medinensem* noscimus. Forte et *cysticercus cellulosae*, in contextu musculorum majorum habitans ⁵⁹), huc spectat.

Vegetabilia. 12. *Vegetabilia* vario pacto cutim afficiunt ⁶⁰), datas autem morborum formas tantummodo *urtica dioica* et *rhus toxicodendron* excitare solent.

Contagia. 13. *Contagium* typhi permultum in cutem influere, jam dictum est ⁶¹), ac magis magisque patebit. Praeterea contagia, morbos cutis específicos, tum acutos, tum chronicos excitantia, adsunt. Inter haec nonnulla forte ab animalibus domesticis in homines transeunt.

Pharmaca et venena. 14. *Pharmaca et venena* aliquando vitiis systematis cutanei ansam porrigere, docent, nisi effectus solani

58) GESSCHER in *Tode arzneykundige Annalen*. 4. Heft. S. 25.

59) RUDOLPHI *Entozoorum historia naturalis*. Vol. II. P. II. p. 229.

60) *Plumeriae rubrae* succus vesicas in cute excitat. Idem *hypomane mancinella* et *rhus radicans* (*Neuestes Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der gesammten Medicin*, 1810. 1. B. 4. St.) efficiunt.

61) F. I. Vol. I. §. XLIX. 4.

solani dulcamarae et rhododendri chrysanthi ⁶²⁾, saltem *ii valerianae, sudoriferorum, sulphuris, tartratis stibii et potassae, mercurii, arsenici, thermarum* etc.

15. De *alimentorum* in cutem influxu mentio- Alimenta.
nem jam iniecimus ⁶³⁾ aliaque hujus operis in
parte injiciemus ⁶⁴⁾. Saepe vel in praesente libro
de eo disserendi erit opportunitas.

16. Plurima facta docent, *sanguinem*, sive ni- Sanguis.
mium, sive retentum, sive extravasatum, sive de-
ficientem, sive alio modo peccantem, nec non
vasa, quibus continetur, inter causas morborum
cutaneorum, praecipuum occupare locum. Inpri-
mis variae *coloris* gradationes in morbis maculosis,
eruori, diversa ratione reliquis humoribus mixto,
originem debent. At cavendum, ne, ubi de vitiis
sanguinis, sensus fugientibus, quaestio est, hypo-
thesibus aurem praebeamus.

17. Uberrimum morborum cutis fontem sistit Transpira-
transpiratio aut suppressa, aut nimia, aut indole tio.
peccans. Indole autem potissime, perturbata alio-
rum organorum secretionem, peccare ea solet.

18. *Urinae* in cutem imperium praecipue in Urina.
morbis chronicis systematis cutanei evidens est.

B. 2. Et

62) HAHNEMANN *Versuch über ein neues Princip zur Aus-
findung der Heilkraft der Arzneysubstanzen.* (HUTBLANDS
Journal der pr. Heilkunde 2. B. S. 479—505).

63) P. I. Vol. I. §. LIX. 3.

64) P. II. Vol. I. Cap. de raphania.

Et morbi non cutanei, e. c. icterus, diabetes, ischuria etc. de eo testantur.

Bilis. 19. Nullus autem corporis humani liquor, nullumque viscus saepius pro causa morborum cutaneorum habetur, quam *bilis* et *hepar*. Quamvis vero hypothetici ac erroris multum hac in re lateat, attamen, quantum simul veri subsit, non reticebimus.

Semen. 20. De pubertatis in cutem influxu supra diximus. De *seminis* huc pertinente actione praecipue in capite de vitiiis pilorum quaestio fiet.

Menstrua. 21. *Menstruationis periodus*, vel citra morbum, evidenter in cutem agit ⁶⁵). Evidentissime autem systema cutaneum a catameniorum suppressione, tum graviditatis, tum morbi gratia contingente, afficitur.

Lochia. 22. Cutis puerperarum specificum candorem ⁶⁶) et, a minima licet compressione, maculam rubram exhibere solet. Maxime vero suppressio *lochiorum* in eam influere videtur.

Lac. 23) *Mammae* tam arcte cum integumentis cohaerent, atque *lac* tam evidenter in adipem influit,

ut

65) J. FRANK'S *Gesundheitstaschenbuch für das Jahr 1803*. S. 63.

66) *Gravidarum* cutem candidam fieri monet LORRY (l. c. p. 243). Idem vero vel de matrona refert, quae gravisda faciem *nigram* offerebat. Simile factum GÜNTHER enarrat. (*Salzburger med. chirurg. Zeitung* 1806. no. 33. p. 127).

ut haud mirum sit, ex cohibito lactationis negotio plurima cutis mala originem trahere. Praeterea lac contagiorum nonnullorum vehiculum est.

24. *Adeps*, contextum cutaneum plus minus *Adeps*. undique adimplens, rite monente LORRY ⁶⁷⁾, cum bile, spermate, menstruis et lacte, praemagnum commercium alens, in omni morbo febrili, potissime vero in eo, qui cutis affectione stipatur, facile evanescens, eminentem in morbis systematis cutanei gignendis occupat locum.

25. De animi pathematum in cutem actione, ^{Animi pathemata.} quotidiana testatur experientia ⁶⁸⁾. Illorum effectus vel a matre ad prolem utero inclusam, etsi nullum inter hunc et illam nervorum commercium pateat, sese extendunt ⁶⁹⁾. Animi pathemata de-

scribuntur pri-

67) *Histoire de la Société R. de Médecine* 1779. Et: *Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte*. 9. B. S. 222.

68) A verecundia facies et universa cutis rubore suffunditur. Vel modica et occulta ira nasi apex rubescit. Terror, vehemensque ira cutim mortis pallore obducit (PETIT *essay sur la médecine du coeur*. Lyon 1806. Et: *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte*. 23. B. 3. St.). Nihilominus cl. MARCUS cutim pro organo, utpote seroso, hinc parum irritabili declarat (l. c.)!

69) Non me pudet, naevos maternos saepe a rebus, imaginationem matris vehementer ferientibus, repetere. Legatur de hoc argumento: *Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie* 1812. Juin in nota cl. SEDILLOT; et *Salzß. med.-chir. Zeitung*. 1813. no. 6. p. 85.

primentia vim contagiorum cuti infensorum sustinent, aut latentem morborum cutaneorum fomitem evolvunt, vel praesentes eruptiones reprimunt. *).

Motus, vigiliae.

26. Cutis vario plane modo afficitur, prout muscoli subjacentes vel ad *motum* excitantur, vel *regnes* relinquuntur. Praeterea primo in casu transpiratio promovetur, in altero retinetur. Et adeps diversa ratione a motu aut quiete afficitur. Nil igitur mirum, si homines vel motu nimio, vel nimia quiete, ad morbos cutis disponantur ⁷⁰). Eo facilius id accidit, quo magis motus cum *vigiliis* et quies cum *somno* societatem ineunt ⁷¹).

Connubium causarum

27) Effectus deleterii caussarum huc usque recensitarum eo certius sequuntur, quo magis istae *connubium* inter se ineunt, quod, cum una caussa alteri facile ansam porrigat, saepissime contingere solet.

Caussa proxima.

28. De *caussis proximis* morborum cutis nunc disserendum foret; at, quae inter hasmet caussas sensuum imperium non fugiunt, e. c. effectus irritationis ab immunditie, ab insectis etc., hae sponte elucent; caeterae e. c. humorum vitia, solidorum intrinsicae conditiones etc., hypothesisibus duntaxat, a quibus abhorremus, attingi que-

*) Excecrabilis nequitiae vir universam faciem pustulis defoedatam habebat; cum ad extremum supplicium duceretur, vultum candidum exhibuit. (*Vie politique du dernier Duc d'Orleans. An X. p. 232*).

70) ALIBERT op. c. §. 24.

71) Ibidem §. 25.

queunt. Hoc autem non impedit, quo minus al-
lata opportunitate, saltem historice, de iis mentio
injiciatur.

§. IV.

D i a g n o s i s.

1. *Diagnosis* morborum cutis bifaria est, re- Genera-
tim.
spicit enim tum *formam*, tum *indolem* morbi. Ab
illa morbo imponitur *nomen*; ab hac illius de-
terminatur *natura*.

2. *Diagnosin formae* dum instituis, praecipi- D. formae
in genere.
tanter non judices, sed enunciatum semel errorem
difficulter corrigi, maximeque inde famam medici
laedi, memor esto. Quo tutius incedas, tempore
tantummodo diurno atque in loco lucido judices;
ne tamen, morbos cutis dari, qui melius sub
umbra in conspectum veniant, obliviscaris. Cutim
undique, ac, si opus fuerit, oculo etiam armato
considera. Tactum interdum, quin ipsum odora-
tum, in usum revoces.

3. *Stabilita forma morbi*, ejusdem *indoles*, D. indolis
in genere.
nisi ea inde jam sponte eluceat, determinanda est.
Examina igitur, utrum morbus de quo agitur, sit
acutus aut *chronicus*, id est, utrum veluti morbus
febrilis, brevi tempore curriculum absolvat, aut
instar diurni, sine febre in longum decurrat?
ALIBERTUS quidem distinctionem inter morbos
cutis acutos et chronicos, ob maximam eorum ana-
logiam vilipendit ⁷²⁾, verum alteram opinionem

defen-

defendimus, credimusque ejusmodi analogiam ad-
spectui potius quam intrinsecae rerum naturae
superstructam esse. Nemo id luculentius WICH-
MANNO ⁷³⁾ demonstravit. Vocabimus morbos cu-
tis acutos, *exanthemata* ⁷⁴⁾, chronicos autem,
impetigines ⁷⁵⁾.

Exanthe-
matum di-
visio.

4. Detecta *exanthematis* praesentia, indagan-
dum est, utrum effloratio febris cuidam veluti
symptoma supervenerit; an *proprium* constituat
morbum? Primo in casu *exanthema symptomaticum*;
in altero, *exanthema primum* habebis.

Exanthe-
mata sym-
ptomata.

5. *Exanthemata symptomatica* id gentilitium
habent: quod multifariis et inter se maxime diver-
sis febribus, quin immo ipsis interdum exanthe-
matibus primariis, et quidem certo plerumque
tempore, superveniant, quodque, iis comparenti-
bus, morbus primarius interdum cessat, saepissime
vero immutatus persistit et haud raro exasperatur.

Idem

⁷³⁾ Op. c. S. 12. 13. 32.

⁷⁴⁾ A graeca voce 'Εξανθήω, *effloresco*. Synonyma: phleg-
masiae exanthematicae, SAUVAGES; febres exanthema-
ticae LUDWIGII. Germanice: *Ausschlagsfieber*;
gallice: *fièvres éruptives*; anglice: *exanthematous*
or *eruptive fevers*.

⁷⁵⁾ Vocabulum *impetiginis* vario modo interpretatur, uti
videre est apud Hippocratem (Lib. II. prorrh. XIX.
1. et lib. de affect. XXX. v. 4.), apud Galenum (defini-
tion. medicae), apud Foesium (oec. p. 379), apud Chia-
rugi (l. c. p. 4) etc. Definitionem J. P. FRANK am-
plexi sumus (op. c. Vol. IV. §. 370.).

Idem fere contingit, dum exanthemata symptomatica evanescent; evanescent autem incerto morbi tempore.

6) *Exanthemata primaria* specificam agnoscunt ^{Exanthemata primaria.} causam, plerumque scilicet contagium sui generis. Suscepto hoc contagio morbus raro exemplo evolvitur. Evolvitur autem suo tempore ut plurimum febre, affectione quadam partium internarum stipata. Comparsente exanthemate, febris evidentem subire solet mutationem. Effloratio plerumque per certum tempus cutim detinet et varias metamorphoses patitur. Vel dissipato morbo, specificae reliquiae facile locum obtinent.

7. Patet igitur, exanthemata *primaria certa* ^{Stadia varia.} *stadia* percurrere, illa scilicet *latentis contagii, invasionis, eruptionis, efflorescentiae, desquamationis* sive *suppurationis* et *exsiccationis*. His accedit, rite procedente morbo, *convalescentia*.

8. *Stadium latentis contagii* inter temporis punctum, quo aeger contagium suscipit atque inter primum morbi initium, locum obtinet. Stadium huiusmodi aliquando perbreve, ut plurimum nonnullorum dierum, interdum aliquot hebdomadam est. In rebus huc pertinentibus rite enucleandis toti estote.

9. Quam primum contagium, sive alia causa, ^{Stadium invasionis,} evidentes in corpore effectus producant, *stadium invasionis* subintrat. Ingruunt plerumque sympto-
mata

mata prodroma febrium ⁷⁶⁾, quibus, ut diximus, ipsa febris succedit. Eodem circiter tempore, pro varia contagii natura, fauces, pulmones, ventriculus, vel plurima organa simul, non excepto universo nervorum systemate, afficiuntur. Ex organo laeso, eo facilius futura efflorationis forma praesagitur, quo magis noti sunt morbi tunc temporis grassantes, quo magis aetas aegri morbis exanthematicis favet, et quo minorem eorum copiam iste jam pertulerit.

Stadium
eruptionis.

10. Praegressa latentis contagii et praesente stadii invasionis suspitione, continua cutis sollicitudo habenda est. Vituperio enim tibi foret, si alter adstantium factam jam, nec a te primum animadversam *eruptionem* detegeret. Quibusnam in partibus variorum exanthematum eruptio incipere soleat, sciendum est, si nempe modo inverso rem inquirimus, inscitiam patefacimus. Sciendum quoque, exanthemata primaria nonnunquam *solo invasionis stadio* terminari, nulla scilicet subsequente eruptione.

Stadium
efflorescentiae.

11. Noto jam jam exanthematis praesentis genere, cutis sub quavis aegri visitatione examinanda est. Praecipue autem eae investigari debent partes, in quibus prima eruptionis vestigia comparuere; hinc enim plerumque primae exanthematis metamorphoses occurrunt, pro ratione exanthematis variae. Exanthemata, quae sub adspectu macula-

cularum et papularum efflorescunt, ut plurimum in *furfures* et *squamas* desinere solent. Econtra, exanthemata tuberculosa formam vesicularum et pustularum ocyus serius induunt, et plerumque *suppuratione* et *crustis* terminantur.

12. *Furfures* et *squamas* jam definivimus ⁷⁷⁾. Stadium ^{desquamatio-} *desquamatio-* ^{tionis.} *Periodus*, qua sese produnt, *stadium desquamatio-* *nis* vocatur. Eo vigente, pristina epidermis non solum secedit, sed nova simul generatur. Tempore intermedio, nuda fere cutis, sensibilis admodum et ad impressiones morbosas recipiendas valde apta est.

13. Exanthemata pustulosa, vigente *suppura-* ^{Stadium} *tionis stadio*, tot abscessulos, quot numerantur ^{suppura-} *pustulae*, exhibent. Pro varia morbi indole, pus ^{tionis.} *laudabile*, *ichorosum*, *serosum* observatur. Saepissime pus hujusmodi contagiosum est, aut saltem *contagio* pro vehiculo inservit.

14. *Disruptis*, vel sponte, vel scalptu, ab- ^{Stadium} *scerssulis*, pus, inde manans, ab aëre condensatur ^{exsiccatio-} *ac in crustas convertitur*, quod *stadium exsic-* ^{nis.} *cationis* vocatur.

15. *Convalescentia* post omnes morbos, in- ^{Convales-} *primis acutos*, memorabilis ^{centia.} *78)*, absoluto exanthematum primariorum curriculo, maximi momenti est. Quodvis enim horum exanthematum convalescentiam, propriis phaenomenis et periculis in-

77) §. II. 5.

78) P. I. Vol. I. §. XVI. 16.

signitam agnoscit. Pericula haec multifaria sunt, ac evolutionem plurimorum morborum, tum acutorum, tum chronicorum, respiciunt, in quibus fere singulis imaginem inflammatorii processus animadvertere licet.

Indoles ex-
anthema-
tum pri-
mariorum.

16. Omne primarium exanthema morbum sui generis constituit, ac vix aut ne vix quidem ad diatheses stabilitas ⁷⁹⁾, inflammatoria quodammodo excepta, revocari potest. Interea saepe contingit, exanthemata primaria a recto tramite deflectere, ac complicationem induere, inflammatoriam, gastricam, typhodem. Accidit hoc: 1. dum exanthemata, de quibus agitur, in tempus incidunt, quo constitutio annua sive epidemica morbis inflammatoriis, gastricis, typhodibus, favet; 2. dum homines invadunt, ob plethoram, ob vitia gastrica, ob vires, aliorum forte morborum culpa fractas, ad diathesin inflammatoriam, gastricam, typhodem praedispositos; et 3. dum errores vel in regimine vel in medendi ratione, morbi curriculum perturbant. Hisce observationibus innixi, exanthemata primaria dividimus in *simplicia*, *inflammatoria*, *gastrica* et *typhodea*.

Exanthema-
mata pri-
maria
simplicia.

17. Exanthemata primaria dicuntur *simplicia*, dum talia solummodo symptomata prae se ferunt, qualia stricte ad regulare morbi curriculum pertinent, dumque omnibus complicationum indicibus destituuntur. Diagnoses illorum duntaxat ex abso-

⁷⁹⁾ Ibidem §. XII.

luta notione exanthematum peculiarium institui potest. Sufficiat hic monuisse, exanthemata primaria, quamvis simplicia, tamen ita constituta esse, ut semper plus minus ad diathesin inflammatoriam inclinent: unde, si a recto tramite deflectant, non mirum est, quod saepissime inflammatoriam complicationem referant.

18. *Complicatio inflammatoria* exanthematum Complicatio inflammatoria.
 primariorum, per consueta signa, tum diatheseos tum febris inflammatoriae⁸⁰), prodit, at non semper, ut aliis in morbis, clara est. Impetus enim, quo morbus haud raro adoritur, celeritas, quae idem versus acmen decurrit, tenera multorum aegrorum aetas et corporis constitutio, impedire videntur, quominus energia illa, morbis inflammatoriis in genere propria, consueto more in conspectum hic veniat, unde facilis in diagnosi error succedit.

19. Exanthemata primaria saepius *complicatio* Complicatio gastrica.
gastricam induunt. Voracitas infantum, praesentia vermium et consensus cutim inter et tubum intestinale, praeter annuam constitutionem, morbis gastricis faventem, abunde de hac complicatione rationem reddunt. Ea praesente, exanthema saepe a norma consueta recedit, ac aeger, sine reliquis indiciis typhodibus, magnam virium prostrationem offert, quae sub usu remedium excitantium in pejus ruit, evacuationibus autem

autem tubi intestinalis, sive spontaneis sive artificialibus, sublevatur. Singula haec certiora sunt, quam ipsa signa gastrica, nullibi quidem fida ⁸¹⁾, in exanthematibus primariis vero quammaxime fallacia. Saepe enim violentia, qua contagium in teneram aegrorum constitutionem agit, vel absente vitio gastrico, signa excitat gastrica atque *apparentem* ita constituit complicationem ⁸²⁾. Adde, quod nonnulla contagia peculiarem affinitatem cum ventriculo alant, unde hoc viscus, qualiscunque sit indoles morbi, facile in consensum trahitur.

Complicatio typhodes.

20. Exanthemata primaria interdum et *typhodem* exhibent *characterem*. Hoc vel a primo morbi initio contingit, vel sub illius decursu. Primum longe rarius secundo animadvertitur. Si enim excipiamus aut nonnullas epidemias, aut con nubium fortuitum contagii exanthematis primarii cum contagio typhi, aut aegros, ante adventum morbi exanthematici, a lue scrophulosa, venerea, scorbutica sive alia viribus fractos; indoles typhodes raro in primo limine exanthematum primariorum observatur. Observatur quoque haec raro sub decursu morbi, dum recta adhibetur medendi ratio. Qui enim fere continuo typhodem, aut, ut dicere solent, malignam, nervosam, sive asthenicam exanthematum primariorum indolem somniant, hi maxime, heu! a vero aberrant. Errant potissimum

81) P. I. Vol. I. §. LX. 3.

82) Ibidem §. XIII. 3.

mum in eo, quod ex turbis nervorum et ex debilitate, ad indolem typhodem exanthematis concludunt. Sicuti enim illae turbae longe saepius originem suam debent irritamento inflammatorio in nervos praeter modum excitabiles agente, quam atoniae typhodi; ita et haec debilitas longe saepius obstaculis, exercitium functionum impredientibus, quam verae adynamiae debetur. Certiora indicia diatheseos typhodis in exanthematibus primariis tibi suppeditabunt: tum notio generis epidemiae regnantis, vel saltem illius morborum constitutionum; tum consideratio constitutionis aegri, morborumque, quibus prius subjectus vixit; tum evacuationes copiosae, absque omni levamine, immo cum conspicuo virium decremento contingentes; tum cita vel tarda nimis exanthematis, imperfecte et abnormiter absoluti, eruptio; tum praesentia exanthematum symptomaticorum; tum turbae nervorum, vel facta eruptione exanthematis perstantes; tum denique methodus antiphlogistica sive antigastrica sine successu adhibita.

21. Interdum exanthemata primaria, quam Observatio. complicationem prius exhibebant, eam, senescente morbo, amittunt. *Mutatio* huiusmodi, medicum in singula attentum et conditionem rerum quovis die comparative ad trutinam vocantem, latera nequit. Quodsi vero lateret, vita aegri non parum periclitaretur.

22. *Impetigines*, vel sano prorsus in homine Impetiginum divisio. ex

ex caussis localibus contingunt; vel ex labe totius corporis evolvuntur. Illae, *primariae* sive *locales*, hae, *secundariae* sive *symptomaticae* dicuntur.

Impetigines primariae.

23. Antequam impetigo pro *primaria* sive *locali* declaretur, duae potissimum conditiones requiruntur. Oportet enim illam primo cum nullo alio morbo, vel praegresso, vel praesente, commercium alere; secundo, illius sive praesentiam, sive absentiam, nullo pacto, saltem immediate, in exercitium functionum, citra cutem influere, et vice versa a nulla harum functionum regi. Impetigines ita constitutae sunt: 1. vitia conformationis in systemate cutaneo; 2. vitia ex cute, absque causa satis nota, luxuriante; 3. morbi ab immunditie; 4. morbi ab insectis, a vermibus aliisque a caussis, vel mechanice vel chemice agentibus, et 5. vitia a solius cutis sive laxitate sive rigiditate, sive sensibilitate morbosa. In diagnosi impetiginum localium instituenda, maculas arte *simulari* posse⁸³⁾, ne obliviscaris.

Impetigines secundariae.

24. *Impetigines secundariae* sive *symptomaticae*, cum morbo quodam vel praegresso, vel praesente connexum habent, atque in unam alteramve corporis functionem influunt; aut vice versa, ab una alterave harum functionum reguntur. Talis generis esse solent: impetigines ex *diathesi inflam-*

ma-

83) Excitari possunt maculae rubrae cum solutione auri, — maculae flavae cum acido nitrico, — maculae nigrae cum nitrate argenti fuso.

matoria, gastrica, arthritica, carcinomatica, scrophulosa, scorbutica, venerea et spasmodica, verbo, impetigines, quae quondam a polychymia ⁸⁴⁾, *a polycholia* ⁸⁵⁾, *et a cachexia* ⁸⁶⁾ *repetebantur. Sponte elucet, hujusmodi impetigines tantummodo symptomata morborum universalium esse, qui tamen morbi, haud semper innotescunt, eo quod comparente vitio cutis saepe cessare soleant.*

25. Influxus, quem aetas florida, constitutio ^{Impetigines inflamm-} corporis robusta, calor nimius, alimenta praeter ^{matoriae.} modum nutrientia, liquores fermentati et potissime sanguinis exuberantia in cutem exercent *), jam satis indicat, diathesin inflammatoriam ab impetiginibus non esse alienam, quod praeterea a magna factorum serie confirmatur. *Impetigines inflammatoriae* nuntiari solent pruritu ac consuetis inflammationum signis. Ut plurimum dein formam macularum rubrarum et pustularum induunt. Pustulae copiosum pus largiuntur, ab aëris attactu coalescens. Impetigines hujusmodi sine damno, immo cum emolumento, erumpunt. Exasperantur a rebus irritantibus, tum externe tum interne adhibitis. Diagnosiss securissime fit ex aetiologia, quo in opere praecipue suppressionis consuetarum haemorrhagiarum ratio habenda est.

26. Nisi

84) A gr. πολὺ, multum et αἷμα, sanguis.

85) A gr. πολὺ, multum et χολή, bilis.

86) A gr. κακός, malus, et ἔξις, habitus.

*) §. III.

Impetigi-
nes gastrici-
cae.

26. Nisi in *diathesi gastrica* stricte sumpta, quatenus scilicet ex alimentis et ex bile oritur, saltem in prava viscerum abdominalium conditio-
ne fons multarum impetiginum latet. Nunquam igitur de natura impetiginis secundariae iudicium feras, quin prius abdomen exploraveris. Memor quoque sis, diathesin gastricam, ob consensum cutis cum tubo intestinali *), facile et impetiginibus alterius indolis superaccedere. Sic, ne ex colore flavo aut viridescente impetiginis, ad naturam illius gastricam sive biliosam concludas: enimvero jam monuimus, multas gradationes coloris impetiginum ex cruore, vel sincero, vel aliis cum humoribus mixto, explicandas esse.

Impetigi-
nes arthri-
ticae.

27. Et *diathesis arthritica* suum in impetiginibus exercet imperium, quod facile intelligitur considerando: primitivam arthritidis formam, scilicet podagram, sese per inflammationem cutis, maxime pollicis pedis, patefacere; hanc inflammationem saepe tophos sequi; huiusmodi tophos arthriticos, vel ad alia cutis loca, potissime circa articulos, comparere: multas impetigines illos, qui laute vivunt, declinante vita, sub iisdem igitur rerum positionibus, quae arthritidi favent ⁸⁷⁾, aggredi, vel haereditario modo in familiis arthriticis vigere; cutim magnum commercium cum organis uropoieticis, in caussa, sive effectu arthritidis elimi-

nan-

*) Legatur de hoc consensu TISSOT Oeuvres T. XII. p. 71.

87) P. I. Vol. I. §. XII. 4.

nando maxime intentis, alere; atque multa sympto-
mata arthritica, comparente impetigine, evanesce-
re. Mirum revera est, classicum de morbis arthri-
ticis scriptorem ⁸⁸⁾, influxus diathessos arthriticae
in cutem obiter tantum meminisse, ac lacunam,
ab auctoribus de morbis cutis relictam, haud ad-
implevisse. Signa impetiginum arthriticarum sunt:
reditus morbi periodicus, influxus anni temporum
in illas, pruritus, ardor et dolor, quibus aegrotos
adoriuntur, levamen malorum internorum ab erup-
tione, inflammatio cutis in furfures desinens et
mali sedes inconstans. Caeterum et hinc diagnosi
potissimum ex morbis praegressis et ex aetiologia
desumenda est.

28. *Diathesis carcinomatica* glandulis syste-
matis cutanei, praecipue in aetate, qua fluxus men-
struus cessare solet, infensa est. Interdum et im-
petigines arthriticae, sive neglectae, sive male cu-
ratae, indolem carcinomaticam induunt. Alias
non desideratur labes haereditaria. In genere, im-
petigines carcinomaticae locum, quem sibi elege-
runt, constanter retinent, cutim valde exedunt, ac
interdum ipsa ossa vicina carie afficiunt. Praeterea
nonnunquam societatem cum scirrho sive cancro
aliarum partium inire solent.

Impetigi-
nes carci-
nomati-
cae.

29. Quemadmodum *diathesis scrophulosa* in
universum systema lymphaticum influit, ita et in
C 2 vasa

Impetigi-
nes scro-
phulosae.

88) BARTHEZ op. c. (vid. P. I. Vol. I. §. XLIII. 8.
not. 14).

vasa ac glandulas lymphaticas cutis. Impetigines scrophulosae potissimum in aetate infantili atque juvenili accidere solent, et cutim sub forma tuberculorum, pustularum et crustarum afficiunt, eamque non solum defoedant, sed et contextum illius, plerumque tamen absque magno pruritu et dolore, exedunt. Abscessus, inde secuti, indelebiles cicatrices relinquunt. Nulli cutis loco, nec parte capillata capitis excepta, hae impetigines parcent. Diagnosis ex universis diatheseos scrophulosae notis ⁸⁹⁾, desumitur. Cavendum vero est, ne impetiginem, propter id, quod forte glandulae subcutaneae vicinis in locis tumescant, praepostere pro scrophulosa declaremus; quodcunque enim malum, cutim lacescens, citra omnem scrophulosam diathesin, hunc in vicinis glandulis effectum producere potest. Nec ignorare oportet, cutim teneram candidissimamque scrophulosis fere propriam, facillime et aliis non scrophulosis vitiis esse obnoxiam.

Impetigines scorbuticae.

30. *Diathesis scorbutica* cutim praecipue *maniculis* defoedat. Interdum et vasa illius varicosa reddit. Accedente tunc inflammatione istorum, facile ulcera oriuntur scorbutica. Fatemur caeterum, diathesin scorbuticam non tam saepe impetiginibus *maniculis* porrigere, quam vulgo creditur, atque omni cum jure, praeter alios, MACBRIDEUM medi-

⁸⁹⁾ P. I. Vol. I. §. XII. 10.

medicis objecisse ⁹⁰⁾, quod in omnibus fere morbis cutaneis chronicis, labem scorbuticam accusarent. Rarius sane diathesin scorbuticam ii reperiunt, qui non ex uno, sed ex plurimis indiciis ad illius praesentiam concludunt. Symptomata vero scorbutica per transennam jam allata ⁹¹⁾, alio loco ex professo dilucidanda sunt ⁹²⁾.

31. A maculis incipiens et ad pustulas ascendens, paucas impetiginum formas invenies, quae indolem veneream interdum non agnoscerent. Impetigines syphiliticae raro pruriunt aut dolent; interdum cum aliorum symptomatum venereorum levamine erumpunt; saepius interim simul cum iis persistunt: unde diagnosi a medico, in doctrina morborum venereorum versato, haud difficulter plerumque eruitur. Ne tamen effectus deleterios mercurii in cutem, cum illis ipsius luis confundamus, probe cavendum est.

Impetigines venereae.

32. De actione nervorum in cutem jam egimus, unde patet, vel eam diathesin, cui nomen spasmodicae imposuimus ⁹³⁾, inter fontes morborum cutis chronicorum saepe esse quaerendam. Vario autem pacto a spasmis impetigines generari posse videntur, nunc videlicet transpirationis opus per-

Impetigines spasmodicae.

90) *Systematische Einleitung in die theoretische und praktische Arzneykunst*. 2. B. S. 992. A. d. E.

91) P. I. Vol. I. § XII. 6.

92) P. II. Vol. II. Cap. de scorbuto.

93) P. I. Vol. I. § XII. 9.

pervertendo, nunc alias secretiones cohibendo, nunc vero sanguinis transitum per propria vasa impediendo. Ut plurimum impetigines spasmodicae extemplo ac inopinate oriuntur, periodice recurrunt, ac saepe vel cum vitiis systematis uterini, vel cum labe primarum viarum, vel cum turbis nervorum generalibus, cahaerent.

Observationes.

33. Quemadmodum exanthemata nunc simplicia sunt, nunc complicata, ita et impetigines se habent; ac revera, in frequenti variarum diathesium complicatione, potissimum difficultas diagnoseos consistit. Consuetae *diathesium complicationes* in morbis impetiginosis sunt: illa diatheseos *inflammatoriae* cum diathesi *arthritica*, nec non ea, diatheseos *arthriticae* cum affectione *scrophulosa*, *scorbutica* et *venerea*. Non solum vero *diatheses* variae, sed et variae morborum cutaneorum, tum acutorum tum chronicorum, *formae* inter se complicantur. De *exanthematibus secundariis* id jam monuimus; verum minoris momenti talis est complicatio, si eam cum complicatione *exanthematum primariorum*, vel cum complicatione *exanthematum* cum *impetiginibus* conférat. Adde, quod vel ipsae *impetigines locales*, in corpore jam alio a morbo detento, indolem labis universalis induere, ac peculiare complicationis genus afferre queant.

§. V.

P r o g n o s i s.

1. *Exanthemata symptomatica* vix aut ne vix P. exanth. quidem prognosin generalem admittunt; sed po-
 sympto-
 matico-
 rum.
 tius pro signo morborum, quos comitantur, inser-
 viunt.

2. Prognosis *exanthematum primariorum* pe- P. exanth. titur praecipue ex constitutione vel epidemica vel
 primari-
 orum.
 annua, cujus scilicet constitutionis imperium hosce
 in morbos tantum est, ut, qui uno anno pestis
 instar saeviunt, aliis annis sine omni periculo de-
 currant. Hinc epidemica sive annua constitutio,
 magna ex parte et aegrorum temperamento et habi-
 tui imperat, artique medicae limites nunc satis
 extensos, nunc arctiores ponit. In genere, bonum
 est: dum exanthemata primaria cum ordine decur-
 runt; dum in aetatem incidunt, quae dentitionem
 et pubertatem intercedit; dum corpus antehac sa-
 numprehendunt; dum sub atmosphaera nec fri-
 gida nec calida nimis comparent, dumque simpli-
 cia et praecipue a complicatione typhode aliena
 sunt. Quo magis protrahitur *stadium latentis con-*
tagii, eo lenior esse solet morbus et vice versa.
Stadium invasionis sine periculo magno cum im-
 petu ingruere potest, dummodo subsequens *erup-*
tio morbi vim infringat. Contrarium, inprimis si
 partes internae magis magisque laedantur, malum
 est. Pejus erit, si evanescente ante tempus praescrip-
 tum

tum exanthemate, partes internae totam vim morbi sustinent et cutis, si ita dicere liceat, vices peragunt. Malum hujusmodi, vulgo *retrocessus exanthematum*, praecipue mutationibus repentinis temperiei ac animi pathematibus adscribendum est. Utroque in casu, nunc anxietates, nunc motus convulsivi, nunc inflammationes internae, nunc alia sequuntur. Dictae *inflammationes* difficulter resolvuntur ac facile in *exsudationem*, *suppurationem* et *gangraenam* transeunt. Optimum contra ea, si facta eruptione, non solum impetus morbi, ut diximus, frangitur, sed etiam dum exanthema laete floret. Quemadmodum enim forma amoena herbarum innocuarum, ab adpectu lurido vegetabilium veneniferorum differre solet; ita et species laeta exanthematum benignorum ab habitu tristi morborum hujusmodi cutis malignorum differt. Exanthemata, quae per *desquamationem* terminantur, plerumque sub illius curriculo *crisis* expectant. Est autem haec crisis illi febrium plane similis, ac plerumque sudore, urinâ et diarrhoea absoluta. Quae in *suppurationem* transeunt exanthemata primaria, haec saepe novo tunc stipantur febris insultu. Prognosis hoc sub stadio multum a virium vitalium conditione, et a statu partium internarum pendet, atque crisis solum ingruente *exsiccatione* locum obtinet. Quodcunque exanthema primarium, non penitus secundum normam terminatum, facile metastases excitat. In genere,

nemi-

neminem in vado constitutum esse dicas, nisi *convalescentiâ* omnibus numeris absolutâ.

3. *Impetigines primariae* sive congenitae sive P. Impetiginum primariarum. haereditariae, sanationem plerumque non admittunt. Caeterarum impetiginum primariarum prognosis a natura caussarum, a duratione morbi et a complicatione forte cum vitio totius corporis contracta, pendet.

4. Prognosis *impetiginum secundariarum* ab P. Impetiginum secundariarum. indole diatheseos, ex qua pullulant, ab aetate et constitutione aegrorum, a morbi quoque duratione, nec non a variis rerum positionibus, suo loco commemorandis, desumenda est. Quamvis enim foedum semper et periculosum quandoque illae malum constituant, nihilominus haud raro cum vero *emolumento* erumpunt, quod inprimis de *impetiginibus inflammatoriis* et *arthriticis* valet. Illae, praesertim apud juvenes bene nutritos, non aliter e cute, quam gummata ex arboribus, in solo fertiliori vegetantibus, exsudare videntur; hae effectum caussae, prius vagantis, nunc in cute fixae, exhibent. Ex dictis patet: cutim organon, pro parte *emunctorium*, sistere, cujus organi opes plurimae, vel superfluae, vel alio modo noctivae, e corpore eliminantur, quo in *opere criseos processum* non poteris non animadvertere. Ob id ipsum autem mirum haud est, quod impedita aut sublata salutari naturae actione, plurima ac interdum gravissima mala succedant. Accidit nempe, quod

quod eadem morbosa principia, quae per cutem evacuari oportuisset, alias in partes agant (vulgo: *retrocessus impetiginis*) atque hinc, nisi eadem prorsus, ac in cute, mala producant, phaenomena saltem iis similia excitent. Partes, cutis vices ita agentes, esse solent viscera, vel cum cute maximum consensum alentia, vel ob praevium alium morbum labefactata, vel ob aliam causam, e. g. aut ob aetatem aegri, aut ob annuam constitutionem, aut ob vitium haereditarium, ad morbos disposita. Ad reliquas diatheses quod spectat, notandum est, *impetigines gastricas* sub recta methodo plerumque haud difficulter abigi, sed ob id praecipue in prognosi memorabilem esse: quod vel aliis impetiginibus sese ita immiscere soleat, ut graviores, quam sint, videantur. *Diathesis scrophulosa*, quamvis securius integumenta, quam alia corporis organa detineat, ob id potissime timenda est, quod plerumque cutem magis formosam sibi eligat, quod vel sanata impetigine facile vestigia in eadem relinquat et quod complicationem cum aliis impetiginum causis ineundo, curam earum perdifficilem reddat. *Impetigines scorbuticae* duntaxat aetate provecta, aut si diu neglectae fuerint, artis vim eludunt. Quae ex *diathesi carcinomatica* originem ducunt, impetigines haec paucam sanationis spem relinquunt, ac incaute curata, graviora adhuc mala, scirrhum scilicet, sive cancrum viscerum portendunt. *Impetigines* vene-

venereae, etiamsi horrendae, tamen recta adhibita medela, in aegro caeterum bene constituto, haud difficulter abiguntur. Longe difficilior *impetigines spasmodicae indolis*, quamvis adspectu levissimae, debellari solent.

§. VI.

C u r a.

1. Medici est, tum ad tuendam cutis formositatem, tum ad morbos systematis cutanei antever-
tendos curandosve praecepta stabilire. Genera-
tim,

2. *Artis cosmeticae* pars major in conservanda et augenda cutis integritate et formositate versa-
tur, et quatenus hic scopus cum eo servandae sa-
lutis conspirat, ad imperium medicinae, id est prophylacticae, certo pertinet. Aliter quidem de arte cosmetica haud pauci inter medicos ⁹⁴⁾ sentie-
bant, ac ignominiae adeo notam illi veteris ec-
clesiae lumina inurebant ⁹⁵⁾; verum cum CEL-
SO

94) GALENUS de compositione medicamentorum. Lib. I. cap. 3. — CAELIUS AURELIANUS. Lib. I. cap. I. de morbis chronicis. TRILLERUS de remediis veterum cosmeticis, eorumque noxis, in opusc. medic. parte altera p. 496. — JOAN. LANG Epist. med. 43. lib. I. p. 194. HERMAN. BOERHAAVE elementa chemiae T. II. Part. 3.

95) CLEMENS ALEXANDRINUS Paedagog. Lib. II. cap. 12. Lib. III. cap. 2. — BASILIUS MAGNUS T. II. op. pag. 114. T. III. p. 575. — JOAN. CHRYSOSTOMUS T. I. in vet. test. p. 498. T. II. p. 863. — CYPRIANUS Lib. de

so ⁹⁶⁾ dicimus: „pene ineptiae sunt curare varos et lenticulas et ephelides; sed eripi tamen feminis cura cultus sui non potest“; — quod cum ita sit ut sexus femineus tuendae et excolendae formositatis consilia potius a medicis, quam ab agyrtis expetat, optandum est. Neque hac in re medicorum scripta desiderantur ⁹⁷⁾.

Prophy-
lactica.

3. Cutis jam a prima nativitate summa habenda est ratio, qua de caussa *recens natus* ⁹⁸⁾, absoluta funiculi umbilicalis ligatura, mox totus cum aqua tepida et sapone, vel cum vino quidquam calido et butyro, abluendus, ac praecipue partes genitales femineae a mucro, has ipsas obducente, liberandae sunt. Cutis plicae saepius examinandae et pulvere tenuissimo lycopodii aut farinae inspergendae. Porro balneum ex aqua tepida quotidie, vel alternis saltem diebus, nullo obstante morbo huic contrario, adhibendum est. Lintea sunt tenuia et, ut saepius mutari queant, satis copiosa.

Nec

de habitu seu disciplina virginum p. 210. — HIERONYMUS de viduitate, ad Furiam. T. I. Ep. X.

96) De medicina lib. VI. cap. 5.

97) HIERONYMUS MERCURIALIS Lib. de decoratione. Venet. 1625. — FALLOPIUS de decoratione. v. opp. — TROMSDORFF *Kalopistria, oder die Kunst der Toilette für die elegante Welt*, Erfurt 1804. — BANNEAU *histoire naturelle de la peau et de ses rapports avec la santé et la beauté du corps*. Paris 1802.

98) LEVRET *von der Behandlung neugebohrner Kinder*. Vide: *Auserl. Abhandlungen f. pr. Aerzte*. 1. B. 4. St. S. 126.

Nec infans, cum liber aëris tepidi accessus illi conducatur *), continuo obtegendus est. Simul ad lactis conditionem et ad universum nutritionis negotium respiciendum, atque si nutrix suo minus officio par sit, ea sine mora mutanda. Si alvus aut segnis aut viridis fuerit: ea illico cum *syrupo radicis rhei palmati*, addita, sub faecum virore, *magnesia*, solvenda. Nec minor transpirationis et urinae habeatur sollicitudo; quae ultimae scilicet evacuationes si languerent, cum *infuso florum tiliae europaeae* vel cum leni *decocto herbae violae tricoloris* promoveri deberent. Tertio versus finem vergente aetatis mense, nisi variolarum suscipiendarum periculum id citius postulet, ad *vaccinam*, sic dictam, recurre. Absoluta hac magis magisque cutis cura habenda. Non facile, nisi terminato institutionis opere, infantem sensim sine sensu temperiei mutationibus adsuesci oportet. Balneum tunc pro robustiore infante minus minusque tepidum ac tandem frigidiusculum sit. Satis autem erit, praecipue hyemali tempore, eo bis tantum quavis hebdomade uti. Universum corpus debitis vestibus, caelo et anni temporibus accommodatis obtegendum, ac cultus hodiernus, quo infantes collo, pectore et brachiis feminarum instar denu- datis incedunt, evitandus est. Sic non solum sa-

nitati

*) Erinnerung an den Gebrauch der Luftbäder und der Frictionen der Haut; von Dr. GREINER. (Allgem. med. Annalen, auf das Jahr 1811. Altenburg).

nitati, sed et formositati consulitur, quae ultima inprimis a frigore alternatim cum calore, cuti ad-moto, quamplurimum offenditur. Testantur haec de re praecipue *manus*, utpote quae semel congelatae, pristinam vix unquam recuperare queunt formam. Optime pulchritudini manuum usu diu noctuque protracto chirothecarum pellitarum, a sexu sequiori studetur. Nec *unguium* cura negligi debet. Praecipue vero *pars capillata capitis* attentione digna est: nam si nimia illius velamenta, affluxum humorum ad cerebrum promovendo, nocent; certo refrigeratio capitis, eruptioni impetiginum obstando, similiter detrimentum affert. Pectinatione quotidie reiterata, crines quidem, nisi agatur de plicosa progenie, aestivo tempore et moderate, abscindi possunt, sed nunquam radi debent. Nil vero magis infantes ab exanthematibus et impetiginibus contagiosis, vel ab insectis securos reddit, quam impeditum cum aliis infantibus et cum personis immundis propius commercium. Grassante exanthemate maligno, scholarum publicarum summa ratio habenda est.

Continua-
tio argu-
menti,

4. *Juvenes et adulti* evitando potus fermentatos, praecipue calidos, et diuturnam in lecto moram cuti optime prospiciunt. Indulgeant contra ea motui corporis, praecipue in aëre libero, adhibeant balnea frigidiuscula ac munditiei vestium corporisque cum industria studeant. Eo magis id necessarium erit, quo magis officium, quod

exer-

percent, morbis cutis favet. Sexus sequior radios solares, ventos rigidos, motum nimium et undores fugiat. In genere mulier, quid propriae cuti conducatur, quid illi noceat, observet: sunt enim feminae, quarum cutis tam sensibilis est, ut ab innocentissimis rebus, praecipue oleosis et pinguedinosi, laedatur. Ipsa balnea non omnibus indistincte conducunt. Refert multum aquam pro lotionem caute eligi. Quo purior ea et quo liberior a salibus mediis, eo magis praesenti scopo idonea est. Aqua pluviatilis et inprimis ros, tempore aurorae exceptus, sicuti regno vegetabili⁹⁹⁾, ita et cuti humanae vel maxime favent. Potissime vero huic adversatur aqua sulphatem calcis continens. Feminae aquae destillatae aut fragariae vesicae aut florum tiliae europaeae, peculiarem vim cosmeticam, experientia edoctae, tribuunt. Quaecumque vero utamur aqua, aëris liberioris accessus immediate post lotionem evitandus; quae de causa haec potius vespere quam mane suscipienda est. Neque lotionibus ultra, quam opus, indulgere oportet. Feminae, quarum cutis ad siccitatem sive ariditatem inclinatur, cum fructu creme lactis acidulo utuntur, quo scilicet faciem, col-

99) Rorem colligit ac dein vegetabilia adspargenda curat egregius horti Schönbrunnensis custos et moderator, Boose, atque huic artificio (quod a feminis propriae cutis curam habentibus didicit), peculiarem formositatem plantarum suarum tribuit.

collum et pectus ante cubitum humectant atque linteo dein leniter abstergunt. Illis quoque vel *aqua oryzae*, quotidie recenter parata, qua simul cuti candor conciliatur, conducit. Ut cutem nimis sensilem ab externis impressionibus quodammodo tueamur, illinitio *vitelli ovi cum aqua subacti*, ad exsiccationem usque relictæ, ac dein cum spongia aqua tepidiuscula imbuta abluti, inservit. Cutis a pulvere arenae, vel a pigmentis conspurcata, optime cum *unguento demulcente* nostro ¹⁰⁰⁾ abstergitur. Cuti, a pinguedine veluti a vernice obductae (cutis unctuosæ), lotio, vel ope *aquæ rosarum rubrarum* additis nonnullis guttis *spiritus roris marini*, vel ope *solutionis acidi benzoës* ¹⁾, amica est.

Finis argu-
menti.

5. In *ætate senili* optime cuti prospicitur, si cunctae excretiones, potissimum autem eae urinae et transpirationis debito modo regantur. Urinam debita potus quantitas et vini diuretici usus promoveat. Transpirationem sollicitant mora diuturnior in lecto, indusia quidquam aspera, frictio cutis, potissime vero artificialis hujus, more Turcarum, post balneum suscepta tractatio ²⁾. Latente vitio hæmorrhoidali, aut suppresso alio cruoris fluxu, si sanguis evidenter in systema cutaneum irruerit

¹⁰⁰⁾ *Unguentum demulcens*, ex partibus æqualibus spermatæ ceti et olei nucleorum amygdali communis, leni igne invicem fusis ac dein refrigeratis, paratur.

¹⁾ *Essentiæ Benzoes simplicis* (paratur ex floribus benzoës spiritu anisi solutis) aquæ communi tantum instillatur, donec lactescat (lac virginis).

²⁾ *L'art de masser*.

irrueret, verno imprimis tempore, vel *hirudines* ano, vel *cucurbitulae scarificantes* dorso, admo-
vendae forent. Caeterum, tum apud senes, tum
apud alios, si morbus cutis cum levamine prodeat,
ille, veluti maximum naturae beneficium, promo-
veri potius quam reprimi debet; unde aegri, ne
agrytis aut medicis imperitis, sanationem vitii cu-
tanei promittentibus, aurem praebeant, exhortan-
di sunt. Juvat immo naturae nisum *fonticulo* vel
alio *artificiali ulcere* sustinere.

6. *Exanthemata symptomatica* curam morbo C. exanth.
primario accommodatam exposcunt. Sicuti autem sympto-
vel aliorum symptomatum peculiarem curam mi- matico-
nime negligimus, ita vel eam hujusmodi exanthe- rum.
matum in specie trademus.

7. *Exanthemata primaria*, dum secundum C. exanth.
ordinem decurrunt naturae committenda sunt, primario-
rum,
omnis enim medendi ratio, sicuti simplicius, ita
quoque securius, ad regimen diaeteticum et ad le-
vamen symptomatum limitatur ³⁾. Si vero exan-
themata primaria a debito ordine deflectant, tunc
pro re nata methodus medendi activa eousque ad-
hibenda est, donec ad viam praescriptam illa rece-
dant. De singulis speciatim.

8. Praecipuum in cura exanthematum prima- C. exanth.
riorum primar.
simplici-
um.

3) Legi de hoc argumento merentur: BORSIERI (Inst.
med. Vol. II. cap. X. §. 310.) et HORN (*Archiv für*
med. Erfahrung. Jahrgang 1811. S. 311.

riorum *simplicium* momentum, in debito *temperiei regimine* collocatum est. Temperatura modica, quatuordecim circa graduum thermometri Reaumuriani, ac diu noctuque aequalis, optime accommodata esse consuevit. Aeger quidem in lecto, sed stragulis minime obrutus decumbat. Praesertim vero sub alvi depositione ac tempore, quo lectulus sternitur, a refrigerio sibi caveat, unde vas ad faeces recipiendas idoneum et lectus alter in usum duci debet. Lectus loco opportuno sit positus ac nemo cum vestibus aura frigida imbutis aegrum incaute accedat. Neque pulsus manu gelida tangendi sunt. Lintea quidem impune quotidie mutari licet, dummodo neque humida neque frigida sint. Versus finem aegritudinis, imprimis transpiratione moderate fovenda est. Quare *potum*, quem primo morbi sub decursu temperaturae cubiculi accommodatum suppeditavimus, nunc tepide hauriendum offerimus. Ibi *aqua communis*, *lacte* remixta, vel *succo vegetabili* et *saccharo* edulcorata, inservierat; hic *infusum florum tiliae europaeae* vel *sambuci nigrae* porrigitur. *Victus* per omne morbi curriculum *vegetabilis* et *paucus*, ex jusculis scilicet aqueis, butyro et sale cum avena, oryza, hordeo, decoctis, indicatur. Fructus, sive recentes, sive cocti, dummodo absque vino et aromatis parati, expetente aegro, nulloque obstante alvi profluvio, concedi possunt. Motus animi et nimia lucis actio evitentur. Evacuationes spontaneae,

neae, sive cruentae sive aliae, nisi limites excedant, minime sedandae. Si alvus deficeret, quotidie ea cum *clystere antiphlogistico* ⁴⁾, movenda foret. *Purgantia*, rite monente VOGLERO ⁵⁾, periculum inferre queunt. Si affinibus aut aegris solum regimen minus arrideat, tunc pro forma magis, ab initio *aqua destillata* sive *fructus rubi idaei* sive *nucleorum pruni cerasi*, ac dein *aqua florum* sive *tiliae europaeae* sive *sambuci nigrae*, cum syrupis analogis, aut *emulsiones amygdalarum*, *seminum mali cydonii*, *cucumeris melonis* etc. praescribuntur.

9. Ut exanthemata primaria inflammatoria ad C. exanth.
simplicitatem reducantur, morbum, absque mora, ^{primar.} inflamm.
cum remediis antiphlogisticis, diatheseos inflammatoriae gradui accommodatis, aggredimur. *Venaec sectio*, *frigus* et *nitras potassae*, praecipua hic sistunt auxilia, de quorum tamen usu regulas *generales* statuere haud audemus. Generalem indicationem potius admittunt *hirudines*, quibus toties locus est, quoties exanthema indolis inflammatoriae in partem vitae conservationi necessariam vehementer saevit. Loco affecto, quo propius id fieri potest, *hirudines*, habita ratione aetatis et vehementiae morbi, applicandae sunt. Praeterea,

D 2

nisi

4) P. I. Vol. I. §. XXX. 5. not. 56.

5) HUFELAND's *Journal der pr. Heilkunde*. 1811. December.

nisi alvus jam nimis aperta sit, ad *lenia purgantia* ⁶⁾ recurrendum. Caeterum regimen ut supra.

C. exanth. primar. gastrico-rum. 10. In exanthematibus primariis *gastricis*, ne intempestive ad emetica, aut ad fortiora purgantia, praecipue sub stadio invasionis ac eruptionis, confugas. Prius nempe impetum febris cum lenibus evacuantibus antiphlogisticis moderare et exanthematis, si natura ad hoc sufficiat, liberam evolutionem concede. In provectiori morbo, cum pulsu molli, remedium, quod *tartritidi stibii et potassae* in parva dosi ⁷⁾, aequiparari posset, non invenies. Nimii illius remedii effectus, cum decocto mucilaginoso compescantur. Regimen, quale in febribus gastricis ⁸⁾, praescribendum. Temperatura autem major, quam in exanthematum simplicium cura, requiritur.

C. exanth. primar. typhodum. 11. Exanthemata primaria *typhodea*, concessis haud paucis exceptionibus, in cura eorum speciali tradendis, secundum regulas in therapia febrium typhodum expositas ⁹⁾, pertractantur. Praeci-

pua

6) E. g. serum lactis tamarindinatum, aut: Rec. Pulpae amylicae indicae, succi fraxini orni aa, unciam unam. Coque c. s. q. aquae fontis ad colat. unciam octo. Cap. omni secunda hora unciam unam et semis. (pro aegro 8—12 annos nato).

7) Rec. Aquae florum sambuci nigrae uncias octo. Tartari emetici granum unum. Syrupi sambuci unciam semis. M. cap. omni secunda hora unciam unam.

8) P. I. Vol. I. §. LX. 17.

9) P. I. Vol. I. §. LV. 14—49.

pua indicatio in eo consistit, ut vires vitae sustineantur. Sustinentur autem potissime sub *temperatura calidiori*, cum *jusculis nutrientibus*, *vino*, *cortice cinchonae officinalis*, *acidis mineralibus*, *camphora* etc. Tam diu valebit methodus huiusmodi, quamdiu typhodes morbi character, persistet.

12. Mutatio frequens indolis exanthematum Monitum. primariorum, facilis, sub eorum decursu, diathesium complicatio, nec non plurimorum aegrorum, maxime infantum, morositas, obstinatio, ingentes medentibus difficultates opponere hic solent. Ut sub dubia rerum positione, quoadusque id fieri licet, secure incedamus, a remediis heroicis, donec lux major affulgeat, abstinendum est. Cunctando enim haud raro restituitur res, ac nisi ipsa natura responderit, ab arte sane parum aut nihil expectabimus.

13. Ut evanescente ante debitum tempus exanthemate, locisque internis inde gravi modo affectis, morbus pristinus ad cutem reduci queat, primum est *causam retrocessus* indagare. Hac detecta, ea, quoad potest, removenda, aut saltem deleterii illius effectus corrigendi sunt. Hunc ad scopum, pro re nata, methodus nunc antiphlogistica, nunc antigestrica, nunc sudorifera indicatur. Ne hac ultima abutamur, cavendum est. Non enim quodvis exanthema a cute dispersum, ad eandem rursus per sudorifera revocatur. Idem de

C. retro-
cessus.

vesi-

vesicatoriis, de sinapismis, de frictionibus cutis, de balneis tepidis, de cucurbitulis siccis, de emeticis aliisque remediis, in doctrina speciali commemorandis, dicendum est.

C. convalescentiae.

14.] Cum quodvis exanthema primarium *convalescentiam* sibi propriam agnoscat, cuivis convalescentiae et propriam curandi rationem esse, patet. In genere, convalescentes quammaxime ab atmosphaerae vicissitudinibus custodiendi sunt. Si pulsum quaedam irritatio, calores fugaces, somnus irrequietus et anorexia transitum convalescentiae in sanitatem perfectam impedian, lene alvum evacuens remedium indicatur.

C. impetig. generalium.

15. Impetigines locales *remedia topica*, — symptomáticas vero *auxilia universalia* exposcere, vix opus est ut moneamus. Impetigines symptomáticas haud raro ita constitutas esse, ut praeter methodum universalem et topica auxilia sibi exigant, alibi docebimus. Caeterum non omnia, quae cuti *topice* admoventur, remedia effectum duntaxat *localem* exercent.

C. impetig. localium.

16. Priusquam cura *impetiginis localis* suscipiatur, num forsitan per artem major, quam morbus ipse fecisset, cutis defoetatio immineat, perpendendum est. Animadverti dein probe oportet, an impetigo, prima quidem origine localis, tractu temporis cum vitio universali societatem iniverit? In genere, in omni impetigine, jam diu persistente, praecipue si conspicuam illa secretionem indu-

ducere solita fuerit, consuetudinis leges venerandae, ac habitualis evacuationis vices, ope *ulcerum artificialium* agenda sunt. De *setaceis*, de *fomiculis*, de *vesicatorio*, sic dicto, *perpetuo* et de applicatione *corticis daphnes mezerei* hîc loquimur. Concessa autem facultate impetigines locales remediis topicis aggrediendi, secundum rerum positiones alibi in specie determinandas, vel ad *manum chirurgicam*, vel ad *remedia abstergentia*, vel ad *res insectis contrarias*, vel ad *auxilia*, quae in cutis contextum *emolliendo*, *irritando*, *adstringendo*, *sedando*, vel *erodendo* agunt, confugiendum est.

17. Per *manum chirurgicam* vel *ulcera* exci-
tantur *artificialia*, vel cum *filo*, *forficibus*, aut *Manus chirurgica.*
cultro excrescentiae auferuntur, vel cum *hirudini-*
bus atque *cucurbitulis cruentis* vasa cutis deplentur, vel cum *cucurbitulis siccis* cruor nunc a locis affectis divertitur, nunc ad haec ipsa magis dirigitur, vel *fasciis* et *frictionibus* cutis sustinetur, vel loca illius nimis sensilia *emplastris* aliisque auxiliis ab externis custodiuntur impressionibus.

18. *Abstergentium remedium* ope, cutis ab *Remedia abstergentia.*
immunditie liberatur, vel ad alia externa *auxilia*, *serius* applicanda, praeparatur. Pertinent huc: *lotio cum aqua simplici*, vel cum *solutione saponis*, *balneum tepidum*, *massa detergens* ¹⁰⁾.

19. So-

10) Rec. nucleorum amygdali communis amari, uncias novem. Nucleorum pini pineae uncias tres. Contun-

dan-

Res insec-
tis contra-
riae.

19. Solis jam abstergentibus remediis cutis nonnunquam ab *insectis* liberatur. Verum ad huiusmodi animalcula prorsus extirpanda, pro variorum rerum positione, atque pro statu corporis vel sano, vel morbo, plerumque recurramus opus est ad *oleum, nicotianam tabacum, helleborum nigrum sive album, inulam helenium, veratrum sabadillam, delphinium staphisagrium, colchicum autumnale, acidum sulphuricum, muriatem sodae, magnesium*, praecipue vero ad *mercurium* et ad *sulphur*.

R. emolli-
entia.

20. Cutim *relaxant balnea tepida* additis *herbis mucilaginosi* aut *lacte, unctio ope olei, linimentum demulcentis, adipis*, et applicatio *fotus animalis*.

R. irritan-
tia.

21. Nihil systema cutaneum potentius *irritat*, quam major caloris gradus, ope *balnei calidi simplicis, thermarum* ¹¹⁾, *balnei vaporis*

dantur in mortario ut fiat pulvis. Adde mellis puri uncias sex. Vitelli ovorum n. sex. Portio huius massae, quae quavis vice in usum trahitur, prius in aqua tepida solvenda est.

- 11) E. c. WISBADEN (RITTER, *Regeln beim Gebrauche des warmen Wassers zu Wisbaden. Reichsanzeiger* 1797. n. 163. S. 1749.). FABRICIUS *Manuel du baigneur aux eaux de Wisbaden. Paris* 1812. BADEN in magno Ducatu Badensi (KRAFF *Beschreibung der warmen Bäder zu Baden. Tübingen* 1794.) WILDBAD, (*das Wildbad im Königr. Württemberg von KERNER. Tübing.* 1813). PISA (SANTI *analisi chimica delle acque dei bagni di Pisa. Pisa* 1789.) BATH (FALCONER *Essay on the Bath Waters. London* 1757.) etc. *De balneis in genere lege*

Essay

ris ¹²⁾ et *arenae* ¹³⁾ applicitus. Non minorem frictions fortes irritationem inducunt. Localem quoque stimulum cuti inferre queunt saliva, urina, bilis, subcarbonas potassae, acetum, aliaque acida, camphora, carbones, baccae lauri nobilis, semina sinapis nigrae, varia mercurii praeparata, etc.

22. *Adstringenti* ac simul irritanti principio R. adstringentia.
instruuntur *sulphas aluminis, sulphas zinci, cortex quercus roboris* et similia. Mitissimum autem adstringens ac sedans simul remedium, in *plumbo*, debita cautela adhibito, habetur.

23. Eminentem quoque in impetiginibus curandis locum *narcotica*, inprimis *opium, hyoscyamus, conium maculatum, humulus lupulus*, etc. occupant. R. narcotica.

24. Nec acria et caustica, e. c. *radix hellebori, meloes cantharides, nitras argenti fusus, potassa pura* etc., excipi merentur. R. caustica.

25. In *impetiginibus symptomaticis* remedia, C. impetiginum symptomaticorum.
diathesi, ex qua cutis vitium pullulat, accommodanda. den-

Essay sur les eaux minérales naturelles et artificielles;
par BOUILLON - LAGRANGE. Paris 1811.

12) SANCHEZ mémoire sur les bains de vapeurs de Russie (Vid. Mémoires de la société roy. de médecine T. III. p. 233). — MARCARD von Dampfädern (N. Magazin für Aerzte. 4. St. 1776). RICHTER Geschichte der Medicin in Russland. Moskau 1813. I. Th. S. 76.

13) XXI. veterum et clariorum medicorum opuscula.
Mosquae 1808. p. 292.

dentur oportet. Patet hinc, neminem impetiginēs secundarias rite curaturum esse, nisi prius regulas, ad morbos primarios curandos tradendas, probaverit. In genere, securius curam remediis *internis* ordimur, ac ad *externa* tunc solum devenimus, ubi morbus jam satis in cutem desaeviit; ubi ipsa natura cutis affectionem, inani conatu, deicere satagit; et ubi perstans antiqua impetigo depositioni secundae obstat. Diuturno autem in morbo, ut alibi, ita et hic, ad leges consuetudinis respiciendum, ac saepe *ulcera artificialia* reliquis externis remediis praemittenda sunt. Praeterea, ut, durante cura impetiginis symptomatae, singulae corporis evacuationes rite et abunde procedant, semper opus est.

C. impetig. inflammatoriarum.

26. Curam impetiginum *inflammatarum*, sub regimine antiphlogistico, leni alvum *purgante* remedio incipimus. In aegro florido, robusto, sique vitium cutis cum emolumento proruperit, a remediis localibus abstinentes, morbi sanationem quammaxime naturae committimus. Hoc vero non impedit, quominus, modo quo decet, puritati cutis studeatur. Quodsi autem morbus tanto cum impetu in cutem saeviret, ut doloris vehementia aut cutis destruendae periculum promptius auxilium expeterent; istud in *hirudinibus* vel in *cucurbitulis cruentis*, tum prope impetiginem, tum ad loca, quae cum parte affecta maxime consentiunt, applicitis, habetur. Hirudines quoque va-

is, ex quibus suppressa quaedam haemorrhagia revocari optatur, admoveri queunt. *Venae sectioni* in morbis, potius systema vasorum capillarium, quam vasa majora detinentibus, raro, nisi apud summe plethoricos, locus est. Neque sola cruenta evacuatio hic valet; conducunt enim et *ulcera artificialia*, quae conspicuam evacuationem serosam argiuntur. Nihil *reditum* impetiginis inflammatoriae, absque emolumento prorumpentis, securius antevertit, quam facta ope aquae frigidae aspersio, aut *balnea fluvialia* ¹⁴⁾ nec non *marina* *) vel similia **). Calor contra, quocunque demum pacto cuti applicatur, quod de singulis irritantibus remediis valebit, nocet.

27. Impetigines *ex vitio abdominali*, sive gastrico sive alio oriundae, exposcunt, praeter vic- C. impetig. gastricarum.
um selectum, usum remediorum *resolventium* ac *alvum moventium*. Inter prima *aquae minerales* *sapo-*

14) Von der Badeanstalt für kalte Flussbäder zu Hamburg (Schriften der hamburgischen Gesellschaft 3. B.). Von der Anlegung eines öffentlichen Badehauses. (Pyl Aufsätze und Beobachtungen a. d. gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Samml. 5. S. 216.). DEISCH von Anlegung der Flussbäder (Reichsanzeiger 1795. N. 71. S. 629).

*) Neue Annalen des Seebades zu Doberan. Von S. G. VOGEL. Rostock 1812.

**) Ueber die Aehnlichkeit der Salzsoole mit dem Seewasser und den Nutzen der Soolbäder, Von TOLBERG. Magdeburg 1811.

saponaceae ¹⁵⁾, exiguae et repetitae doses *tartritis stibii et potassae*, ac, absente omni scorbutica complicatione, *urias hydrargyri* ¹⁶⁾; — inter alia *tera aquae minerales salinae* ¹⁷⁾, *radix rhei palmati*, *salia media* etc., primum locum occupant. In genere curam impetiginum libenter, exemplo *HEBERDENII* ¹⁸⁾, remedio purgante, etiam repetito, *puritatis*, ut ita dicamus, *internae gratia*, dummodo vires aegri aliaeque rerum positiones id permittant, ordimur.

C. impetigin. arthriticarum.

28. Cura impetiginum *arthriticarum* cautiissime me

15) E. c. *SCHLANGENBAD in Hassia* (*Hanöverisches Magazin* 1783. 5. St.). — *LACHOWITZ in Bohemia* (*systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder. Leipz. 1801. 1. B. S. 125*). — *PLOMBIERES in Lotharingia* (*MALOUIN in mémoires de l'Académie des sciences* 1746. p. 109). — *LOKA in Suecia* (*BERGIUS von den Lokaquellen. Vid. et BERGMANNI opuscul. physico-medica. T. IV.*).

16) Calomel.

17) E. c. *Carlsbad* (*BECHER Untersuchungen des Sprudelwaseers im Carlsbade. Prag. 1771*). — (*EGRA* (*Böhmische Literatur für Hydrologie, in BALDINGERS N. Magazin für Aerzte. 15. B.*)). — *BURDSCHIED prope Aquisgranum* (*KORTUM vollständige physikalisch - medicinische Abhandlung über die warmen Mineralquellen und Bäder in Aachen und Burdscheid. Dortmund 1798.*).

18) *Commentaria de morborum historia et curatione* p. 93.

ne, ac praemissis plerumque *ulceribus artificialibus* inchoanda est. Porro ad *regimen diaeteticum* maxime respiciendum. Carnes, imprimis pingues, male, rebus aromaticis conditae fumoque induratae, quousque consuetudo fert, fugiendae. Contra ea *uscula testudinum, limacum, ranarum, viperarum* ac *lacertarum viridium* ¹⁹⁾ cum fructu adhibentur. Summopere vero ut evacuationes alvi, urinae et transpirationis pro re nata promoveantur, curandum est. *Purgantia* parum acria et *remediis maris* nupta salibus mediis anteponimus. Attamen et haec-salia in aquis mineralibus, praecipue si urinam promoveant, conducunt. Eminentem enim *diuretica*, imprimis *juniperus communis* et *radix ononidis spinosae* hinc occupant locum. Qui majori irritabilitate instructi sunt, a remediis narcoticis, urinam simul promoventibus, e. c. *a stipitibus solani dulcamarae*, bene se habent. Inter *diapnoica*, praecipue varia *antimonii praeparata, decocta*, ut dicunt, *lignorum* ²⁰⁾, et *sulphur* sese commendant. Adhibetur hoc remedium tum interne tum externe, et quidem hinc, sub forma

19) DAUBENTON et MAUDUYT in *Histoire de la Soc. R. de médecine* a. 1780.

20) E. c. ex *lignis lauri sassafras, quajaci officinalis, juniperi communis, ex radicibus smilacis sarsaparillae, chinae nodosae (Smilacis chinae)* etc.

ma *balneorum*, sive *frigidorum* ²¹⁾, sive *thermali-*
um ²²⁾, sive *artefactorum* ²³⁾.

C. impe-
tig. carci-
nomatica-
rum.

29. Cura impetiginum ex *diathesi carcinoma-*
tica haud multum ab illa impetiginum arthriti-
carum differt. Amplectitur praeterea illa usum
conii maculati, *mercurii*, *acidi nitrici* et *arsenic-*
saltem externe appliciti. Caeterum, exceptis bal-
neis, remedia externa, plus detrimenti quam utili-
tatis afferre solent.

30. Me-

21) E. c. BALDOHN in Curlandia (EKHOF's *Beschreibung*
des Baldohnischen Mineralwassers. Mietau 1795), SMORDON
et WIDZĖ in Lithuania.

22) E. c. *Aquisgranum* (*Aix-la-Chapelle*, *Aachen*),
Gasteiner Wildbad prope Salzburg (BARISANI
physisch-chemische Untersuchung des berühmten Gastei-
ner Wildbades. Salz. 1785.), — *Baden in Austria*
(SCHENK *Abhandlung über die Bäder der Stadt Baden*
in Niederösterreich. Wien 1791.) — *Hirschberg*
(ZELLER *Hirschbergische Merkwürdigkeiten*. 3. B. 1742.)
— *Landek* (MOGALLA. *Die Bäder bei Landek*. Breslau
1788). *Bagnères* (CARRÈRE *analyse des eaux miné-
rales de Bagnères*. Vid. *Histoire de la Société R. de
médecine* 1779. à Paris). *Abano* MANDRUZZATO *dei
bagni d'Abano*. Padova 1789.). *Langensalza* (*Die
neu entdeckten salinischen Schwefelbäder zu Langensalza*,
von TROMMSDORFF. Erfurt 1812. *Eilsen* (*Ueber die Gas-
und Schlammäder bey den Schwefelquellen zu Eilsen*,
Berlin 1811.)

23) *Unciae duae hydrosulphureti potassae prius in aqua
fervida solvuntur ac dein balneo superadduntur. Lege
de usu hepatis sulphuris in morbis cutis: Sammlung
auserl. Abhandlung f. pr. Aerzte*. 13. B. S. 253.

30. Methodus generalis scrophulis medendi, C. impet. scroph.
 debito loco tradenda, impetiginibus scrophulosis
 quoque accommodata est. Sufficiat hic meminisse,
auxilia topica (exceptis balneis tepidis et ulceribus
 artificialibus) etiamsi primo intuitu juvare videan-
 tur, fere semper tamen cum damno adhiberi, qua
 de re tot morbi oculorum et aurium, ab impetigi-
 nibus scrophulosis praepostere sanatis exorti, ultro
 testantur. Inter *remedia interna* nullum magis
 scrophulae cutaneae adaequatum est, quam *oxy-*
zum hydrargyri et antimonii sulphuratum ²⁴⁾,
 praecipue si illi, in morbo inveterato, *extractum*
conii maculati jungatur.

31. Quae ex diathesi *scorbutica* originem nan- C. impe-
 discuntur impetigines, nil nisi regimen et phar- tig. scor-
 macea huic diathesi accommodata, exposcunt. In- butica.
 primis conducunt jussula cum *herbis antiscorbuti-*
cis ²⁵⁾, *balnea frigida*, et *lotiones* corporis ope
aceti sive *acidi nitrici diluti* institutae.

32. Cura impetiginum *venerearum* ex genera- C. impe-
 libus syphilidem pertractandi regulis desumitur. tig. vene-
 Solum hic animadvertimus: *muriatem hydrargyri* rearum.
oxygenatum, *mercurium solubilem* HAHNEMANNI,
balnea tepida, *decocta lignorum* ac *acidum nitri-*
cum

24) *Aethiops antimonialis*.

25) E. c. cum *herba veronicae beccabungae*, *fumariae*
officinalis, *sisymbrii nasturtii*, *cochleareae officinalis*, etc.

cum potiora impetiginum venerearum esse auxilia.

Arsenicum ²⁶⁾ nunquam hîc tentavimus.

C. impe-
tig. spas-
modica-
rum.

33. Impetigines, quas ex diathesi *spasmodica* derivavimus, diversam pro renata curam expetunt.

Spasmus, in cutem saeviens, remediis *externis emollientibus*, additis, si opus sit, *narcoticis*, tollendus. Intus remedia, quae leniter transpirationem movent, ac simul nervorum nimiam sensibilitatem obtundunt, e. c. *pulvis ipetacuanhae cum opio*, connubium *antimonii cum extracto hyoscyami nigri*, propinantur. Praeterea ad secretiones a spasmo cohibitas respici, ac, secundum rerum positiones ad *hirudines*, ad *purgantia*, ad *diuretica* et ad *tonica* confugi oportet. Inter haec *cortex cinchonae officinalis* ²⁷⁾, magisque adhuc *ferum*, inprimis in *aquis mineralibus* ²⁸⁾, pro potu

26) OTTO *Philadelphical medical museum* 1804. I. Vcl. p. 47. *Sammlung auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 22. B. 2. St. S. 242.

27) L. c.

28) E. c. *fons Cudovens* (MOGALLA über den Brunnen zu Cudowa. *Schlesische Provinzialblätter* 1797 2. St. S. 463), — *f. Freudenthaliensis* (*Physico-chemisch-chemische Untersuchung des Freudenthaler Sauerbrunnens in Schlesien. Troppau* 1794), — *f. Imnauensis* (KLAPROTH *Untersuchung der Mineralquellen zu Imnau.* Vid. CRELL's *chemisch. Annal.* 1792. 4. St. S. 333), — *f. Schwalbacensis* (FENNER über *Schwalbachs heilsame Quellen.* 1800), — *f. Spadanus* (SANBERG *essai sur les eaux minérales ferrugi-*
neuses

et balneo adhibendis, contentum, non neglectis animi pathematum moderamine, corporis debito exercitio, diaetaque selecta, potissimum lactea, prima loca occupant.

34. Conspicua ingenii acies ad *complicationes* C. complicatio-
num, impetiginum rite curandas requiritur. Nec regulae generales hic tradi possunt. Monebimus hinc solum, quod, cum diathesis *inflammatoria* et *gastrica* saepe impetiginum alterius indolis sociae fiant, cura *praeparatoria*, a qua scilicet complicationes illae, tum *sanguinis detractione*, tum *salvi purgatione* abiguntur, haud raro reliquis remediis praemittenda sit. Maxime porro ad *complicationem veneream* et *scorbuticam* in impetiginibus curandis respiciendum est, quarum illa *sulphur*, haec *mercurium* fere semper excludunt.

35. Ad

neuses de Spa. Liège 1783), — *f. Driburgensis* (BRANDIS *Anleitung zum Gebrauch des Driburger Bades und Brunnens. Münster 1792*) — *f. Pyrmontanus* (MARCARD *Beschreibung von Pyrmont. Hannover 1784*), — *f. Sadschüzensis* (REUSS *chemische Untersuchung der Herrschaft Neudorf im Saatzter Kreis. Dresden 1798*), — *f. Schwelmensis* (Ueber den Schwelmer Gesundbrunnen, von L. CASTRINGIUS und C. H. STUCKE. Dortmund 1800). *F. Krumbachensis* (Das Krumbacher Heilbad. Von WEZLER. Augsburg 1811. — Nachtrag zur Uebersicht der vielen reichhaltigen Mineralquellen im Königr. Bayern, Weimar 1813).

C. retro-
cessus im-
petig.

35. Ad *revocandas* sive ad *cutem pellendas* im-
petigines praepostere fugatas vel aegre prorumpen-
tes, *causae* retrocessus, vel defectus efflorescen-
tiae, ratio habenda est. Quocunque in casu *ulcera*
artificialia, et vix non semper *balnea tepida*,
maximeque *thermae* tum *simplices*, tum *sulphureae*,
indicata sunt. Absente impetu inflammatorio, ir-
ritationem systemati cutaneo inferri juvat. Huic
scopo inservient: *vestes laneae* sive *tela cerata* cuti
nudae imposita, — *frictio* superficiei corporis, —
embrocatio partis, in qua impetigo desideratur, —
illinitio ope *tincturae melis* *cantharidum* et *cam-*
phora ²⁹⁾, — *caesio cutis cum urticis* ipsaque
psorae insitio. Ad *interna remedia* quod spectat,
ea potissimum morbo accommodari debent, quo
viscus a causa impetiginosa labefactatum laborat.
Praeterea saepissime *diapnoicis* locus est, inter
quae *antimonium* ³⁰⁾ iterum commendandum est.

29) HIRSCHL Briefe über verschiedene Gegenstände aus
dem Reiche der Arzneykunde. 3. Th.

30) WERLHOFF exhibebat: Rec. Pulveris antimonii crudi
unciam unam. Sacchari uncias tres. M. D. S. Bis de die
cochleare cofeanum. (Opp. med. T. III. p. 756).

CAP. II.

De Peticulis.

§. VII.

Definitio. Historia.

1. *Peticulae* ³¹⁾ sunt stigmata vel maculae, *Definitio.*
 varii coloris, subrotundae, discretae, magnitudi-
 nis circiter lentium, plerumque pruritu expertes,
 plurimorum morborum febrilium praecipue conta-
 giosorum, comites.

2. Nulla apud *Hippocratem* peticularum inve- *Historia.*
 nitur mentio: exanthema enim, de quo loquitur
 divus senex ³²⁾, quidquid dicant SPONIUS ³³⁾,
 LIND ³⁴⁾ alique, miliarium quidem, sed minime
 peticularum imaginem offert. Claram econtra pe-
 ticularum descriptionem apud *Aetium* ³⁵⁾ ex HERO-
 DOTO

E 2

DOTO

31) Germanice *Petechien*. GALL. *Petéchies*. Ross. *пятна*.

Pol. *Petocie*.

32) Lib. II. de morbis epidem. sect. III. Edit. Lind.
 p. 697.

33) *Aphorism. novi*. p. 136.

34) *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte*. 2. B. 4. St. S. 15.

35) *Tetrab. secund. sermo*. I. cap. 29.

NOTO invenimus, in quam sententiam et LANG³⁵⁾, WELSCH³⁷⁾, GRUNER³⁸⁾, SPRENGEL³⁹⁾ etc. descendunt. Seculo demum decimo quarto, de peticulis sub nomine *punctillorum malignorum* locutus est GADDESSEN.⁴⁰⁾ Genuina vero earum descriptio, fatente saltem RIOLANO⁴¹⁾, medico Parisiensi, seculo decimo quinto demortuo, JACOBO DESPARS⁴²⁾, debetur. Omnium autem medicorum attentionem sibi promeruerunt peticulae, quae febres, seculo decimo sexto Italiam, Galliam, Germaniam aliasque regiones depopulantes, concomitatae sunt, quarumque febrium diversae epidemiae doctissime a SPRENGELIO recensentur⁴³⁾. Varia apud varios tunc temporis auctores peticulae obtinuerunt nomina: *lenticularum* nempe, *puncticularum*, *purpurae* et *pestichiarum* (forte ab indole pestilentiali, quam febres peticulis stipatae exhibebant), unde probabiliter barbara vox *petechiarum*. Optime a seculo decimo sexto, ad hanc usque diem,

36) Epistol. medic. XV. Lib. II. p. 561.

37) Curat. propr. dec. VI. cur. I. p. 287. August. Vind. 1698.

38) Morborum antiquitates, p. 110.

39) Versuch einer pragmatischen Geschichte der Heilkunde. 3. B. p. 118.

40) SPRENGEL op. c. 2. B. S. 509.

41) Recherches sur les escholes de médecine p. 217.

42) SPRENGEL l. c. S. 544.

43) L. c. S. 118—124.

diem, de peticulis egerunt: FRACASTORI ⁴⁴⁾, RO-
BORETI ⁴⁵⁾, PETRUS A CASTRO ⁴⁶⁾, RICHA ⁴⁷⁾,
RAMAZZINI ⁴⁸⁾, BORSIERI ⁴⁹⁾, PINAROLI ⁵⁰⁾,
TROLLI ⁵¹⁾, CAMBIERI ⁵²⁾, GIANNINI ⁵³⁾, COYTARUS ⁵⁴⁾,
LE ROI ⁵⁵⁾, FODERE' ⁵⁶⁾, HASENOEHRL ⁵⁷⁾,
STRACK ⁵⁸⁾, STOLL ⁵⁹⁾, J. P. FRANK ⁶⁰⁾, SCHLICHT-
HORST ⁶¹⁾ et BALDINGER ⁶²⁾, qui ultimus cuncto-
rum

44) De morbis contagiosis Lib. II. cap. 6.

45) De peticulari febre Tridenti a. 1591. vagante. Trident.
1592.

46) Febris maligna punctularis, aphorismis delineata.
Veronae 1650.

47) Constitut. epidem. Taurinensis a. 1720.

48) Diss. de constitutione a. 1692. 93. 94.

49) Instit. med. pract. Vol. II. cap. X.

50) TARGIONI *Raccolte d'opuscoli medico-pratici*. T. 8.
p. 260.

51) Ibid. p. 224.

52) Ibid. p. 284.

53) *Della natura delle febbri*. Milano 1805.

54) *De febre purpura epidemica*.

55) *Premier mémoire sur les fièvres aiguës*.

56) *Mémoire sur les fièvres continues pétéchiiales*.

57) *Historia medica morbi epidemici, sive febris petechi-
alis, quae A. 1757—59. Viennae grassata est*. Vindob.
1760.

58) *Observationes medicinales de morbo cum petechiis*.
Carlsr. 1786.

59) *Ratio medendi*. Vol. III.

60) *Epitome*. Vol. III. p. 113.

61) *Diss. de petechiis*. Goett. 1783.

62) *Neues Archiv*. 3. B. 4. St. S. 358.

rum de peticulis, ad suum usque tempus, scriptorum, mentionem iniecit. Addi debent REUSS *), et WEDEMEIER **).

§. VIII.

Symptomata. Autopsia Cadaverum.

Symptomata.

I. Peticulae, quocunque in morbo compareant, *nulla* agnoscunt *symptomata prodroma* gentilitia. Legimus quidem apud RAMAZZINI ⁶³⁾, in epidemia Mutinensi peticulas annuntiatas fuisse a lassitudine lumborum et dorsi cum ardore faucium, genisque rubris; atque apud HASENÖRHL ⁶⁴⁾: in epidemia Viennensi, anxietatem circa praecordia, levem nauseam et vomituritionem iis praegressas esse; ast, eo quod symptomata hujusmodi omnium fere febrium graviorum prodroma aut familiaria esse consuescant, illa cum febre quidem, sed minime cum peticulis, nexum habuisse, defendimus. *Eruptio* perticularum contingit aliquando ante ipsam febrilium symptomatum evolutionem ⁶⁵⁾; hinc inde prima, secunda, tertia, plerumque quarta morbi die ⁶⁶⁾, non raro tardius, septima scilicet, interdum vel decima quarta.

Pro-

*) *Wesen der Exantheme. Aschaffenburg 1814. Erster Theil. Das Fleckfieber oder die Kriegspest.*

**) *De febre petechiali diss. inaug. Goett. 1812.*

⁶³⁾ L. c. §. 17.

⁶⁴⁾ L. c. p. 265.

⁶⁵⁾ BORSIERI l. c. §. 310.

⁶⁶⁾ Part. I. Vol. I. §. XLIX. 1.

Prorumpunt momento, primùm ad jugulum, ad pectus, ad internam brachiorum superficiem; dein ad dorsum, ad crura, ac tandem ad reliquas corporis partes, excepta plerumque facie. Interea vel in facie peticulas, praesertim in infantibus et feminis, imprimis ad palpebras, ad genas et circa mentum pluries vidimus, videruntque (STRACK ⁶⁷⁾), CALLISEN ⁶⁸⁾), J. P. FRANK ⁶⁹⁾) multaeque alii. Quandoque peticulae ordine inverso erumpunt ⁷⁰⁾), aut eruptio ad unam alteramve partem limitata cernitur. Peticulae labia, orisque cavum, nec non fauces cooperiisse, feruntur quidem, ast omnibus rite perpensis, maculas, de quibus loquitur ingenuus caeterum vir ⁷¹⁾), non fuisse veras peticulas, sed ecchymomata, apparet. *Copia* peticularum admodum varia; saepissime innumerae sunt. Nihilominus eae vix unquam confluunt et constanter *figuram* satis regularem, subrotundam exhibent, etsi ad basin interdum parumper, veluti gutta atramenti, chartae emporeticae inspersa, diffluant. Aliquando figuram stellae induunt

67) L. c. p. 18.

68) Acta Soc. Reg. Havn. T. I. p. 358.

69) Die sexta maii 1794, igitur post publicationem tertii voluminis epitomes, ubi se nunquam peticulas faciei vidisse, affirmat auctor.

70) SAGARIUS syst. morbor. sympt. cl. X. ord. I. gen. 4. spec. 4.

71) HERDER in HUFELAND's *Journal der pr. Heilkunde*. 9. B. S. 173.

duunt *). Maculae, quae evidenter et ita diffuunt, ut figuram regularem amittant, aut maculae magnitudinem lentium multum excedentes ad ecchymomata pertinent; verae enim peticulae solummodo punctula minuta, sive maculas, illis ex morsu pulicum similes, referunt, et vix unquam lentes magnitudine superant. Rarissime pruritu stipantur, vel epidermidem elevant, quo solo in casu, tactu percipi queunt. Econtra, saepe saepius peticulae ita sub cute sepultae jacent, ut difficulter et nonnisi per obliquam inspectionem cerni possint. Color earum ut plurimum puniceus, fuscus est, interdum vero violaceus, lividus, ater, vel etiam purpureus, coccineus. Purpureus color praesertim peticulis super epidermidem prominentibus ac prurientibus proprius est, unde earum similitudo cum *morbillis*, quam, praeter ROBORETUM ⁷²⁾ atque STOLLIIUM ⁷³⁾, et nos vidimus. Interdum in uno eodemque aegrotante peticulae varii observantur coloris; attamen, cutem inde marmoris instar variegatam fuisse, in ecchymomate quidem, nequaquam vero in solis peticulis observavimus. — Peracta peticularum eruptione, morbus primarius nunc suam pergit viam, nunc exasperatur, nunc leni-

*) BROCKLESBY *oeconomical and medical observations*. Lond. 1764. p. 199. — BRÜCKMANN *prakt. Bemerkungen über die Wechselfieber in HORN's Archiv*. 1812. Jan. Febr. S. 134.

72) L. c. cap. XI.

73) L. c. p. 120.

venitur. Hoc ultimum, etsi certe rarissimum, FRACASTORI ⁷⁴⁾ et HASENOEHL ⁷⁵⁾ viderunt. *Efflo-*
ratio peticularum per tempus paene indetermina-
tum protrahitur. Nonnunquam primo nychthemero jam evanescent, alias per totum morbi curriculum vigent, aut ad convalescentiam usque perstant ⁷⁶⁾. Fugatae peticulae hinc inde redeunt iterumque redeunt, quin ob id morbi mutatio necessario contingat. Sunt tamen, qui sub regressu peticularum augmentum mali viderint ⁷⁷⁾. Peticulae in totum fugatae *nullum* in cute *vestigium* relinquunt. PETRUS quidem a CASTRO de *desquamatione* post peticulas loquitur ⁷⁸⁾, credimus interim, secessum epidermidis, convalescentiae febrim typhodum familiarem ⁷⁹⁾, peticulis ab hoc scriptore tributum fuisse.

2. Vidimus quidem peticulas in cadaveribus ^{Autopsia}
superstitibus, nunquam vero easdem post mortem ^{cadaverum.}
primum comparentes, de quibus, inter alios, FORESTUS ⁸⁰⁾ testatur, observavimus. Probabili argumento hae nihil nisi ecchymomata, haud raro sub ipso mortis articulo prorumpentia ⁸¹⁾ fuerunt. Affirmat

DIE-

74) L. c. cap. 7.

75) L. c. cap. 2.

76) Acta mea clinica. Vol. I. cap. 3. p. 51.

77) BORSIERI l. c. §. 313.

78) L. c. sect. 4. §. 38.

79) P. I. Vol. I. §. XLIX. 9.

80) Obs. et curat. medicae. T. I. Lib. VI. obs. 37.

81) Cap. de ecchymomate.

DIEMERBRÖECK, peticulas apicem in cute habuisse, cum basi vero profunde, ita ut fere conum efficerent, ad ossa penetrassé⁸²⁾. STOLLIUS vero hunc auctorem cum peticulis ecchymómata confudisse objicit⁸³⁾, nequaquam vero negat, *peticulas dari internas*, quas autopsiá cadaverum ad pleuram, pericardium, cor ipsum, diaphragma, meninges demonstravit, quarumque existentiam et SCHLICHTHORST comprobavit⁸⁴⁾. Hujusmodi autem peticulae internae nullam cum externis communicationem alunt. Sedem peticularum in rete vasculare et quidem in arterias, ad systema vasorum capillarium pertinentes, posuit MARCUS⁸⁵⁾. Cerebrum in morbis petechialibus inflammari, contendit JEMINA *). Idem de arachnoidea asserit REUSS **).

§. IX.

C a u s s a e.

C. praedis-
ponentes.

1. Quamvis peticulae nulli aetati nullique sexui parcant; attamen eae rarius infantes, senes, et feminas aggredi solent.

C. excitantes.

2. Si ex morbis, in quibus peticulae observantur, ad earum *caussas* arguere liceat; has tum in

82) De peste, Lib. IV. hist. 32.

83) L. c. P. I. sect. cadav. 8.

84) L. c. p. 12.

85) L. c. S. 398.

*) BRERA *Giornale di medicina pratica*. Vol. 3. 1815.

**) L. c.

in contagium typhodes, tum in saburras pri-
marum viarum locari oportebit.

3. Ad *causam proximam* quod spectat, poni-
tur ea vulgo in sanguinis guttam, in rete muco-
sum cutis effusam, unde quaevis peticula pro par-
vo habetur ecchymomate. Opinio haec ab analo-
gia peticularum cum morsibus pulicum, cum ma-
culis scorbuticis, et a societate, quam facile cum
haemorrhagiis ineunt, comprobari videtur, atque
optime sic originem peticularum per hypotheses
variorum systematum explicari licet. Nunc enim
explicatur per solutionem et corruptelam sanguinis,
nunc per laxitatem et atoniam solidorum, nunc
per astheniam, nunc per defectum oxygeni et ni-
miam carbonici in humoribus copiam etc. Verum
dum perpendimus, peticulas constanter figuram
subrotundam offerre, eas vix unquam inter se
confluere, atque uno fere temporis puncto saepe
erumpere et evanescere; id saltem, quod characteri
febrili et plerumque contagio alligatae sint, pro-
prium habere censemus. Quid enim de *peticulis
chronicis* cogitandum sit, alio loco ⁸⁶⁾ trademus.
Si hypothese tantillum indulgere liceret, non alieni
foremus, peticulas ex specifica secretionem vasorum
capillarium in cute, a causa, statum medium in-
ter inflammationem et haemorrhagiam tenente, re-
petere, quae opinio, quodammodo cum ea SWIE-
TENII

86) Cap. de ecchymomate.

TENII ⁸⁷⁾ conveniret. Nec ea admodum a REUSII hypothesis differt.

§. X.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.

1. Peticulae confundi possunt cum *morsibus pulicum*, cum *miliaribus rubris*, cum *morbillis* cum *lentigine aestiva*, et cum *ecchymomate*.

Distinctio
a morsibus
pulicum.

2. Peticulae a *morsibus pulicum* distinguuntur: quod hī, saltem recentes, punctum in medio offerant, quodque sub compressione digiti evanescant. *Recentes* dicimus, nam alias maculae, ex morsibus pulicum natae, peticulis ita sunt similes, ut nonnisi habita ratione immunditiei, anni temporis insectis faventis etc. a se invicem distinguantur. Diagnoseos haec difficultas eo, quod utraeque maculae societatem inire queant, magis magisque augetur.

P. exanth.
symptomaticum.

3. Peticulas ad exanthemata *symptomata* ideo cum LOUBERTO ⁸⁸⁾, CULLENIO ⁸⁹⁾, MACBRIDIO ⁹⁰⁾, BERGIO ⁹¹⁾ et FRANKIO ⁹²⁾ revocavimus: quod studio invasionis, gentilitiis symptomatibus instructo, destituantur, — quod tempore incerto erumpant, —

quod

87) Comment. T. II. p. 404.

88) Histoire de la société R. de médecine a. 1776. p. 529.

89) Gen. morbor. ord. 3.

90) Introductio methodica in theoriam et praxin. T. II. cap. XI.

91) Acta academ. scientiarum Sussic. Vol. XXVIII.

92) L. c.

quod absoluta eruptione, nulla mutatio constans et conspicua in morbo contingat, — quod stadium efflorescentiae haud stabile sit, — quodque in diversis morbis occurrant. Verum non reticendum est, LEROY⁹³⁾, BORSIERI⁹⁴⁾, GIANNINI⁹⁵⁾ aliosque praesertim inter recentiores *) contrarium defendere, peticulasque pro exanthemate *primario* propterea declarare, quod aequo jure febris, pro symptomate peticularum, quam peticulae, pro symptomate febris, haberi possit, quodque eruptio regularis et constans exanthematis, (testantibus scarlatina, morbillis et variolis, hinc inde eruptione prorsus adeo destitutis) ad morbum primarium constituendum, absoluta non requiratur. Argumenta hujusmodi, per examen morborum diversorum, in quibus peticulae quatenus symptoma obveniunt, magis magisque diluentur.

4. In *febre intermittente*, cujus, sub nomine *P. in febr. petechizantis*, mentio jam injecta est⁹⁶⁾, peticulae, *intermittentibus*, ut pluries in Insubria vidimus, vigente frigoris stadio erumpunt, durante calore perseverant, et cum sudore, ad ingressum novi paroxysmi usque, evanescent. Interim, num ad peticulas, num vero ad ecchymomata pertinuerint hae maculae, dubitari licebit. Quomodocunque vero res haec

93) L. c. p. 215.

94) L. c. §. 310.

95) L. c. cap. 6.

*) REUSS.

96) P. I. Vol. I. §. XXIV. 2,

se habeat, in diagnosi febris intermittens sive petechizantis sive ecchymomaticae, ne morbum cum *febre continua*, peticulis sive ecchymomatibus stipata, confundamus, cavendum est. Facilius huic errori locus erit, ubi febres hae primis morbi diebus conspicuis remissionibus insignitae sunt, aut ubi aeger in nosocomio decumbens atque febre hucusque intermittente laborans, nunc a typho petechiali corripitur. Egregie de hoc argumento RICHIA et BORSIERI ⁹⁷⁾ scripserunt.

P. in febr.
typhodi-
bus.

5. Peticulas in *febribus typhodibus* vulgares esse, monuimus ⁹⁸⁾. Mirum hinc non est, et probe sub librorum lectione adnotandum, quod scriptores, peticulas pro morbo primario habentes, cuncta febrium illarum symptomata, quasi ad exanthema pertinerent, exposuerint. — Peticulae in typho ut plurimum ad aspectum luridum prae se ferunt ac saepe profunde in cute sepultae jacent.

P. in febr.
gastrica.

6. Plerumque contrarium in *febribus gastricis* contingere solet; hic enim est, ubi potissimum peticulas illas rubras et super cutem elevatas conspeximus, quae peticulae, morbillorum instar florentes, *purpurae* nomen a nonnullis obtinuerunt ⁹⁸⁾. Cave igitur, ne ex magnitudine peticularum malignam morbi naturam arguas, aut mox ex earum praesentia, ad febrem typhodem concludas.

⁹⁷⁾ L. l. c. c.

⁹⁸⁾ FRANK l. c. p. 118. — Kieser in HUFELAND'S *Journal der pr. Heilk.* 1812, S. 36.

7. De

7. De peticulis, *exanthematum primariorum* P. aliis in
 et *phlegmasiarum* sociis, hos morbos illustrando morbis.
 loquemur.

§. XI.

Prognosis. Cura.

1. *Prognosis* febrium, peticulis stipatarum, *Prognosis.*
 ex illarum magis natura, quam ex his desumen-
 da est, quin tamen hoc, quominus peticulae,
 instar aliorum symptomatum, pro *signo* habeantur,
 impediat. — Peticulae, aut saltem maculae
 peticulares, in *featribus intermittentibus* non in-
 iustam de *perniciosa* harum indole suspicionem
 movebunt. In *featribus vero typhodibus* peticulae
 potissimum mali ominis esse solent: dum ante
 quartum diem, et magis adhuc, dum ante reliqua
 symptomata febrilia evolvuntur; dum vix evolutae,
 iam evanescent; dum eruptio ad unum duntaxat
 partis locum limitatur; dum sub cute latent, aut
 tantillum diffluunt⁹⁹⁾; dum minimae et copiosae
 sunt, dumque colore violaceo sive nigro instruun-
 tur. Exceptiones tamen haud paucas et ista patiun-
 tur. Sic, in epidemia a TROLLI descripta, omnes
 quibus peticulae *secundo* die proruperant, mitiorem
 breviorumque morbum passi sunt. Periculo
 magno peticulae *rubrae stipatae* erant apud LÉO-
 WIGIUM¹⁰⁰⁾. In genere, incertissimum ex solo
 peticularum colore fertur iudicium. Mutatur
 enim

⁹⁹⁾ STRACK l. c. p. 26. 28.

¹⁰⁰⁾ Adversaria medico-practica. Vol. I. Part. I. p. 35.

enim hic vel unius horulae spatio et quidem, ut LINDIO videtur, a cubiculi mutata temperatura, ab animi pathematibus, a potu meraco, sed uos nos suspicamur, ex caussa saepe plane incognita. Periculosissimae sunt peticulae in febribus typhodibus cum *complicatione inflammatoria* quam PETRI A CASTRO sententiam ultro confirmatam vidimus. Benignae econtra esse solent peticulae in *febris gastricis*, neque tamen hic eas *criticas* observavimus. Evanescent potius accedente crisi. Diarrhoeam spontaneam in peticulis interdum salutarem esse, testatur quidem RICH, at eam fatalem quoque fieri posse, omni jure animadvertit QUARIN¹⁾. Postremo, plus vice simplici, eundem hominem eas afficere posse²⁾, non reticenda est observatio.

Cura. 2. Ad *praecavendas* peticulas, praecepta adversus febres, imprimis typhodes, exposita³⁾, sequamur oportet. In *febre intermittente* sic dicta *petechizante*, a *cortice cinchonae*, priusquam de absentia complicationum certitudinem habeamus, cavendum, tunc autem idem cortex eo, quod ex neglecto morbo transitus in febrem continuam timendus sit⁴⁾, audacter exhibendus est. *Unguentum mercuriale* a GIANNINI adversus peticulas in febri-

1) De febribus. p. 112.

2) Ter eandem personam a peticulis correptam vidit ROBORETUS (l. c. cap. XI), bisque nonnullos custodes aegrorum in Nosocomio Vindobonensi, ego ipse conspexi.

3) P. I. Vol. I. §. LV.

4) BARONIO *istruzione sull' epidemia di Freno 1804.*

febris typhodibus nuper commendatum ⁵⁾), ex mera hypothesis laudari supponimus. Praesentia peticularum in *febrium typhodum* cura nihil certe immutat, neque adpersioni frigidae adversatur ⁶⁾). Vel indicata ob complicationem inflammatoriam *venae sectio* ⁷⁾), non obstantibus peticulis, institui potest. Instituerunt eam PETRUS A CASTRO ⁷⁾), HAEN ⁸⁾) alique. „Inprimis, inquit BORSIERI, ad faucium inflammationem respicere oportet. Si haec magna, venae sectio sine periculo omitti non potest ⁹⁾).“ — Salutaris revera sanguinis missio, hac sub rerum positione, in epidemia a. 1733. Edinburgi grassata, nec non in ea, de qua PINAROLI egit, observata fuit. Quam caute vero cruor hic mittendus sit, BORSIERIUM non latuit ¹⁰⁾). Sub re dubia, ad *cucurbitulas cruentas* potius confugiendum est. Nunquam hae nocuere in Mutinensi peticularum constitutione, in qua venae sectio plerumque fuit contraria. Sub *gastrica* febris peticularis natura, eadem, ac si ex-anthe-

5) L. c. p. 369.

*) P. I. Vol. I. §. LV. 3. REUSS l. c. 3 Absch. §. 153.

6) Ibid. 37.

7) L. c.

8) Rat. medend. T. IV. c. 6.

9) L. c. §. 355.

10) L. c. §. 354 et §. 357.

11) BORSIERI l. c. §. 353.

anthema deesset, medendi ratio manebit *). Si complicatio fuerit *inflammatoria temperaturae modicae* praecipue studendum est **). In genere, grassantibus febribus peticularibus, probe explorandum, num genius morbi epidemici forte methodum expectativam potius, quam activam exposcat. „Experientia enim saepissime demonstravit, eos qui naturae rem omnino commiserunt, felicius faciliusque de morbo triumphasse; — quod documentum debet esse iis, qui nunquam desinunt suos aegros medicamentis aliis atque aliis opprimere 11)“.

CAP. III.

De Miliaribus.

§. XII.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. *Miliaria* 12) sunt papulae, saepeque pustulae, figurae seminum milii, in diversis morbis acutis, praeviis plerumque febris exacerbatione, pectoris oppressione et sudoribus copiosis ac foetidis, prorumpentes.

Hir-

*) REUSS l. c. §. 180—198.

**) REUSS l. c. §. 169. Ast, ne quid nimis!

12) GERM. *Friesel*. GALL. *La miliaire*. ANGL. *Rash*. ROSS.Просовидная сыпь. POLON. *Fryzle*, *prosowa wysypka*.

2. HIPPOCRATEM miliaria descripsisse, jam Historiam monuimus ¹³⁾. Optime id eruditus atque elegantissimus scriptor TRILLER demonstravit ¹⁴⁾. Absoluta tamen illarum notio, seculo decimo septimo debetur, quo accurate de iis locuti sunt: RIVERRIUS ¹⁵⁾, NEUCRANTZ ¹⁶⁾ et WELSCH ¹⁷⁾, quorum ultimorum auctorum ille miliaria *Lubecae*, hic *Lipsiae*, in pernicioso puerperarum morbo regnantia, descripserunt. Magis magisque miliarium doctrinam seculo decimo octavo illustrarunt SALZMANN ¹⁸⁾, QUESNOY ¹⁹⁾, BARKER ²⁰⁾, FANTONI ²¹⁾, GASTELLIER ²²⁾, ALLIONI ²³⁾, BORSIERI ²⁴⁾,
F 2 J. P.

13) Cap. praeced. §. VII. 2.

14) Exercitatio pathologico-philologica de febre miliari, potissimum feminarum, priseis medicis graecis haud incognita, ad quaedam Hippocratis loca illustranda. Opusc. med. Vol. II. p. 326. Edit. KRAUSII. Frcf. 1766.

15) Prax. med. Lib. XVII. sect. 3. cap. I. obs. 21.

16) De purpura liber singularis. Lubec. 1648.

17) Historia medica novum istum puerperarum morbum continens, qui ipsis *der Friesel* dicitur. Lips. 1655.

18) Historia febris miliaris albae Argentoratum et viciniam ante biennium infestantis. Argent. 1736.

19) *L'art de guérir par la saignée*. Paris 1736.

20) *Observations on the present epidemic fever*. Lond. 1741.

21) Specimen observationum de acutis febribus miliaribus. Nissa 1762.

22) *Essay sur la fièvre miliaire*. Paris 1773. — *Sur la fièvre miliaire des femmes en couche*. Montarg. 1779.

23) Tractatus de miliarium origine, progressu, natura et curatione. August. Taurinorum 1758. Altera editio. a.

1792,

J. P. FRANK ²⁵⁾ alique infra commendandi scriptores. Praesenti seculo memorabilis est febris, miliaribus stipata, quae a. 1801 *Wittenbergae* grassabatur, atque graphice a KREYSSIGIO descripta fuit ²⁶⁾.

§. XIII.

*Symptomata. Autopsia cadaverum.*Sympto-
mata.

1. Miliaria plerumque a febris exacerbatione, a pectoris oppressione et a sudoribus copiosis ac foetidis *praecedi*, jam dictum est. Febris exacerbatio ut plurimum cum horripilatione orditur, quae in genere aegris hinc, vel minima porrecta occasione, admodum familiaris est. Subsequens aestus saepe saepius non solum pectoris oppressione, sed et peculiari anxietate, jactatione, doloribus vagis atque crampis potissimum manuum et surarum, stipatur. Sudor saepissime acidum spirat. Praeter enarrata prodroma, dantur alia, certis solummodo epidemiis propria. Hujusmodi sunt: pulsus post novem, undecim, aut sedecim ictus inter-

mit-

1792, cui accessit ejusdem auctoris conspectus praesentanae morborum conditionis. 1793.

24) Instit. Vol. II. cap. XI.

25) Epitom. Vol. III. p. 129.

26) *Abhandlung über das Scharlachfieber nebst Beschreibung einer sehr böartigen Frieselkrankheit. Leipz. 1802.*

Vid. HUFELAND's *Journal der pr. Heilkunde*, 13. B. 3. St. S. 41.

27) GASTELLIER l. c. p. 33. 84.

mittens ²⁷⁾, stillicidium sanguinis e naribus ²⁸⁾, deglutitio impedita ²⁹⁾, sitis absentia ³⁰⁾, potus aversio ³¹⁾, hydrophobia ³²⁾, motus convulsivi ³³⁾, somnus perturbatus, agrypnia, lipothymiae, molesti mingendi conatus, urina pallida ³⁴⁾ aliaque minus adhuc constantia, a BALDINGERO ³⁵⁾ collecta. Incerto admodum tempore miliaria *prodire* solent; nunc enim in primo morbi limine ³⁶⁾, nunc die tantum trigesimo quarto ³⁷⁾, plerumque quinto, sexto, aliquando, ut vidimus, vigesimo primo, interdum in ipso articulo mortis ³⁸⁾. *Eruptio*, praevio saepe cutis pruritu, locum habere solet, primum ad latera colli, ad mammas, ad regionem epigastricam et ad superficiem internam brachiorum, dein ad dorsum, ad abdomen inferius, atque ad reliquum demum corpus, rarissime tamen ad faciem et nunquam ad partem capillatam capitis. Alio interim ordine miliaria interdum prorumpunt.

Ut.

28) GMELIN de febre miliari. Tubing. 1752. p. 45.

29) BRENDÉL de cognoscendis et curandis morbis. T. II. p. 253.

30) BARAILLON in *mémoires de la Société Roy. de médecine*. T. I. p. 193. Paris 1779.

31) BORSIERI l. c. §. 392.

32) KREBS in BALDINGER's *Magazin f. Aerzte*, 6. B.

33) GMELIN l. c.

34) FRANK l. c. p. 134.

35) L. c. 5. B. S. 295.

36) KREYSSIG l. c. S. 61.

37) BORSIERI l. c. §. 394.

38) GMELIN l. c. p. 47.

Ut plurimum eruptio per repetita conamina, rarissime enim uno temporis puncto per universum corpus ³⁹⁾, contingit. *Copia* miliarium plerumque innumerabilis. Nihilominus rarius et nunquam in universa corporis superficie ⁴⁰⁾ confluent. Cutis, cui miliaria insident, color ut plurimum non mutatur. *Volumen* miliarium diversum est. Tam exigua ea invenimus, ut oculorum aciem fugerent et, rite monente MEAD ⁴¹⁾, non nisi tactu perciperentur. Alias miliaria magnitudinem seminum milii excedunt atque ad eam lentium accedunt. Vidimus talia descripsitque CAMERARIUS ⁴²⁾. Nunquam vero maxima illa miliaria, de quibus hinc inde in fastis medicis mentio fit ⁴³⁾, quaeque procul dubio ad *bullas* pertinebant, observavimus. Miliaria, quae sub forma *papularum* prorumpunt, ut plurimum, saltem ab initio, *colore rubro* instruntur: ut plurimum dicimus, nam et *alba* observata fuere ⁴⁴⁾. Miliaria, e contra, formam *pustularum*

39) KREYSIG l. c.

40) Miliaria in nonnullis locis confluentia vidi cum GOELICKE (de purpura alba confluyente. Erfurt. 1740) et STÖRK (ann. med. I. p. 66).

41) Monita et praecept. pract. p. 14.

42) Aegra purpura alba majori laborans. Diss. Tubing. 1723.

43) Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. 1. B. 1. St. S. 64. — BORSIERI l. c. §. 387.

44) BECKER Diss. de purpura alba maligna et benigna seu chronica. Halae 1758.

larum referentia, plerumque *alba* sunt. *Miliaria* hujusmodi nonnunquam *basi rubra* et *apice albo*, suppurato, obveniunt. Liquidum in miliaribus pustulosis contentum nunc est diaphanum, coloris margaritae (*Miliaria crystallina*)⁴⁵⁾, nunc serosum (*M. aquosa*)⁴⁶⁾, nuncque purulentum, quasi lacteum (*M. purulenta, lactea*)⁴⁷⁾, nunquam vero acre, rodens, foetens. Saepe variae miliarium formae simul uno eodemque in aegro occurrunt⁴⁸⁾. Peracta miliarium eruptione, febris vel eodem pacto continuat, vel increscit, vel infringitur, quod ultimum interdum ita evidenter contingit, ut ea fere critica dici queant. *Miliaria* autem in totum critica non vidimus, viderunt quandoque M. COLLIN⁴⁹⁾, QUARIN⁵⁰⁾ etc. *Duratio efflorescentiae* plane incerta, nunc enim ad paucas solum horas, nunc ad plurimos dies protrahi solet. — *Miliaria papulosa*, sensim sensimque in *furfura*, raro in *squamas*, desinunt. *Miliaria pustulosa* interdum flaccida fiunt, resorpto scilicet liquido, quo distendebantur, alias disrupta, *squamas* duriores

45) STORCH Prax. Stahlian. p. 744. — HAMILTON tract. de febre miliari. Ulm 1712. cap. I.

46) Collect. Wratislav. a 1724. mense Maii. p. 485.

47) Ephem. natur. curios. Dec. III. a. 7. 8. obs. 206.

48) KREYSSIG l. c. S. 60.

49) Epistola ad BALDINGERUM, qua demonstratur, pustulas miliares male factitias et symptomaticas dici. Viennae 1765.

50) L. c.

res, fere *crustas* exhibent. Hinc inde exanthema hoc, nullo relicto vestigio, evanescit.

Autopsia
cadaverum.

2. Observationes eorum, qui cadavera hominum cum miliaribus demortuorum dissecuerunt, ad trutinam revocantes, nil plane, quod cum iis cohaereat, invenimus. Continent enim historiae sectionum vel reliquias variorum morborum, quorum symptomata miliaria fuerunt, e. c. febris puerperalis, metritidis; vel nil prorsus, quod in sensus caderet, e. c. post typhum. ELLERUM miliaria detexisse *interna*, superficiem scilicet hepatis et intestinorum occupantia ⁵¹⁾, retinendum est.

§. XIV.

C a u s s a e.

C. praedisponen-
tes.

1. Miliaria potissimum in regionibus paludosis ⁵²⁾, vernali tempore, aetate media, in hominibus constitutionis laxae, vitamque sedentariam ducentibus, nec non in puerperis obvenire solent.

C. excitantes.

2. Excitari videntur miliaria a sanguinis jactura ⁵³⁾, a laesionibus nervorum ⁵⁴⁾ et imprimis me-

51) Observationes de cognoscendis et curandis morbis. p. 131.

52) E. c. Mantovae (*Astr* anno medico terzo, ossia storia delle malattie dell' anno 1783), Wittenbergae (KREYSSIG l. c. p. 95).

53) Jam CULLEN monuit, miliaria magis communia esse in feminis, largis menstruis obnoxiiis, et in viris, multo sanguine per vulnera orbatis. Et ego frequentius idem exanthema in peripneumoniis, ubi sanguis praeter modum mittebatur, conspexi.

medullae spinalis ⁵⁵), a cohibita lactis secretionē, atque a contagio typhi ⁵⁶). Opinio HAENII, qui ortum miliarium regimini sudorifero ac neglectae primarum viarum evacuationi adscripserat ⁵⁷), a contemporaneis suis ⁵⁸) et a posteriorum experientia ⁵⁹) satis reprobata est. Caeterum, sudores copiosos posse papulas et pustulas excitare, miliaribus similes (*hydroa*), quod nec HIPPOCRATEM latuit ⁶⁰) haud negandum est. Errorem in diagnosi vel ii commisisse videntur, qui miliaria ab usu interno arsenici ⁶¹), muriatis superoxygenati hydrargyri ⁶²) et acidi nitrici ⁶³) repetierunt.

3. Caus.

- 54) Miliaria visa sunt a BORSIERI post fracturas (l. c. §. 404), a WERLHOFF post laesiones tendinum et a J. P. FRANK post vulnera (Epit. l. c. p. 141).
- 55) Puella, quae ictus, spinae vertebrali illati, causa in convulsionē et hydrophobiam inciderat, copiosa miliaria mihi obtulit.
- 56) Non ipsa hinc miliaria, sed typhum, sub quo comparent, contagium exhalare, credo.
- 57) Theses de febribus. Vindob. 1760.
- 58) COLLIN l. c.
- 59) Praesenti aevo, quamvis magna pars medicorum, saltem Germaniae, febres solis fere calefacientibus pertractaverit, attamen miliaria haud frequentius quam antea comparuerunt.
- 60) Aph. 21. sect. 3.
- 61) SAUVAGES Nosol. T. I. p. 401. — DEGRANGE in *Recueil périodique*. n. 31.
- 62) FANTONI novum specimen observat. de ortu febris miliaris.
- 63) DEGRANGE l. c.

C. proxima.

3. Causam proximam miliarium quaesiverunt, nunc in acida humorum conditione ⁶⁴), nunc in putredine sanguinis ⁶⁵), nunc in principio subtili cum causa hydrophobiae affinitatem alente ⁶⁶), nunc in vermibus et insectis ⁶⁷), nunc in laesa excretionem uterina ⁶⁸); quarum hypothesium insularum partem majori, quam possidemus, patientia BORSIERI exposuit ⁶⁹).

§. XV.

Diagnosis.

Facilis confusio.

1. Sudores, stadium invasionis miliarium comitantes, non dudum timorem redeuntis febris sudatoriae Britannicae incusserunt ⁷⁰). In genere autem miliaria confundi possunt cum *peticulis*, cum *bullis*, cum *urticaria papulosa*, cum *zostere*, cum *exanthemate mercuriali*, cum *scarlatina mili-formi*, cum *morbillis*, cum *rubeola*, cum *hydroa*, et cum *herpete miliiformi*.

Distinctio a peticulis.

2. Inter *peticulas* eae duntaxat, quae morbillis similes sunt, cum *miliaribus rubris*, *papulosis*,

64) FR. HOFFMANN. RAMAZZINI.

65) DAMILANO. GASTELLIER.

66) ALLIONI.

67) GOELICKE Diss. observationes aliquot practico-clinicas, circa febrem vesicularem exhibens. Erf 1732.

68) BREFELD in HORN's Archiv für med. Erfahrung.

5. B. 1. H. S. 129.

69) L. c. §. 422—431.

70) FOURCROY médecine éclairée etc. Vol. 2. p. 47.)

confundi queunt. Error hic evitatur, habita ratione tum symptomatum prodromorum, tum morborum regnantium.

3. Sciendum autem est, *miliaria cum peticulis* Complicatio m. cum peticulis. coire posse. Connubium hujusmodi, de quo inter alios docte BORSIERI loquitur ⁷¹⁾, saepius a nobis in typho nosocomii Vindobonensis observabatur. Miliaria post peticulas erumpere solebant.

4. Miliaria ad exanthemata *symptomata* re- M. exanth. symptomaticum. vocamus: quoniam, uti mox palam fiet, in morbis admodum diversis prorumpunt, — quoniam eorum curriculum nequaquam constans est, — et quoniam nullam causam specificam agnoscere videntur. Nihilominus negari haud potest, miliaria quid peculiare, in symptomatibus prodromis habere. Caeterum nec haec constanter observantur ⁷²⁾, quamvis auctorum observationibus, ob id, quod haud raro *hydroa* pro miliari exanthemate descripserint, non aequa semper fides habenda sit.

5. *Febres intermittentes*, praecipue *tertianae*, M. in febr. intermittentibus. interdum exanthema offerunt, miliari saltem admodum simile, potissimum sub stadio sudoris efflorescens. Cavendum ob id, ne cum *hydroa sudamine* confundatur, ad quem errorem evitandum refert, maxime ad praesentiam sive absentiam symptomatum prodromorum miliarium respicere.

71) L. c. §. 406.

72) Sudores in miliaribus defuisse vidit BAUER (Primitia physic. med. Vol. II.), eosque nequaquam acidos fuisse observavit GESNER (*med. Beobachtungen*. 3. B. S. 125).

cere. Cavendum quoque, ne forte *febrem continuam*, miliaribus et conspicuis *remissionibus* stipatam, sicuti in Wittenbergensi epidemia saepe observata est ⁷³⁾, et sicuti saepe apud puerperas occurrit, pro intermittente habeamus, de quo argumento iterum BORSIERI legi meretur ⁷⁴⁾.

M. in febr.
typhodibus.

6. De miliaribus in *febris typhodibus* jam diximus ⁷⁵⁾. Hac in febre miliaria certe saepissime erumpere solent, ac in ea versamur opinione, praecipuas epidemias febrium miliarium malignarum, de quibus fasti medici loquuntur, nihil aliud, nisi febres typhodes, miliaribus insignitas, fuisse.

M. in febr.
gastricis.

7. Rarius miliaria *febres gastricas* comitantur. Observata tamen fuerunt, vel in ipsis *biliosis* ⁷⁶⁾, vidimusque ea aliquoties in *pituitosa*, ubi facile connubium cum *aphthis* iniverunt.

M. in febr.
catarrhalibus.

8. Miliaria a *febris catarrhalibus* non esse aliena, jam monuimus ⁷⁷⁾. Nec a praesentia talis exanthematis morbo primario malignitatis character imponitur. *Benignas* enim febres catarrhales, in quibus miliaria septimo morbi die prorumpabant, observavimus. In febribus catarrhalibus typhodibus ea plerumque longe tardius efflorescunt.

§. XVI.

⁷³⁾ KREYSSIG l. c.

⁷⁴⁾ Op. c. Vol. I. §. 178.

⁷⁵⁾ P. I. Vol. I. §. XLIX. 4.

⁷⁶⁾ BOUCHER in *Journal de médecine*. Sept. 1781. p. 272.

⁷⁷⁾ P. I. Vol. I. §. LXV. 3.

§. XVI. De miliaribus.

Prognosis. Cura.

1. Miliarium *prognosis*, ex indole morbi pri-
marii desumitur. Hoc in opere praecipue ad geni-
um epidemiae respiciendum est. Quocunque au-
tem in casu miliaria nunquam flocci pendenda
sunt. Caeteris paribus *bonum*: dum miliaria in
primo haud comparent morbi limine; — dum iis
comparentibus, symptomata prodroma (excepto
moderato sudore) evanescent, vel saltem multum
remittunt; — dum ipsa morbi primarii sympto-
mata ab eruptione miliarium leniuntur, praecipue
dum pulsus ex contracto fit expansus et urina ex
pallida tincta; — dum miliaria non admodum
exigua sunt; — dumque eruptio nec pauca et par-
tialis est, nec copiosa et universalis. Contraria
mala. Ita quoque repentina, sine nota caussa, in
pejus mutatio, vel magna anxietas et jactatio, vel
mortis, in aegris nec hypochondriacis nec hysteri-
cis, timor. Eruptiones miliarium, per plura co-
namina operatae, morbum plerumque longum prae-
sagiunt. Ex *colore* quidem miliarium decerni nil
potest; rubra tamen, saltem ad basin, albis prae-
feruntur. Econtra, pellucida, crystallina et lactea
deteriora haberi solent. Diarrhoea modica ut
plurimum proficua; serosa autem et vires poster-
nens mala. Nullum denique exanthema facilius
quam miliaria subsidet ac evanescit. Praecipue
hoc

hoc timendum est, ubi morbus ingravescit, imprimis symptomatibus nervosis, viscerum passionibus, vel, quod probe notandum est, affectione systematis muscularis, simul accedentibus.

Cura.

2. Quocunque in morbo miliaria occurrant, nihil ea in medendi methodo immutant. Utile interim esse censemus, nonnullorum remediorum in variis morbis, qui cum miliaribus incedunt, usum ad trutinam vocare. Et primum quidem de *cortice cinchonae officinalis*. Usus hujus corticis ALLIONI, a propria hypothesis conductus, vel in ipsa sic dicta *febre intermittente* miliari restrinxit ⁷⁸⁾, paulo vero infra ipse hic auctor, se duos aegros ob procrastinatam hujus remedii administrationem amisisse, fateri cogitur. KREYSSIG cinchonam vel in ipsa *febre continua* miliari laudat ⁷⁹⁾; — juxta haec laus erit, absente complicatione gastrica ac sub iisdem rerum positionibus, sub quibus insigne hoc remedium in typho commendavimus ⁸⁰⁾. Praesente vitio gastrico, miliaria, sicut in Wittenbergensi epidemia, *emetico*, aliunde indicato, nequaquam obstant. Utrum in morbis miliaribus *acida*, utrum vero *alcalina* exhibenda vel proscribenda sint remedia, cum armis prorsus hypotheticis inter medicos pugnatum fuit. Utrisque certe auxiliis, secundum indicationes

alibi

78) L. c. §. 210.

79) L. c. p. 109.

80) P. I. Vol. I. §. LV. 23.

alibi traditas ⁸¹⁾, locum esse, docet experientia. Idem de *moscho* valet, praesente anxietate, oppressione pectoris, singultu, pulsu contracto, urina pallida magnaue virium prostratione admodum commendando. Sub hac ipsa rerum positione *urias hydrargyri* multum laudatur ⁸²⁾. Adhibebatur jam a GESNERO cum *Ke mete* ad promovendam miliarium eruptionem ⁸³⁾. Immo remedium, olim in febribus miliaribus, sub nomine *pulveris tunquinensis* ⁸⁴⁾, admodum celebratum, virtutem suam a connubio *mercurii* cum *moscho*, repetiisse videtur. — *Camphorae* quidem laudes restrinxerunt de AGOSTINI ⁸⁵⁾, GASTELLIER ⁸⁶⁾ et BORSIERI ⁸⁷⁾, at secure eandem, modo recte indicatam ⁸⁸⁾, exhiberi posse, edocti sumus. Idem de *vesicatoriis* dicendum est, nunc laudatis, nunc stipuperatis, prout in diversis morbis, miliaribus stipatis, jure aut immerito adhibita fuere. A vesicatoriis enim aequae ac ab omnibus irritantibus sane

absti-

81) Ibid., §. LV. 15. 23.

82) KREYSSIG l. c. p. 110.

83) *Sammlung von Beobachtungen* 4. B. S. 176. 204.

84) Rec. *Cinabaris nativi*, *coccinellae* ââ grana viginti quatuor. *Moschi optimi* grana sedecim. M. f. pulvis, dandus pro una dosi, aut in duas dividendus. (VOGEL in acad. praelection. §. 141.).

85) *Osservazioni medico-pratiche intorno alle febbri miliari etc.* Novara 1755.

86) L. c. p. 362.

87) Op. c. Vol. II. §. 443.

abstinendum foret, si miliaria febrém comitarentur indolis *inflammatoriae*. Hoc in casu exanthema, de quo agitur, nec *venae sectioni* obstat, immo in epidemia miliari novariensi a. 1755, omnes, quibus vena non erat secta, morte plectebantur⁸⁸⁾. Aliis in epidemiis exempla extant contraria⁸⁹⁾. *Cucurbitulis cruentis*, etiamsi indicatis, ob vix evitandae refrigerationis periculum, hic raro locus esse potest. Nullo enim in exanthemate frigus, magis quam in miliaribus obest. Maxime hinc applicationem linteorum *aqua frigida* madefactorum ad extremitates, nuper in febribus miliaribus commendatam esse⁹⁰⁾ miramur. *Retrocessus* miliarium secundum regulas generales⁹¹⁾ curatur. *Convalescentes* regimini severo, eo quod miliaria vel sub proVecta jam convalescentia, interdum recrudescant⁹²⁾, subjiciendi sunt.

88) De AGOSTINI l. c.

89) ALLIONI l. c. §. 141.

90) HORN'S *Archiv für med. Erfahrung*. B. V.

91) §. VI. 14.

92) KREYSSIG l. c.

CAP. IV.

De Bullis.

§. XVII.

Definitio. Historia.

1. *Bullas* nuncupamus vesicas magnitudinis circiter amygdalarum, plerumque sero flavescente repletas, in nonnullis morbis febrilibus erumpentes. Definitio.

2. De febre, bullis stipata, sive de *febre pemphigode* jam apud HIPPOCRATEM legitur ⁹³⁾, at divi senis verba interpretari est arduum ⁹⁴⁾. Primum de bullis, sub nomine hydatidum, exacte scripsit CAROLUS PISO ⁹⁵⁾. Earum quoque obiter meminit MORTON, de febre sporadica, cum *vesiculis aqueis* per collum et pectus sparsis, loquens ⁹⁶⁾. Absolutam bullarum descriptionem THIERY ⁹⁷⁾ et LANG- Historia.

93) In sexto epidem. libro. Sect. I.

94) Vid. edit. Hippocr. CHARTERI T. IX. p. 38. et FOESII oecon. Hipp. p. 297.

95) De morbis a serosa colluvie et diluvie ortis. Obs. 149.

96) Appendix secundae exercitationis. p. 163. Opp. omnia, Genevae 1727.

97) Médecine expérimentale p. 134. Paris 1755.

LANGHANS ⁹⁸⁾ dederunt; quorum ille epidemiam a 1736 in exercitu Gallorum *Pragae* regnantem; — hic epidemiam, *Helvetiam* depopulantem, descripsit. Maxime medicorum attentionem ad bullas traxit SAUVAGES ⁹⁹⁾. *Pemphigi* iis nomen, quod dein plurimi de bullis scriptores immerito retinere, imposuit. Inter eos praecipue legi merentur: SELIGER ¹⁰⁰⁾, SCHROEDER ¹⁾, STEWART ²⁾, DICKSON ³⁾, UPTON ⁴⁾, CHRISTIE ⁵⁾, SALABERT ⁶⁾, RING ⁷⁾, BLAGDEN ⁸⁾, HALL ⁹⁾, MICHAELIS

LIS

98) Acta Helvetica. T. II. p. 260.

99) Nosol. cl. III. ord. I. gen. 3.

100) Ephem. nat. cur. an. vi. et vii. obs. 57.

1) Historia febris bilioso - pituitoso - putridae, quae ab initio decembris 1783 in variis Hassiae regionibus epidemice grassata est.

2) DUNCAN medical comment. Vol. VI. a. 1778.

3) Transactions of the R. Irish Academ. Vol. I. Dublin 1787. Vide *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte*. 13. B. S. 133.

4) Memoirs of the medical society of London. Vol. 3.

5) London medical journal Vol. 10. Part. 4. p. 36. Vide *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte* l. c. S. 491.

6) Journal de médecine Vol. 72. a. 1790. p. 66. Vide *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte* l. c. S. 544.

7) London medical Journal. Vol. II. Part. 3. p. 234. Vide *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte* l. c. S. 624.

8) Medical facts. Vol. I. p. 105. Vide *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte* 14. B. S. 673.

9) Transactions of medicine for the year 1798. By DUN-

LIS ¹⁰⁾, GARN ¹¹⁾, HENNIG ¹²⁾, WICHMANN ¹³⁾,
BRAUNE ¹⁴⁾ et SAVARY ¹⁵⁾.

§. XVIII.

Symptomata. Causae.

1. Bullae quidem absque certis symptomati-
bus *prodromis* ¹⁶⁾, nulla determinata morbi die ¹⁷⁾,
erumpunt, plerumque tamen aeger in loco, quo
eruptio imminet, dolorem urentem accusat. Accedit
Symptomata.

CAN. Vol. 3. p. 386. Vide *Samml. auserl. Abh. f. prakt. Aerzte* 18. B. S. 483. Medical records and researches. p. 283. Vide *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte* 20. B. S. 192.

10) HUFELAND'S *Journal der prakt. Heilkunde* 3. B. S. 187.

11) Ibid. 6. B. S. 359.

12) Ibid. 21. B. S. 121.

13) *Beytrag zur Kenntniss des Pemphigus*. Erfurt. 1791.

14) *Versuch über den Pemphigus und das Blasenfieber*.

Leipzig. 1795.

15) *Journal de médecine*. Vol. 22. Septbr. 1811. p. 203.

16) Praecessisse bullis sitim, pectoris et praecordiorum oppressionem (REIL *memorabilia clinica*. Vol. I. Fasc. 2. p. 147.) et dysuriam (SALABERT et SAVARRESY) refertur; huiusmodi interim symptomata ad febrem potius, quam ad bullas spectasse, opinor.

17) Omni jure DICKSON opinionem CULLENII, qui periodum eruptionis inter primum et tertium diem morbi collocavit, improbat. Bullas decimo sexto morbi die comparuisse vidi, atque UPTON febrem eruptionem secutam esse adnotat.

dit levis cutis rubor, sat late diffusus, aliquando sublividus, cui *eruptio* bullarum, ut plurimum celerime, hinc inde postridie tantum, succedit. Bullae, ab initio, saepissime pisi magnitudine cernuntur; maxima autem earum pars rapide ad volumen circiter amygdalarum increscit. Minores nucis avellanae, et majores nucis moschatae instar, nunquam vero ampliores, conspeximus, conspexerunt alii. Serum fere semper flavescens, inodorum continent. Bullas tamen, liquore puriformi repletas, vidimus. Ex serosis eae cruentae et ichorosae factae sunt apud STEWART. Absoluto *eruptionis* opere, pruritus et cutis rubor evanescent, excepto interdum halone rubro, sat diu bullas circumambiente. Nulli quidem corporis parti bullae parcent; saepissime tamen crura sibi eligunt; frequenter pectus, collum et brachia, nonnunquam, ut observavimus, dorsum, aliàs genas, frontem, partem capillatam capitis ¹⁸⁾, orificium meatus auditorii ¹⁹⁾, orisque cavum ²⁰⁾ adoriuntur. Immo, faucium dolor et diarrhoea cruenta, quibus aegri bullis affecti hinc inde laborant, exanthema hujusmodi tunc vel oesophagum cum reliquo tubo intestinali occupare verisimile reddunt. Suspicio haec quodammodo ab observationibus UPTON confirmatur. *Copia* bullarum aliquando exigua

est

18) BLAGDEN.

19) HALL.

20) BLAGDEN, LANGHANS et DICKSON.

est et tantum ad octo, decem, quatuordecim vesiculas extenditur; alias longe hunc numerum, quin tamen eae inter se confluant, excedit. Saepe in decursu morbi nihil immutat bullarum adparitio, nonnunquam cuncta inde symptomata vel augentur, vel imminuuntur, vel evanescent. Exanthema hoc non diu, et raro ultra nychthemera formam descriptam retinet. Enim vero saepe bullae, tum ex aegri decubitu, tum sponte, rumpuntur, vel resorpto sero, relinquuntur vacuae. Quocunque in casu, cuticula, quae circumferentiam bullae prius effecerat, flaccida redditur, atque sensim sensimque corrugatur, relictæ basi, instar carnis crudæ, rubra vel exsiccatura, vel tenuissima obscuraque crusta cooperienda. Quo tempore primæ bullæ evanescent, erumpunt novæ, atque ita res plures per dies, ne dicamus unam alteramve per hebdomadem, contingunt.

2. Infantes, juvenes, et feminae, bullis præcaussae. Eas connatas vidit OSIANDER²¹⁾, vel quarto a nativitate die erumpentes RING. MICHAELIS infantis sex mensium, ubera matris, herpete faciei detentæ, sugentis ac bullis affecti meminit. Hæ apud GARN variolas, et apud STEWART morbillos prope secutæ sunt. Ut plurimum vero bullæ morbos febriles ex inedia, ex humorum jactura et ex contagio comitantur²²⁾.

Ipsas

21) *Denkwürdigkeiten.*

22) Magna inedia laborabat exercitus Gallorum tempore epidemiac supra allatæ. Aegri SAUVAGESII bullis

Ipsas igitur bullas, quamvis contagio destitutas ac nequidem per insitionem communicandas, pro contagiosis declaratas fuisse, non mirum est.

§. XIX.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.

1. Bullae confundi possunt: cum *vesicis accidentalibus*, cum *miliaribus*, cum *erysipelate pustuloso*, cum *variolis abnormibus*, cum *varicella*, cum *zostere*, cum *hydroa* et cum *pemphigo*.

Distinctio
a vesicis
accidentalibus.

2. Accidit interdum, quod aegri, sive delirantes, sive soporosi, loca a vesicatoriis occupata cum digitis scalpant²³⁾, atque hos, a cantharidibus conspurcatos, aliis cutis partibus admoveant, quatione, ut *vesicae* oriantur, *bullis* plane similes, contingit. Caveri igitur oportet, ne hae pro symptomate morbi habeantur.

Distinctio
a miliaribus.

3. Maxima illa *miliaria*, de quibus fasti medici loquuntur, proprie ad *bullas* pertinuisse, jam monuimus²⁴⁾; cui errandi occasione sequentem hic utriusque exanthematis comparisonem opponimus.

Milia-

affecti, erant milites egeni et mendicantes. Aegra HENNINGII ergastulo inclusa erat. Proprii aegri omnes nosocomiales fuerunt, ac nonnulli nimis venae sectionibus exhausti.

²³⁾ P. I. Vol. I. §. XLIX. 4. not. 16.

²⁴⁾ Cap. praeced. §. XIII. 1.

Miliaria.

- a. Symptomata *prodroma* fere constantia agnoscunt.
- b. Morbus puerperis familiaris.
- c. Raro in infantibus locum obtinent.
- d. Eruptio solummodo a pruritu annuntiari solet.
- e. Efflorescunt ut plurimum ad *latera colli*, ad pectus etc.
- f. Saepe *papulas* referunt.
- g. Maximum volumen, illud *lentum* est.
- h. Colore sive rubro, sive albo, sive mixto instruuntur.
- i. Facile retrocedunt.

Bullae.

- a. Symptomatibus *prodromis* certis destituuntur, ac nunquam a copioso et specifico sudore praecedi solent.
- b. Unum solummodo exemplum in puerperis habemus ²⁵⁾.
- c. Saepius in aetate infantili obveniunt.
- d. Eruptio a *dolore ardente* plerumque praesagitur.
- e. Efflorescunt ut plurimum ad *crura*.
- f. Constanter *vesiculas* exhibent.
- g. Minimum volumen illud *amygdalarum* vel *pisi* majoris est.
- h. Colorem flavum, fere aurantiacum referunt.
- i. Nullum retrocessus exemplum habetur.

4. Bul-

25) FICK diss. de febre vesiculari ab obstructione lochiorum. Jenae 1726.

B. exanthemata symptomatizantia. 4. Bullae societatem inire solent cum febribus intermittentibus, cum typhodibus et gastricis, nec non cum arthritide, peripneumonia et dysenteria.

B. in febris intermittens. 5. Bullas a febribus intermittensibus haud alienas esse jam PISO observavit, bisque eas in tertiana duplici vidit BRAUNE. Nunquam vestigium earum hic deteximus, ac probe, ne hydroa, febribus intermittensibus familiare, cum bullis confundamus, cavendum est.

B. in febre typhode. 6. Bullae prae aliis morbis in febribus typhodibus obveniunt. Huc epidemiae a THIERY et LANGHANS descriptae et casus a SELLE²⁶⁾ nec non a nobis observati, pertinent. Ipse CULLEN bullas, quas senex tantum observavit, pro symptomate typhi declaravit.

B. in febre gastrica. 7. In febribus gastricis bullas viderunt SCHRÖDER, FINKE²⁷⁾ et CHRISTIE. Neque complicationem inflammatoriam hic respuunt, testante SALABERT.

B. in arthritide. 8. Exempla haud desiderantur, ubi in arthritide inopinate bullae oriebantur, cum tumore oedematoso totius corporis, pustulis magnis, ubique dispersis, sero puriformi repletis, cum delirio perpetuo, sudore profuso, excrementis involuntariis et eventu inter triduum funesto²⁸⁾.

8. Du-

26) *Beiträge* I. Thl. S. 100.

27) De morbo bilioso anomalo. p. 110.

28) *Acta Societ. Med. R. Havniensis*. Vol. I. p. 8.

9. Duobus in *peripneumoniae* casibus nos ipsi B. in peri-
 bullas conspeximus. Unus aegrorum antehac hepa- pneumo-
 titide laborasse videbatur, quod bullarum exem-
 plum memorabile apud J. P. FRANK legi meretur ²⁹⁾).

10. De bullis, in *dysenteria* obvenientibus, ex B. in dys-
 empla collegerunt BONTIUS ³⁰⁾, RENGIER ³¹⁾ aliique. enteriis.
 Ni fallimur, dysenteriae indoles typhodes erat.

§. XX.

Prognosis. Cura.

1. *Prognosis* bullarum ex indole morbi pri- Prognosis.
 marii desumendam esse, per se patet. Eas semel
criticas vidimus, viditque SALABERT. Infantes
 facillime morbum perferunt. De summo autem
 periculo bullae in febre typhode epidemica testa-
 ri solent. Ex absorptione seri, in vesicis contenti,
 nullum observavimus damnum.

2. *Cura* bullarum morbo primario prorsus ac- Cura.
 commodanda est. Infantes plerumque sine phar-
 macis a bullis liberantur. Praesente magna virium
 jactura, *cortex cinchonae officinalis* et *vinum* uno
 ore celebrantur. Immo MACBRIDE singulos infan-
 tes bullis affectos in Hibernia mortuos vidit, qui-
 bus cortex non fuerit porrectus, quod nostrae op-
 positum est experientiae. In epidemia Pragensi

acc-

29) Epitom. l. c. p. 265.

30) De medicina Indorum. p. 38.

31) *Museum der Heilkunde*. 2. B. S. 102.

acetum bezoarticum optime conduxit. Vigente diathesi gastrica, bullae ea potissime alvum evacuantia exposcunt, quae simul transpirationis officium promovent. Si natura peripneumoniae, bullis stipatae, venae sectionem expeteret, ea non obstante exanthemate, instituenda foret. Quocunque in morbo bullae compareant, secretionis urinae ratio habenda est. Bullae ipsae, quas aperiri nil vetat, nullis indigent remediis localibus.

CAP. V.

De Urticaria.

§. XXI.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. **M**aculae, aut tubercula, citissime prorumpentia, summe prurientia, basi inaequali, ac si cutis ab urticis caesa fuisset, instructa, sub frigore, plerumque evidentiora, fugacia, cum febre, *urticariam* ³²⁾ constituunt.

2. Cel.

32) *Germ.* Nesselausschlag. *Gall.* Fièvre ortiée. *Angl.* The nettle-rash. *Ross.* крапивная сыпь *Pol.* Pokrzywka.

2. CELSUS obiter, morbi cutanei sub nomine *Historia*.

aspéritudinis meminit, iis pustulis, quae ex urtica (vel ex sudore) nascuntur, similis ³³). Longe clarius SYDENHAM urticariam, quo loco *de altera febris erysipelatosae specie* locutus est, descripsit ³⁴). Ita quoque SENNERTUS, qui nomina arabica *esserae, sorae*, retinuit ³⁵). Serius idem exanthema apud varios auctores sub nominibus *purpurae urticae* ³⁶), *febris urticae* ³⁷), *porcellanae* ³⁸), *scarlatinae urticae* ³⁹) etc. obvenit. Optimi de eo scriptores sunt: HEBERDEN ⁴⁰), VOGEL ⁴¹), WICHMANN ⁴²), J. P. FRANK ⁴³) et KOCH ⁴⁴).

§. XXII.

33) Medicina Lib. I. cap. XXVIII. 15.

34) Opp. Sect. VI. cap. 6.

35) Med. Praxis. Lib. V. P. I. cap. 26. — CHEMNIZ
Diss. de essera Arabum. Hafn. 1703.

36) JUNKER Tab. 75.

37) VOGEL de cognoscendis et curandis etc. §. 158.

38) LIEUTAUD Synops. med. T. I. Lib. I. Sect. 4.

39) SAUVAGES Nosologia, cl. 3. ord. I. gen. 8. spec. 2.

40) Medical Transactions Vol. 2. Art. 11.

41) L. c.

42) Ideen zur Diagnostik. 3 Thl. S. 121.

43) Epit. Vol. III. p. 104. et praecipue: Interpretationes clinicae. Vol I. p. 405. Tubingae 1812.

44) Progr. de febre urticata. Lips. 1792.

§. XXII.

*Symptomata. Causae.*Sympto-
mata.

1. *Urticaria symptomatibus prodromis*, pro varia febris indole diversis, non destituitur. In genere huc pertinent: lassitudo, torpor, capitis gravitas, vertigo, lipothymia, pectoris oppressio, nec non tussicula. Sunt, qui et sudores acidos inter symptomata prodroma hujusmodi exanthematis referant; vehementer tamen timemus, ne ii miliaria pro urticaria habuerint. *Eruptio urticariae* rapide et magno cum pruritu contingit. Pruritus perstante exanthemate continuat, et ad scrofum potissime in dolorem desinit. Urticaria praecipue ad pectus, brachia, femora, faciem et interdum vel ad reliquum corpus prodit. KOCHIUS, cavitatem ipsam oris ab ea non immunem mansisse, refert. *Forma exanthematis varia est*. Pleurumque in *maculis* latis, interdum palmae magnitudinis, ad circumferentiam parumper prominentibus, in centro depressis, consistit. Alias maculae sunt, quasi inflicto cuti flagello. Utroque in casu, colorem ex pallido rubrum, in centro ferè albescentem prae se ferunt (*Urticaria maculosa*). Nonnunquam descriptis vix maculis, praecipue latis, *papulae* vel *phlyctenae* insident (*U. papulosa* seu *phlyctenosa*). Tandem macularum prominentium loco, interdum *tubercula*, nucis, quin immo palmae magnitudinis, excepto apice ex albo ru-

abente, colore obscure rubro atque basi irregulari
 instructa, obveniunt (*U. tuberculosa*). Urticaria
 plurimum erratica et fugax animadvertitur. Sub
 rigore, paucis concessis exceptionibus, eviden-
 ter fit. Duratio admodum varia est. Plerum-
 que, quin vestigium relinquit, evanescit. Rara
 nim exempla desquamationis, a KOCHIO animad-
 versa, dicenda sunt.

2. Urticaria praeprimis in juvenibus et femi- Causae.
 is, quolibet anni tempore, interdum epidemice,
 occurrit. Communissima illius *caussa* in trans-
 iratione suppressa locata est. Accedunt errores
 in diaeta, inprimis abusus liquorum fermentato-
 rum et alimenta *qualitate* peccantia, vel ob pecu-
 arem *idiosyncrasiam* adversa. Sic urticariae a
 mytilis jam mentio injecta est ⁴⁵). Testantur de
 eodem exanthemate (aliquando sub nomine erro-
 reo *scarlatinae*), ab esu cancri fluviatilis et fraga-
 riae vescae GRUNER ⁴⁶); — a carne suilla co-
 necta SCHEIDEMANTEL ⁴⁷); — ab aliis adhuc ci-
 vis WINTERBOTTOM ⁴⁸), a copioso cioccolatae
 et coffeae, quibus balsamus peruvianus admistus
 fue-

45) P. I. Vol. I. §. LIX. 3. Vide et: MOEHRING epist.
 ad WERLHOFFIUM in HALLERI collect. diss. pract.
 Vol. III. No. 38.

46) Programma de febre urticata a cancris fluviatilibus
 et fragariae vescae fructu. Jenae 1774.

47) *Frankische Beyträge* No. 35.

48) Medical facts and observations. Vol. 5. No. 6.

fuerat, potu Koch ⁴⁹⁾. Nec animi pathemata, praecipue terror et ira ⁵⁰⁾, — nec pharmaca e. c. semina arthemisiae contra *), valeriana ⁵¹⁾, — nec aquae minerales **), — nec venena ⁵²⁾, hic excludenda sunt. De contagio autem vix suspicio occurrit.

§. XXIII.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.

1. Urticaria confundi potest: cum *maculis* si-
ve *tuberculis* a *vegetabilibus* acribus et ab *insectis*
nonnullis excitatis, cum *miliaribus rubris*, cum
erysipelate, cum *furunculis*, cum *exanthemate*
mercuriali, cum *scarlatina*, cum *morbillis*, cum
rubeola et cum *urticatione*.

Distinctio
a maculis,
tuberculis
etc.]

2. Adspectu quidem conveniunt, sed pluri-
mis urticariae characteribus destituuntur, *maculae*
et *tubercula*, quibus *urtica dioica*, *rhus toxico-*
dendron ⁵³⁾, *cimex lectuarius*, aliaque vegetabilia
et

49) L. c. p. 12.

50) Post iram plurima urticariae exempla numero.

*) WENDELSTÄDT in HUFELAND's und HIMLY's *Journal der prakt. Heilkunde* 1813. Junius p. 61.

51) FRANK Epit. l. c. p. 111.

**) Virum noseo, qui, quoties aqua selterana utitur, toties urticariae obnoxius.

52) *Journal de médecine*. T. 37. p. 28.

53) WICHMANN vitium cutis, a rhoë toxicodendro excitatum, immerito ad zosterem revocavit.

et insecta, interdum setarum, pilorum subtilissimorum caussa ⁵⁴), ansam porrigunt. Cave igitur, ne hujusmodi cutis vitia, prorsus localia, cum urticaria, utpote cum exanthemate a morbosa conditione totius systematis pullulante, confundas.

3. *Urticaria papulosa* adeo *miliaribus rubris* Distinctio
a miliari-
bus rubris similis est, ut exanthemata haec nonnisi magnitudine papularum inter se invicem differre, opinatus fuerit SCHLACTIUS ⁵⁵). Maxime inde suspicio nostra, exanthema, multis sudoribus stipatum ac pro urticaria habitum, ad miliaria pertinuisse, confirmatur. Error hujusmodi eo facilius committitur, cum utraque exanthemata plerumque ab anxietate annuncientur, verumtamen alio sub respectu inter se differunt:

<i>Miliaria rubra.</i>	<i>Urticaria papulosa.</i>
a. Arcetur eruptio a frigore.	a. Promovetur ut plurimum eruptio a frigore.
b. Pruritus, si adsit, modicus est.	b. Pruritus semper magnus.
c. Eruptio plerumque per repetita conamina contingit.	c. Eruptio celerrime fit.
	d. Cuti,

54) De vitio cutis, urticariae simili, a pilis subtilissimis erucarum, et fabam quandam indicam (couhage) obducentium, testantur REAUMUR (mémoire sur les insectes T. 3.) et HEBERDEN (l. c. p. 135.).

55) Institut. med. pract. XI. §. 6.

d. Cuti, colore haud
mutatae, insident.

d. Papulae maculis
prominentibus insi-
dent.

U. exanthema sym-
ptomati-
cum.

4. Urticariam exanthema sistere *symptomati- cum*, observatio, quod illa in variis ac diversis inter se morbis obveniat, docet. Hujusmodi sunt: *febres intermittentes, rheumaticae, gastricae et typhodes*. Neque *variolarum* ⁵⁶⁾, *morbilorum* ⁵⁷⁾, nec non *icteri* consortium, urticaria respuit.

U. in febr. intermit-
tentibus.

5 Urticariam a *febris intermittentibus* non alienam esse, jam diximus ⁵⁸⁾. Plurima hujusmodi exempla apud PLANCHON ⁵⁹⁾, CLEGHORN ⁶⁰⁾, KOCH ⁶¹⁾, et FRANK ⁶²⁾ occurrunt, vidimusque eorum haud pauca *Ticini*, mensibus maio et junio a. 1794 et *Vilnae*, mensibus martio et aprili a. 1812: quibus scilicet temporibus febris intermittens urticata, fere *epidemica* fuit. Plerumque haec typum tertianae, sive simplicis, sive duplicis sequitur. Benignus morbus cum leni faucium inflammatione, ardore oculorum et tussi incipit; perniciosus vero anxietate, jactatione, li-

pothy-

56) WICHMANN l. c.

57) HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde*. 13. B. 3s St. S. 39.

58) P. I. Vol. I. §. XXIV. 2.

59) *Journal de médecine*. Juillet 1765. p. 75.

60) *Observations of the epidemical diseases of Minorca*. Lond. 1768.

61) L. c. p. 14.

62) *Interpretationes clinicae*.

pothymiis et singultu insignitur. Comparente exanthemate, symptomata huiusmodi ut plurimum evanescent. Compareret autem illud aut versus finem stadii frigoris, aut incipiente eo caloris, atque cum sudore evanescit. Sub ipsa apyrexia illud perstitisse observavimus.

6. Frequentissime urticaria in *febribus rheu-* U. in febr.
rheumati-
ca.
maticis observatur, immo in ea versamur opinio-
ne, *febrem urticariam* auctorum nil aliud esse,
quam febrem rheumaticam, exanthemate urticato
stipatam. Morbus cum refrigerationis sensu inci-
pit, cui ille moderati caloris ac sitis succedunt.
Pulsus febrem indicat, ac artus et abdomen inter-
dum dolent. Urina saepe jumentosa est. Hinc
inde alvus liquida, levisque nausea occurrunt.
Accedit intolerabilis pruritus, sub quo primo,
secundo, rarius tertio morbi die, urticaria, sub
forma plerumque *maculosa*, erumpit. Nonnun-
quam febris vix aut ne vix quidem, saltem si
expulsu, judices, observatur; alias febrilia sym-
ptomata, facta jam eruptione exanthematis, per-
fecte evolvuntur. Accidit interdum, ut cum Ko-
chlio vidimus, febrem omnibus quidem prodromis
signis urticariae stipatam fuisse, in cute vero *ni-*
hil praeter pruritum vel acutissimae punitionis
sensum obvenire. Adnotante eodem auctore,
tunc saepe sensus aurae frigidae ex parte, in qua
pruritus est, ad alia loca remota transit. Urtica-
ria, ut diximus, plerumque sub temperatura fri-
gida

gida evidentior est, ac sub calida evanescit. Interea vel contraria cum HEBERDENIO exempla observavimus. Quocunque in casu, evanescente pro tempore exanthemate, saepissime anxietas, oppressio pectoris, aliquando vero lipothymiae imminuentis sensus, percipi solent. Interdum praesente quoque exanthemate, huiusmodi symptomata, aut observante HEBERDENIO, magna debilitas et ventriculi dolor occurrunt.

U. in febr.
gastricis.

7. Praeviis caussis gastricis, interdum vel post modicum pastum, aeger a nausea, vomituritione, ptyalismo, anxietate, aurium tinnitu, vertigine et intolerabili cutis pruritu, prehenditur. Post nonnullas horas febris, ab initio non semper fortis, accenditur. Citissime nunc urticaria, sive maculosa, sive papulosa, saepius vero *tuberosa*, variis in locis, praesertim ad faciem subtumidulam, ad jugulum, dorsum, et super brachia prorumpit. Adjuvante sive natura, sive arte, morbus spatio unius alteriusve nychthemeri feliciter absolvitur. Alias urticaria, plerumque maculosa et fugax, *febres comitatur biliosas et praecipue bilioso-inflammatorias.*

U. in febr.
typhodibus.

8. Nec desiderantur exempla urticae, *febrem typhodem* comitantis. Vario morbi tempore hoc exanthema, ad gangraenam tunc primum

ut apud MONSEY ⁶³⁾, KOCH ⁶⁴⁾, FRANK ⁶⁵⁾ et LACHAUSSE ⁶⁶⁾ videre est, erumpit.

§. XXIV.

Prognosis. Cura.

1. Urticaria, in genere, leve ac benignum ^{Prognosis.} exanthema sistit. Hoc autem non impedit, quominus ab illius retrocessu ophthalmia, tussis, vomitus, animi deliquium, languores chronici, dyspepsia diuturna et febres intermittentes larvatae successerint. Immo CLEGHORN de exitiosa metastasi, hac ex causa ad encephalon facta, testatur ⁶⁸⁾. Econtra KOCHUS pleuritidem illico sublatam ac febris nervosae symptomata, cum papulae urticae in cute efflorescerent, cito pacata observavit.

2. *Febris intermittens urticata* instar aliarum febrium periodicarum curatur; exanthema nempe cum febre evanescit. In urticaria, *febris rheumaticae* socia, methodus, simplicissimo hujus morbi gradui accommodata, adhibenda est. Quae *gastricam* agnoscit indolem, urticaria haec medendi methodum, febribus gastricis tum primariis, tum secundariis adaptatam, exposcit. Neque in

H 2

cura

63) Medical transactions published by the college of physicians in London. Vol. I. p. 173.

64) L. c. p. 14.

65) L. c. p. 417.

66) Journal de médecine. T. 37. p. 28.

cura februm typhodum urticariae praesentia aliquid immutat.

CAP. VI.

De Erysipelate.

§. XXV.

Definitio. Historia. Sedes.

Definitio. 1. **Rubor**, per summam cutem, calentem, ardentem diffusus, per compressionem evanescens, hac cessante citissime revertens, sedem facile mutans, cum febre, *erysipelas* ⁶⁷⁾ dicitur.

Historia. 2. Erysipelas jam a medicis graecis scriptum fuisse, monuimus ⁶⁸⁾. Testantur de hac re Aetius

67) Ab ἐρυθρός, ruber, et τέλας, prope; vel potius, opinante SWEDIAUER (op. c. Vol. I. p. 144.) a vocabulo antiquo τέλλας, cutis. *Synonyma*: Epiphlogisma HIPPOCRATIS; — febris erysipelatosia SYDENHAMI; — febris erysipelacea HOFFMANNI; — rosa SENNERTI.— *German.* Die Rose, der Rothlauf; — *Gall.* erysipèle; — *Angl.* Erysipelas; — *Ital.* Erisipela. *Ross.* Рожа. *Polon.* Róza.

68) Cap. I. §. 1. 2.

AETIUS ⁶⁹⁾, ALEXANDER TRALLIANUS ⁷⁰⁾, PAULUS AEGINETA ⁷¹⁾ etc. —. Recentiori aevo accuratius de hoc morbo egerunt HEISTER ⁷²⁾, FR. HOFFMANN ⁷³⁾, SCHROEDER ⁷⁴⁾, RICHTER ⁷⁵⁾, aliique praesertim inter chirurgos.

3. Erysipelas nulli cutis loco parcet; occupat Sedes.
nempe illud, nisi *universam corporis superficiem*,
saltem nunc *faciem* et *partem capillatam capitis*,
nunc *truncum* et *genitalia*, nunc *extremitates*, ne
dicamus, *ipsam viscerum superficiem*.

§. XXVI.

Symptomata. Autopsia Cadaverum.

1. Praeter symptomata generalia in definitio. S. genera-
tum.
ne erysipelatis allata, morbus hic, pro varia, quam
occupat, sede, diversa prae se fert phaenomena,
in specie examinanda.

2. De erysipelate *universali*, fasti quidem me. E. univer-
salis.
dici plura offerunt exempla, uti videre est apud

ZA.

69) Tetrab. IV. Serm. 2. c. 59.

70) Cent. II. Cur. 24.

71) Lib. IV. c. 21.

72) Wahrnehmungen I. B. No. 658.

73) Med. Rat. Syst. Vol. IV. P. I. c. 13.

74) Diss. de febribus erysipelatosi. Goett. 1771. v. opus-
cul. Vol. I.

75) Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Goett. 1784.

ZACUTUM LUSITANUM ⁷⁶⁾, SALMUTHIUM ⁷⁷⁾, CHER-
LIS ⁷⁸⁾, DE LA MOTTE ⁷⁹⁾, BROMFIELD ⁸⁰⁾, MI-
CHAELIS ⁸¹⁾, METTERNICH et WITTMANN ⁸²⁾; ve-
rum, ubi de erysipellate, *uno eodemque temporis*
puncto universam cutim obducente, agitur, potius
sive scarlatinam, sive urticariam, sive lepram
squamosam incipientem, pro erysipellate habita
fuisse, opinamur. De hoc vero *sensim sensimque*
universam per corporis superficiem ita migrante,
ut parte una derelicta in alteram conversum sit,
propria quoque nobis experientia testatur.

E. faciei.

3. *Erysipelas faciei* cum symptomatibus febris
nunc rheumaticae, nunc inflammatoriae, nunc
gastricae, nunc typhodis incipit. Dolet praeterea
caput, dolentque saepe fauces, vel aures ⁸³⁾. Haud
raro simul tumor et tensio glandularum jugularium
animadvertitur ⁸⁴⁾. Secundo sive tertio a febris
in-

76) Praxis medica admirabilis. Lib. III. obs. 9.

77) Cent. I. Obs. 32.

78) Cent 2. di rare osservazioni di medicina e di chirur-
gia. Venez. 1725. Oss. 93.

79) Traité complet de chirurgie. T. I. Obs. 92.

80) Medical communications. Vol. 2. art. 4. p. 22.

81) LÖDER's Journal für die Chirurgie. 2. B. S. 668.

82) HUFELAND's Journal der prakt. Heilkunde 1811. April.
S. 21.

83) HIPPOCRATES in Coac. 200.

84) FRID. HOFFMANN l. c. — BORSIERI op. c. Vol.
III. §. 12.

ingressu die, — nonnunquam primo, vel et octavo, ut vidimus, erysipelas; praevio ustionis sensu, prorumpit. Initium plerumque id in alterutra gena, vel, ad aurem, vel ad nasi radicem, ducit, rubedine splendente rapide per totam ut plurimum faciem et saepe per capitis partem capillatam propagata. Facta eruptione, febris, in leviori malo, remittit vel evanescit, in graviore vero aequali, quin immo majori vi saevit. Erysipelas autem ab initio roseum et splendens, tardius obscuriorem induit colorem. Saepe tumor nullus, excepto eo palpebrarum et labii superioris, observatur (*Erysipelas levigatum*). Aliàs universa facies, monstrosus exhibens aspectus, tumet ac tenditur (*E. phlegmonodes*). Praecipue vero tument palpebrae, super oculis clausae, ac materia puriformi conglutinatae, tumetque labium superius cum naribus, unde hiante ore respirare cogitur aeger. Ex hoc saepe magis, quam ex febre, lingua fit arida. Subinde serum sanguinolentum ex auribus manat. Haud raro erysipelas, imprimis ad genas, ad frontem et ad aures *phlyctaenas* vel *pustulas* offert (*E. phlyctaenosum, pustulosum*). Liquidum ex phlyctaenis vel pustulis huiusmodi disruptis manans, *crustis*, nunc densis, nigris, bruneis, nunc tenuibus, fuscis, flavis, ansam porrigit. Praeterea epidermis, quocunque in loco erysipelas floruerit, in levissimo malo, sub forma *furfurum*, aliàs sub illa *squamarum*, secedit. Opus hoc de-
squa-

squamationis, nec non secus crustarum, saepe nonnullorum, aliàs septem, decem, octodecim dierum spatio absolvitur. Sub convalescentia, cutis faciei, tenera et rubella, saepe a crustarum reliquiis obsidetur.

E. trunci et
recens na-
torum.

4. Erysipelas partem capillatam capitis occupans, interdum ad *nucham* extenditur, quod dum contingit, inevitabilis plerumque est, sub novo febris insultu, propagatio illius per universum *dorsum* ad *lumbos*, vel usque ad *os sacrum*. Aliàs erysipelas faciei, a *mento* descendens, *pectoris* superficiei, potissimum autem *mammis* communicatur. Neque exempla erysipelatis, *primitive* ad *dorsum* vel ad *pectus*, praevia febre variae indolis orti, desiderantur. Immo erysipelas *totum truncum* circumdans, descripsimus⁸⁵⁾. FR. HOFFMANN de erysipelate, in febribus malignis et pestifentialibus sub *papilla mammae* vel ad *cordis regionem* comparente, loquitur. Simile fere malum (forte *anthrax*?) a PLATERO sub nomine *maculae latae* describitur⁸⁶⁾. Constitutionis erysipelatosae *scrotum* aggredientis et in gangraenam terminatae BROCKLESBY meminit⁸⁷⁾. Interdum *bubones*, a caussa venerea orti, ab erysipelate, late super *abdomen* et ad *crura* diffuso, circumdantur

85) Acta mea clinica. Vol. III. p. 20.

86) Opp. T. II. p. 23.

87) Oekonomische und medicinische Beobachtungen. S. 93.

tur ⁸⁸⁾. Memorabile autem est *erysipelas*, abdomini, genitalibus et extremitatibus recens natorum infensum. De hoc morbo jam FR. HOFFMANN ⁸⁹⁾, BURGIUS ⁹⁰⁾ et OEHME ⁹¹⁾ mentionem fecerunt: verum prima et absoluta illius descriptio UNDERWOODIO debetur ⁹²⁾. Novi inde morbi doctrinam BROMFIELD ⁹³⁾, GARTSHORE ⁹⁴⁾ et VELSEN ⁹⁵⁾ locupletarunt. Tertio nempe, quinto, decimo, vel et tardiore a partu die, praevis in quietudine, insomniis, gemitu, interdum vomitu lactis non coagulati, *erysipelas* plerumque circa umbilicum, aliquando autem ad *nucham*, ad extremitates, vel ad plurima loca simul, comparet, et super genitalia, crura et nates colorem livescentem et duritiem exhibens, extenditur. Tanto cum impetu contingere haec solent, ut jam tertio sive quarto morbi die infantes obiisse conspecti sint.

Exi.

88) *Erysipelas* hujusmodi, mihi pluries visum, nuper NEUMANN descripsit (*Chiron*. 3. B. S. 11).

89) Op. c. T. II, §. V.

90) De *erysipelate* raro vide: *Miscell. nat. cur. sive ephemerides medicae*. Dec. III. an. 3. p. 334.

91) *Diss. de morbis recens natorum chirurg.* p. 40.

92) *On the diseases of children*,

93) *Medical communications*. Vol. 3. p. 22. — *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte*. 16. B. 23 St. S. 322.

94) *Medical communications*, l. c.

95) HORN's *Archiv f. medic. Erfahrung*, Jahr 1811. S. 426.

Exitus fatalis potissimum transitui morbi in *gangraenam* debetur. Facillime ab hac partes genitales corripuntur; quo in casu stranguriam et convulsiones inducens observata fuit ⁹⁶⁾. Et adulti pernicioso erysipelati subjiciuntur, quod *glandulis inguinalibus* infensum est, quod vero vel ad *pestem*, vel ad *lepram partialem* *) pertinet.

E. extremitatum.

5. Erysipelas capitis interdum ad *brachia*, rarissime tamen ultra locum, quo musculus biceps inseritur, descendit. Caeterum erysipelata extremitatum superiorum, illis forsitan, quae a caussis localibus gignuntur, exceptis, haud communia dici queunt. Contrarium prorsus de erysipelate *extremitatum inferiorum* valet, quod praecipue senibus et cachecticis habituale est.

E. internum.

6. Veteres non immerito doctrinam *erysipelatis interni* statuisset dictum est ⁹⁷⁾. Confirmatur hujus, aut saltem inflammationis superficialis internae praesentia per cadaverum sectiones. Saepius accidit praeterea, homines, erysipelati habituali aut capitis aut extremitatum inferiorum obnoxios, tempore, quo hoc morbo laborare debuissent, in viscerum inflammationes incidere, quarum resolutio vix aliter, quam comparente extus erysipelate, obtinetur.

7. Su-

⁹⁶⁾ VELSEN l. c.

*) ALARD *histoire de l'elephantiasis des Arabes*. Paris 1810. p. 205.

⁹⁷⁾ FRANK l. c. p. 28.

7. Superficies *cadaveris* vel nulla amplius *Autopsia* *erysipelatis* vestigia, vel livorem gangraenosum in *cadaverum* parte affecta offert. Plerumque epidermis hic secedit. Ad partes internas migrante erysipelate, viscerum, polissime cerebri, tracheae et pulmonum superficies externa, specifico colore *roseo*, notari solet. Haud raro idem hic color, vel coccineus, ad membranas internas, tunc magis turgescences, imprimis ad meninges, pleuram et peritonaeum, observatur. Ut plurimum tunc in cavis vicinis humor serosus aut puriformis reperitur. Vix autem cadaver aegri, ex erysipelate defuncti, secumimus, quin labem antiquam, saepeque reconditam, e. c. abscessum aurium, cariem cellularum mastoidearum, maxillae, ossis frontis, obstructionem sive scirrhum hepatis, vel vitia cystidis felleae, invenerimus.

§. XXVII.

C a u s s a e.

1. Causae erysipelatum sunt vel *locales*, vel *Divisio. universales*.

2. Ad causas *locales* pertinent: frictio cutis *C. locales* rudi manu suscepta ⁹⁸⁾, contusio, vulnera, imprimis ex ictu sclopeti, sed et levia illa, quae venae

sc-

98) Erysipelas dorsi, pectoris et brachiorum aliquoties in convalescentibus ex asphyxiis, ob frictiones ruditer nimis adhibitas, observavi. Eundem effectum a frictionibus in oedemate crurum conspexi.

sectionis, scarificationum, variolarum et vaccinae inserendarum gratia inferuntur; excisio tumorum cysticorum, extirpatio mammarum, fracturae, potissimum cranii, extensio praemagna cutis, e. c. a varicibus ⁹⁹⁾, a tumore vel a sero in textu celluloso collecto; compressio integumentorum ¹⁰⁰⁾, ichor cuti insertus ¹⁾, specificus liquor ab animalculis, praesertim insectis, in sui defensionem cuti inspersus, hirudines pravae indolis, succi vegetabilium rodentes, unguenta rancida, acrida ²⁾, sinapismi, vesicatoria fortiora neglecta, vel eidem loco inflammato, sauciato frequentius imposita, ignis, caustica ³⁾, aliaque irritantia ⁴⁾.

5. Claus.

99) Apud senes saepius hac ex causa erysipelas crurum ortum vidi.

100) Erysipelas pedum, a caligis nimis arctis, plus vice simplici mihi obvenit; ita erysipelas faciei a *larvis* tempore bachanalium applicitis.

1) De erysipelate a pure vaccinae lege: HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde*. 1811. März. S. 120.

2) Erysipelas faciei, ab oxydo mercurii rubro, ad pediculos necandos capiti admoto, in nosocomio Ticinensi a. 1792. conspexi. Ex tineae capitis, arsenici ope fugata, non solum erysipelas faciei, sed et encephalitidem ortam vidit pater meus.

3) A caustico bubonibus imposito aliquoties erysipelas inguinum et abdominis observavi.

4) Acetum radicale, temporibus et naribus lipothymiae causa incaute admotum, erysipelas faciei generasse, compertum habeo.

3. *Causae universales in praedisponentes et C. universales in excitantes* dividi possunt. salium divisio.

4. Juvenes et feminae inprimis erysipelati fa-
cili subjiuntur 5). Erysipelas extremitatum C. praedisponentes.
econtra saepius senes aggreditur. Tempus hyemale praecipue morbis erysipelatosi favet, qui interdum, ignotae constitutionis epidemicae gratia, obveniunt 6).

5. Ad causas universales erysipelata *excitantes* spectant: vicissitudines atmosphaerae, refrigeratio corporis aut partis aestuantis 7), frigus humidum, nebulae maritimae 8), alimenta pravae indolis, inprimis esus piscium rancidorum 9), cibi, ob peculiarem idiosyncrasiam contrarii, e. c. hepar squali catuli 10), cyprini 11), carnis anserinae C. excitantes.

5) Inter viginti aegros, erysipelate in instituto clinico *Ticinensi* decumbentes, non minor quam *sedecim* *feminarum* numerus observabatur.

6) HIPPOCRATES lib. tertius epidem. text. 29.

7) LORRY op. c. p. 365. Homines per abusum liquorum fermentatorum aestuantes, ac hyemali tempore in plateis obdormientes, saepe a gravissimo erysipelate capitis affectos *Vilnae* conspexi.

8) PALLAS *Neue Beyträge*. 4. B. S. 156.

9) TODE *med. chirurg. Bibliothek*. I. B. 3. St. S. 161. — Sic erysipelas tempore quadragesimae inter homines solis piscibus et oleo nutritos commune esse, in *Rossia* observavi.

10) SAUVAGES *Nosol*. T. I. p. 421.

11) *Ephem. nat. cur.* Dec. I. an. IX. X. obs. 70.

nae ¹²⁾ etc.; — secretio morbosae bilis ¹³⁾, vermes intestinales ¹⁴⁾, animi pathemata, inprimis ira et terror ¹⁵⁾, haemorrhagiae, potissime menstrua, suppressae, ulcera artificialia praepostere sanata, forte interdum contagium ¹⁶⁾, et arsenicum *).

C. proxima.

6) *Causa proxima* erysipelatum ab ea inflammationum in genere differre haud videtur. Inter inflammationes enim et exanthemata erysipelas ita medium tenere arbitramur, ut in leviori gradu (*erysipelatis* scilicet *levigati*) id magis ad exanthemata, in graviore vero (*erysipelatis* videlicet *phlegmonosi*) ad inflammationes magis accedat. In primo casu *sedes mali* potissimum in *rete mucoso*,

12) HANNEMANNUS quotiescunque carne anserina vesceretur, erysipelate faciei exulcerato afficiebatur. (Ephem. Nat. Cur. Dec. II. an. IV. obs. 52.

13) GALENUS de simplic. medicam. facultatibus. Lib. VII. — SCHROEDER l. c. §. VIII. §. XIII. — TISSOT *avis au peuple* §. 283.

14) VAN DER BOSCH histor. constitut. epidem. verminosae. p. 179.

15) Per multis hujusmodi exemplis, inprimis a SCHROEDERO allatis (l. c. §. 8.), illud a me observatum addam, infantis scilicet *sex mensium*, a rixis inter parentes ita terrefacti, ut illico a febre, et postridie ab erysipelate faciei corripereetur.

16) WELL's in *Transactions of a society for the improvement of medical and surgical knowledge*. Vol. 2. No. 17.

*) *Case of chronic rheumatism and observations on the exhibition of Arsenic in the protracted form of that disease*. By GEORG KELLIE.

coso, — in altero, profundius et simul in textu celluloso compacto, *cutem*, proprie dictam, constituyente, — et quidem non in solis, ut REIL docet, vasis cruentis, sed in *totius systematis cutanei substantia*, posita est.

§. XXVIII.

D i a g n o s i s.

1. Erysipelas confundi potest: cum *bullis*, Facilis confusio.
cum *urticaria*, cum *anthrace*, cum *zostere*, cum *scarlatina*, cum *strophulo* et cum *erythemate*.

2. *Erysipelas pustulosum*, a quibusdam scriptoribus cum *bullis* confusum ¹⁷⁾, ab his differt: ^{Distinctio a bullis.} quod *bullae*, facta eruptione, praeter halonem rubrum eas arcte ambientem, ruborem extensum non exhibeant, atque ad singulas corporis partes, imprimis ad crura compareant; *erysipelas* vero *pustulosum*, exorta jam pustula magis magisque rubere continuet et sat raro citra faciem observetur.

3. *Urticaria* faciem occupans magnam cum *Erysipelate* hujus partis alit similitudinem. Differt ^{Distinctio ab urticaria.} autem sequentibus notis:

Ur-

17) SPRENGEL *Handbuch der Pathologie*. Leipz. 1807.

2. Thl. §. 439. — CARL BELL in *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte*. 20. B. S. 621.

Urticaria.

- a. Magno pruritu stipatur, *magno pruritu stipatur*.
- b. Uno temporis puncto faciem occupat.
- c. Facies *variegata* apparet.
- d. Rubor alternatim evanescit reditque.
- e. Vix desquamatione aliqua terminatur.

Erysipelas.

- a. Stipatur dolore ardente.
- b. Sensim sensimque faciem obducit.
- c. Facies *aequali rubore* prehensa est.
- d. Rubedo constans observatur.
- e. Desquamatio evidens locum invenit.

Indoles varia.

4. *Erysipelas* nunc *malum locale*, nunc *symptoma morbi universalis* constituit; quo ultimo in casu diathesis *rheumatica*, *inflammatoria*, *gastrica*, *typhodes*, *arthritica*, *scorbutica* et *canceromatosa* illi ansam porrigere solent.

E. locale.

5. *Erysipelas locale* a caussis tum mechanicis, tum chemice in cutem agentibus excitatur. In parte laesa illud incipit, et graviore tantum in malo, aut sensiliores apud homines febrim mere symptomaticam provocat.

E. rheumaticum.

6. *Erysipelas*, quod ex atmosphaerae vicissitudinibus, vel ex frigore aestuante corpore suscepto originem trahit, *rheumaticum* vocatur. Morbus hic instar febrium rheumaticarum orditur. Interdum tamen, rite monentibus DE MEZA ¹⁸⁾ et Ri-

¹⁸⁾ Compend. med. pract. fasc. I. c. 17.

RICHA ¹⁹⁾; pulsus vix febris praesentiam indicat. Erysipelas rheumaticum, sede admodum volubile, *faciem* aut *extremitates inferiores* occupare, atque *formam* plerumque *levigatam* prae se ferre solet. Solvitur aegritudo, quinta sive septima morbi die, cum sudore universali et urina sedimento lateritio instructa.

7. Erysipelas *rheumaticum*, sub constitutione *E. inflammatorium* corporis florida, *complicationem inflammatoriam* facile induit. *Erysipelas* praeterea extat, prima jam origine *inflammatorium*, ac praecipue vernali tempore ²⁰⁾, apud viros floridos, obesos, liquoribus fermentatis deditos obveniens. Incipit hic morbus cum frigore, interdum ad quatuor, sex vel septem horas extenso. Sequitur aestus cum pulsu duro, cephalaea, epistaxi, sopore ac facile cum vomitu. Comparente erysipelate, quod saepissime contingere solet, ad *faciem*, praedicta symptomata, sat saepe quidem, nec attamen in omnibus, leniuntur. Sub morbi incremento, facies intumescit, saepe a phlyctaenis, sive pustulis obsidetur, ac aegrotus, magis magisque soporosus, rhonchos ducere, ac interdum tacite delirare, observatur. Tenduntur nunc hypochondria, alvus obstruitur, ac tendines nonnunquam subsiliunt. Crisis vix ante septimum diem, plerumque circa decimum, vel tardius, sub largo sudore, diarrhoea,

19) Constitut. epidem. Taurin. altera §. 8.

20) GRANT *Beobachtungen über die Fieber* S. 391.

rhoea, haemorrhagia narium, fluxu menstruorum sive haemorrhoidum et urina, copioso sedimento puriformi, fere *squamoso*, obtinetur. Aliàs *encephalitis* vel *otitis*, propriis signis et periculis stipatae superaccedunt, aut febris ex inflammatoria in typhodem convertitur.

E. gastricum.

8. *Erysipelas gastricum*, praevis indicatibus causis ac sociis symptomatibus febris gastricae, sat placide, nunc ad *faciem*, nunc ad *truncum*, nunc ad *extremitates* prorumpit. Forma illius ut plurimum *levigata* est, atque sub debita medendi ratione, aut in sanis caeterum hominibus, nonnullorum dierum spatio, interdum (ut in TAURINENSI epidemica erysipelatum constitutione accidit) leni diarrhoea solvitur, sub contrariis autem conditionibus, typhodem facile induit naturam.

E. typhodes.

9. *Erysipelas typhodes*, aliis *malignum*, quamvis CULLENIO, quod miramur, haud visum²¹⁾, minime in dubium revocandum est. Huc atrox et epidemicus ille morbus, *ignis St. Antonii* (*feu de St. Antoine*, *mal des Ardennes*), a quo sub LUDOVICO VII. utraque *Lotharingia* devastata fuit²²⁾, pertinere videtur. Neque absoluta erysipelatis typhodis descriptio, apud FR. HOFFMANNUM desideratur²³⁾. Morbus hic vel ex erysipelate inflammatorio aut gastrico sive neglecto sive male

1) First lines §. 713.

22) MEZERAY Historia Galliae.

23) Op. c. T. IV. p. 303.

male curato descendit; vel in primo mox limine atrocem suam patefacit naturam. Primo in casu, praeviis sudoribus saepe inanibus, ac invalescentibus caeteris symptomatibus, erysipelas concidit, livescit, vires sphincterumque officia franguntur, ac peticulae, miliaria et gangraena, maxime a decubitu, in conspectum veniunt. Altero in casu, morbus cum ingenti virium jactura et interdum cum lipothymiis orditur. Rapide deinde consueta febris typhodis symptomata evolvuntur. Erysipelas ipsum, saepe primis morbi horis, nunc ad *faciem*, nunc ad *truncum*, nunc ad *extremitates* comparet. Forma illius plerumque *levigata*, et color profunde lividus est. Interdum cutis affecta, vesiculis, sero acri, rodente repletis, cooperitur, quae vesiculae disruptae, tota *loca gangraenosa* relinquunt. Haud raro hic *vibices* et alia *ecchymomata* cernuntur. Curriculum et finis morbi, illis typhi respondent.

10. *Erysipelatis recens natorum* indolem, Observatio. quamvis hucusque obscuram, *gastrico-typhodem* esse, tum ex symptomatibus, tum ex socio periculo, tum ex medendi ratione, huic morbo magis opportuna, suspicamur.

11. Luculentissimum *erysipelatis arthritici* E. arthriticum. exemplum, ipsa *podagrae*, alibi describendae ²⁴⁾ symptomata, largiuntur. At, vel citra podagram,

I 2

dia-

24) P. III. Vol. II. cap. de arthritide.

diathesin arthriticam, rite monentibus STOLL ²⁵⁾ et MUSGRAVE ²⁶⁾, in generationem erysipelatis saepius influere, ex eo apparet, quod homines, arthritidi subjecti, simul erysipelati, praesertim *habituali* frequenter obnoxii sint; — quod hoc, ubi vere et autumnopro more revertitur, ab aliis malis, potissimum arthriticis, libertatem concedat ²⁷⁾: — et quod, non comparente consueto erysipelate, haud raro inflammationes internae, imprimis peripneumoniae, sequantur.

E. scorbuticum.

12. Neque erysipelas ex *diathesi scorbutica*, imprimis senibus et cachecticis habituale, rarum est. Plerumque id extremitates inferiores saepe cum varicibus detinet; ac ad exulcerationem et gangraenam ²⁸⁾ pronum observatur.

E. carcinomaticum et eprosum.

13. Erysipelas, ad loca glandulis permultis instructa, comparens, saepe revertens, in duritiem desinens, subsequente ulcere cancroso, aperte indolem *carcinomaticam* prae se fert. Non multum ab eo altera erysipelatis species differre videtur, quae nunc ad faciem, nunc ad mammas, nunc ad

²⁵⁾ Rat. medendi Vol. V. p. 436.

²⁶⁾ De arthritide anomala.

²⁷⁾ Virum novit LORRY, qui, dum diarrhoea laborabat, ab erysipelate liber erat; dum illam sistebat, hoc denuo laborare coepit. Feminas nonnullas malis arthriticis et fluori albo obnoxias curavi, quae, prorumpente erysipelate, a malis illis, saltem pro tempore, liberabantur.

²⁸⁾ JACOBI Diss. casus erysipelatis scorbutici subito in sphacelum terminati. Erfurt. 1711.

ad scrotum, nunc ad labia vulvae, nunc ad extremitates comparet, quaeque periodice revertens sensim sensimque *volumen partis monstrore auget ac jure pro initio leprae partialis declaratur* *).

§. XXIX.

P r o g n o s i s.

1. Nullum erysipelas, ob facilem propagatio-Generatim nem sive conversionem ad partes internas, floccipendendum est. Praeterea prognosis potissimum a morbi *sede, indole*, nec non ab aegrorum aetate et *constitutione* desumitur. Erysipelas faciei, etiamsi adspectu leve, praesentibus gravi cephalaea, sopore, deliriis atque anxietate, ob metum transitus in encephalitidem, hydrocephalum acutum et apoplexiam, magno semper periculo stipatur. Idem de erysipellate, cui graves laesiones locales, vel diathesis typhodes ansam porrigunt, dici oportet. Infantes et senes difficillime erysipelas ferunt. Sic et valetudinarii, apud quos erysipelas partem jam labefactatam facilius aggreditur e. c. in phthisi tracheali tracheam, in phthisi pulmonali pulmones, in difficultatibus urinae vesicam etc. — Interdum erysipelas salutare ²⁹⁾, vel, uti in febre catarrhali vidimus,

crit-

*) *Nouvelles observations recueillies sur l'éléphantiasis des Arabes*, par ALARD. Paris 1811. p. 27.

29) „Novi, inquit SCHROEDER, alios morbos, praesertim asthma convulsivum, ab erysipellate superveniente, fuisse feliciter sublatum.“ l. c. p. 303.

criticum ³⁰⁾ observatur. Erysipelas ab externis partibus *intro* converti, malum; ab internis vero *extra*, bonum ³¹⁾; addite tamen: si partes internae ab erysipellate ad exteriora converso liberentur ³²⁾.

Exitus. 2. Erysipelas aut *resolutionem*, aut *oedema*, aut *indurationem*, aut *suppurationem*, aut *exulcerationem*, aut *gangraenam* pro *exitu* agnoscit.

Resolutio. 3. Erysipelas symptomaticum, per morbi primarii *crisin* solvitur. Quocunque autem in erysipellate, ut *crisis perfecta* dici queat, *desquamatione epidermidis* plus minusve requiritur, ut sub cuius defectu malum plerumque recrudescit, vel ad vicina loca propagatur ³³⁾. In erysipellate par-

tis

³⁰⁾ PERCIVAL *Essays*. Vol. I. p. 274. FRANK l. c.

p. 16.

³¹⁾ HIPPOCR. Aphor. VI. 28. Coac. 103.

³²⁾ Vir illustris, Mediolani, cum sibi tumores folliculosos ad partem capitis capillatam scarificari jussisset, mox vero se aëri liberiori frigido, ac simul radiis solis exposuisset, nocte insequente in lethargum incidit. Versus sextum morbi diem insigne comparuit faciei totius erysipelas. Medicus ordinarius, aegrum in salvis esse, decrevit, cum vero lethargus persisteret, erysipelas externum pro morbi incremento ac pro lethali a patre meo declaratum et eventu confirmatum fuit.

³³⁾ Sic erysipelas capitis, deficiente debita desquamatione facillime ad nucham propagatur, quod dum accidit, inevitabilis descensus ad dorsum et lumbos observatur.

tis capillatae cranii, praeter epidermidis desquamationem, et *defluvium capillorum* succedere solet.

4. *Oedema* genarum, colli, dorsi, et lumbo- *Oedema*.
rum, cum imminuta simul urinae secretionem, haud raro harum partium erysipelas sequitur; quem hujus morbi non infrequentem exitum in *hydropem textus cellulosi acutum* a scriptoribus negligi, miramur Nec rarum est, sub erysipelatis curriculo aut convalescentia, praecipue apud potiores, *hydropem acutum internum*, inprimis cavitatibus pectoris, vitae insidias struere.

5. Jam AETIUS, ubi remedia spirituosa et frigidiora in erysipelate adhiberentur, partium adfectarum *indurationes* succedere, edixit ³⁴). Sed et citra hanc causam, erysipelas, inprimis illud extremitatum inferiorum, frequenter repetitum, saepe duritiem et insigne partis volumen relinquit. Sunt tandem, qui *indurationem textus cellulosi recens natorum* praevisio erysipelati attribuunt; — at immerito, uti suo loco demonstrabimus.

6. Facilis, et nunc salutaris ³⁵), nunc ominosus ³⁶) est erysipelatis phlegmonosi in *suppuratio-*
nem ^{Suppuratio.}

³⁴) Tetrab. IV. Serm. II. c. 59.

³⁵) SCHROEDER, observationes STRACKII de erysipelate epidemico adducit, quod, nisi suppuraretur, in mortem abiit (l. c. p. 207.).

³⁶) HOME principia medicinae. p. 183.

nem transitus, imprimis ad palpebras, ad genas, super nasi radicem, sub galea aponeurotica cranii, sub musculorum bicipitis et fasciae latae expansionibus tendinosis. Ne *abscessus* huiusmodi nos lateant, partes a dicto erysipellate diutius detentae, iterum iterumque examinandae sunt. Ne tamen *materiam puriformem* ex phlyctaenis hinc inde sub crustis densis retentam, pro pure in *vero abscessu* collecto habeamus, cavendum est. Abscessus loco, post erysipelas, interdum *furunculus* nascitur.

Exulceratio.

7. Indurationes et abscessus ab erysipellate, nec non erysipelas scorbuticum, imprimis ad crura, saepe saepius *ulceribus chronicis*, pro varia aegrorum constitutione, indolis variae, ansam porrigunt.

Gangraena.

8. *Gangraena* potissimum ex erysipellate typhode et scorbutico ad aures, genas, scrotum et extremitates inferiores expectanda est. Plurima huiusmodi exempla apud BROCKLESBY ³⁷⁾, TISSOT ³⁸⁾ et VAN DER BUSCH ³⁹⁾ obveniunt. Transitus erysipelatis in gangraenam praecipue autumnali tempore contingere, GRANTIUS existimat ⁴⁰⁾. In genere, annuntiatur hic gangraena a livore
aut

37) L. c.

38) L. c. §. 279.

39) L. c. p. 183.

40) L. c. p. 591.

aut nigrednie partis, a striis quasi igneis, nec non a vesicis sero cruento turgentibus. Ne vero *nigredinem a sanguine extravasato* pro gangraena habeatis, cavete.

§. XXX.

C u r a.

I. Cura *erysipelatis localis* in eo consistit, ut *C. erys. localis.* causa morbi, si id sine nimia partis irritatione fieri queat, abigatur, aut saltem, ut deleterii illius effectus, quoad licet, temperentur. In malo *recenti* *hirudines* in viciniis loci affecti applicandae sunt. Ipsi vero parti aegrotanti *fomentum frigidum, ex aqua et acetate plumbi liquida*, methodo GOULARDI paratum ⁴¹⁾, ope lintei tenuis imponitur, saepeque renovatur. Sub minore mali gradu, *chartam compactam*, cui *pulvis acetatis plumbi* adpersus fuit, imposuisse sufficiet. Morbo autem *profecto* alia accommodanda est medendi ratio. Nisi enim hic suppurationis jam adsint indicia, pars morbosa cum *fomentis siccis ex herbis resolventibus*, addita *camphora*, vel saltem cum *linteo sicco* camphora adperso, cooperienda est. Si febris simul adfuerit symptomatibus inflammatoriis stipata, ea methodo antiphlogistica temperanda foret. Senescente morbo, et ingruente virium prostratione, purgatis, si opus fuerit, primis viis, ad *decoctum corticis cinchonae* of-

41) Abhandlung vom Gebrauche des Bleyes. I. Abschn. S. 26.

officinalis devenitur. Doloribus et vigiliis *tunc* quoque *opium* prospicit ⁴²⁾.

C. c. rheu-
matici.

2. *Erysipelas rheumaticum* regimen exanthematibus simplicibus accommodatur ⁴³⁾ exposcit. Praeterea febris ope *nitratis potassae* primum temperanda, dein lenibus diapnoicis, praecipue vero, parvis *tartrudis stibii et potassae* dosibus debellanda est. Remedia topica, hic sicuti in omni erysipellate symptomatice, superflua et saepe nociva sunt. Solum, si lectus ab afflatu aëris non omnino securus esset, ac faciem erysipelas teneret, haec cum linteo tenuissimo, larvae instar, foraminibus circa oculos, nares et os instructo, obtegi posset. Neque in erysipellate trunci et extremitatum partes affectas ope *sacculorum, farina foeni graeci aut tritici repletorum*, foveri nocet. In erysipellate, ad aures usque extenso, ornamenta istarum feminea, quae in tumore partis quasi sepulta gangraenam induxisse observavimus, sine mora removenda sunt.

C. c. inflam-
matorii.

3. *Erysipelas inflammatorium* veluti exanthemata primaria inflammatoria tractatur. Venae sectione autem, quemadmodum in genuinis inflammationibus utimur, in aegro robusto et florido, in morbo recente, sub annua constitutione, morbis inflammatoriis favente, sub pulsu constante, in morbo phlegmonoso, cum sopore et delirio. Ne

sym-

42) E. c. homini adulto ad vesperras *granum unum*, aut *gut-
tae quindecim tincturae opii compositae SYDENHAMI*.

43) Cap. I. §. VI. 3.

symptomatum sive gastricorum sive nervosorum, hepatis cum cerebro, aut nervorum cum ventriculo consensui tribuendorum. praesentia, hic a venae sectione, aliunde indicata, nos absterreat. Si provecto in morbo vires jam evidenter fractae usum venae sectionis dubium redderent, ad *hirudines*, quocunque tempore, sub gradu mali minore, phlebotomiae locum facile tenentes, confugiendum foret. Earum decem vel duodecim in erysipellate faciei, retro aures, circa collum, vel ad internam crurum superficiem ponuntur. STOLLIUS hoc in casu, inprimis vigente gravi cephalaea, *scarificationes* ad nucham adhibuit⁴⁴⁾. Ipsius partis erysipellate affectae *scarificationes* commendavit FREIND⁴⁵⁾, cui tamen consilio, ob exempla gangraenae inde secutae, difficulter subscribimus. — Peracta sanguinis detractio, ad *alvi purgationem*, rite monente BROCKLESBY, in erysipellate inflammatorio efficacissimam, deveniendum est. Interea *temperatura* cubiculi esto moderata, ac abstineatur a remediis topicis. Hac sub methodo spatium nonnullorum dierum plerumque frangitur impetus mali, quo facto tempus, ut morbus curriculum consuetum absolvat, concedendum est. Quod si res sub methodo antiphlogistica, forte sero nimis adhibita, minus fauste incederet, ac transitus morbi in febrem typhodem timendus foret,

44) Rat. medend. T. IV. p. 65.

45) Historia medicinae. p. 29.

foret, virium tunc summam rationem habere oportet. Hac de caussa, concesso victu ex jusculis carneis, exhibitoque pro potu infuso diapnoico, primum ad *liquorem acetatis ammoniae*, dein ad *infusum radice angelicae archangelicae*, et si haec non juvarent, ad parvas *camphorae* doses, *nitratu potassae* nuptas ⁴⁶⁾ deveniendum est. Urgente sopore vel delirio *vesicatoria* aut *sinapismi*, crucibus, nunquam vero nuchae, ob facilem morbi ad hunc locum propagationem, admoventur. Haec ipsa remedia, si, quod frequenter accidit, encephalitis, erysipelatis faciei socia, in cerebri hydropem acutum jam transiverit, aut *muriati hydrargyri*, aut *floribus arnicae montanae*, aut *foliis digitalis purpureae*, secundum artis praecepta, alibi tradenda ⁴⁷⁾, nubenda forent.

C. e. gastrici.

4. *Erysipelas gastricum* methodo exanthematibus gastricis accommodata curatur. Saepe *emetico* locum esse, SYDENHAM, BAGLIVI, MEAD, FREIND, TISSOT, SAUVAGES, BROCKLESBY, MONRO (quorum testimonia SCHROEDER collegit,) docuerunt, ac propria nobis experientia ultro confirmat. Plerumque vomitum excitandi scopo hic *tartritidem stibii et potassae*, ut quo simul alvus leniter et cum fructu movetur, eligimus. Fortiora

46) R. Camphorae grana sex. Nitri drachmam unam. M. F. pulvis. Div. in sex partes aequales. D. S. omni secunda hora pulverem capiat.

47) P. II. Vol. I. Cap. de hydrope cerebri.

ra nempe purgantia, recte monente QUARIN ⁴⁸⁾, praecipue in debilioribus, quorum pulsus celer et parvus est, morbum exasperant.

5. In *erysipellate typhode*, caeterum secun-^{C. e. typho-}
 dum regulas generales curando, *cortex cinchonae*
officinalis praecipuam sibi laudem promeruit. Vir-^{dis.}
 tus illius potissimum in *erysipellate recens natorum*
 ab UNTERWOOD et GARTSHORE celebratur. *Clyste-*
res hic *ex decocto corticis saturato*, addito quo-
 que ejusdem extracto, omni quarta hora injiciun-
 tur, ac simul, quantum ore porrigi potest, ingeri-
 tur ⁴⁹⁾. Plerumque hisce remediis alvi lenis pur-
 gatio, ope syrupi rhei, praemittitur. Parti ab
erysipellate detentae lintea calida, quibus cam-
 phora rasa adspersa est, vel, suadentibus supra
 laudatis Angliae medicis, lintea *alcohole campho-*
rato imbuta apponuntur. Et *mercurius* nuper a
 VELSIO hoc in recens natorum morbo commenda-
 tus fuit ⁵⁰⁾.

6. Ut *erysipelas arthriticum* consuetum sibi C. e. ar-
 decursum rite absolvat, maxime studendum est. ^{thritici.}
 Hac de caussa, si praesens forte *complicatio in-*
flammatoria aut gastrica regulari morbi curriculo
 obstaret, ea vel *hirudinibus*, vel *lenibus purgan-*
tibus,

48) De curandis febribus et inflammationibus. Cap. X.
 p. 141.

49) R. Syrupi corticis peruviani unciam unam. Ex-
 tracti corticis ejusdem grana decem. M.

50) L. c. p. 436.

tibus, e. c. electuario lenitivo, abigenda, simplex vero morbus naturae committendus foret. Erysipelas ipsum, nisi faciem detineat (quo in casu secundum regulas supra allatas agendum est), *speciebus resolventibus siccis* fovendum erit. Devicta jam febre, praecipue sub somni defectu, *pulvis radice cephaelidis ipecacuanhae cum opio* porrigitur. Evanescente praepostere erysipelate, secundum praecepta generalia agendum est.

C. e. scorbutici.

7. *Erysipelati scorbutico*, praeter generale regimen antiscorbuticum, potissime usum internum *infusi radice acori calami et baccarum juniperi communis*, accommodatum invenimus.

C. convalescentiae.

8. Convalescens, donec desquamationis opus absolutum sit, a refrigeratione sibi caveat et spontaneum squamarum vel crustarum decessum expectet. Crustas vero praeter modum duras ac densas, imposita charta bibula *butyro* insulso imbuta, vel applicitis sive *cremore lactis*, sive *decocto malvae rotundifoliae* emollire oportet.

C. exituum.

9. Ut *oedemati* occurramus, per omne erysipelatis curriculum *urinae secretionis* summa habenda est ratio, ac quamprimum ea, quin sudor illius vices agat, imminuitur, *diuretica*, sedi et indoli morbi accommodata, secundum regulas infra tradendas⁵¹⁾, sine mora adhibenda sunt. — *Indurationes* ab erysipelate relictæ, vel tractu temporis,

poris, imprimis sub debito partis affectae exercitio, sponte evanescent, vel *roborentur*, praecipue *aquis martialibus*, sive lenibus diaphnoicis atque diureticis dissipantur. Indurationes, quae hisce auxiliis non cedunt, sanationem vix aut ne vix quidem admittunt, et resolventia localia, frictiones etc., novam pejoremque inflammationem plerumque excitando, plus damni quam auxilii ferunt. — Si *abscessus*, erysipelatum reliquiae, superficiales sint, spontanea eorum ruptura expectari potest; alias cultro aperiendi sunt. Quoniam vero partes ab erysipelate prius detentae, usum protractum cataplasmatum aegre ferunt, eorum loco abscessus maturandus, imprimis noctu emplastro adhaesivo, e. c. *diachylon*, cooperiendus est. — *Exulcerationes* chronicae ab erysipelate relictae remedia tum interna, tum externa exposcunt. Illa, ex classe *tonicorum* et *antiscorbuticorum*, desumuntur; haec, quouque ulcus impurum est, in usu *pulveris carbonum*, *radicis acori calami*, et *unguenti digestivi*, dein vero in applicatione *filamentorum carptorum*, primum *liquore acetatis plumbi* madefactorum, dein siccorum, consistunt. Praeterea maxime puritati studendum est. Si ulcus extremitatem occupat, tota pars affecta *fascia*, sic dicta *expulsiva*, circumdari debet. Neque tunc motus moderatus nocet. *Plagae gangraenosae*, polline *corticis cinchonae* cum *camphora* et *myrrha* insperguntur, vel cum

de-

decocto ejusdem corticis fovendae sunt. *Scarificationes*, circa partem affectam institutae, augere potius quam arcere gangraenam solent. Si adventante gangraena erysipelas adhuc evidentes notas inflammatorias exhibeat, methodus antiphlogistica, viriliter adhibita, optime gangraenae limites ponit.

CAP. VII.

De Furunculo.

§. XXXI.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. Tuberculum nucis avellanae vel ovi columbini magnitudine, in medio elevatum, profunde rubrum, ut plurimum valde dolens, *Furunculus* ⁵²⁾ dicitur.

Historia. 2. Quamvis furunculus morbum haud semper *localem* sistat, illius tamen doctrina hucusque

52) *Synonyma*: abscessus nucleatus, abscessus sanguineus; Dothien SWEDIAUERI. GERM. Blutgeschwür, Blutbeule. — GALL. Clou, furoncle. — ANGL. A boil. — Ross. Чирей, Вережь. POLON. Czyrak.

a solis fere chirurgis, HEISTERO ⁵³⁾ scilicet, RICHTERO ⁵⁴⁾, CALLISENIO ⁵⁵⁾, NESSIO ⁵⁶⁾, BELLIO ⁵⁷⁾ etc. tradita fuit. Inter medicos HEIMIUS nuper de furunculo notatu digna exposuit ⁵⁸⁾.

§. XXXII.

Symptomata. Causae.

I. Furunculus nunc in uno solum cutis loco (*F. solitarius*), nunc in plurimis simul partibus, nec exceptis semper oris cavitate et ani vulvaeque orificiis, sub forma noduli duri, rubri, splendentis, in conspectum venit. Citissime is, sub magno plerumque cruciatu, decubitus super partem affectam impediens, crescit. Tumor, ut diximus, variae magnitudinis, rotundus, circumscriptus, durus, in fastigium altum elevatus, observatur. Febris, nisi sub magna aegri et partis affectae sensibilitate, aut nisi plures furunculi simul prorumpant, raro occurrit. Ea praesente, agrypnia, ciborum aversio et hinc inde, apud infantes,

Symptomata.

53) *Institutiones chirurgiae.* Amsterd. 1750.

54) *Anfangsgründe der Wundarzneykunde.* Gött. 1782.

55) *Institutiones chirurgiae.* Hafn. 1788. Edit. nova Germanica. Copenh. 1798.

56) *Instituzioni di chirurgia.* Venez. 1787.

57) *Lehrbegriff der Wundarzneykunst.* 1790.

58) *Erfahrungen über die Furunkeln, nebst Beobachtungen über eine ansteckende Art derselben.* (HORN'S Archiv der med. Erfahrung. 4. B. 18 Heft. S. 151.).

Frank Prax. I. 2.

tes, convulsiones ⁵⁹⁾ succedunt. Furunculus lentius, quam reliquae inflammationes, in suppurationem transit. Incipit vero suppuratio circa apicem, quo in loco, nucleus ⁶⁰⁾, ex fibris densis et crassis, subalbidis, subrubris compactus, nec in pus convertendus, invenitur. Reliqua apostematis maturi superficies, plura tandem foraminula, pus, multo sanguine mixtum, fundentia, exhibet. Expulso si e educto nucleo, saltem in corpore aliunde sano, abscessus cito sanatur. Quandoque furunculo uno sanato, alius in vicinia, vel etiam plures alii in variis corporis partibus comparent.

Caussac.

2. Qui *solitarius* vocatur furunculus, is saepe in illis, qui secunda omnino valetudine fruuntur, ex caussis localibus, hucusque vix cognitis, probabili ratione, vel a plethora cutanea, vel ab adipis corruptela, vel ab insectis, vel a vermibus ⁶¹⁾ evolvitur. Ipse tumor inflammatorius cutis, cui *filaria medinensis* ansam porrigit, non multum nobis a furunculo alienus videtur ⁶²⁾. Alias furunculus,

⁵⁹⁾ RICHTER op. c. 1. Th. S. 133.

⁶⁰⁾ GERM. *Pfropf; Eiterstock*.

⁶¹⁾ In variis saltem animalibus tubercula vermibus scatent (RUDOLPHI op. c. Vol. I. p. 437.).

⁶²⁾ GERM. *der Medinawurm, der guineensische Fadenvurm*.

— GALL. *Le Dragonneau*. — ANGL. *The guineaworm*.

— Vermis hic in regionibus torridis endemicus, hinc inde in LITHUANIA obviis, longitudine duorum, trium,

culus, praesertim *habitualis*, a vitiis primarum viarum viscerumque abdominalium, a labe scrophulosa, scorbutica, arthritica, venerea, a laesa uteri et mammarum functione oritur. Excitatur vero hic morbus in genere a suppressa derepente transpiratione, ab actione diuturna frigoris, caloris ⁶³⁾, a mercurii abusu, et a febribus aliisque morbis e. c. a scarlatina, a morbillis, a variolis, ab erysipellate, imperfecte judicatis. Sunt, qui contagium accusent, ⁶⁴⁾.

§. XXXIII.

D i a g n o s i s.

1. Furunculi confundi possunt cum *urticaria nodosa*, cum *anthrace et carbunculo*, cum *psydracia* et cum *psora*. Facilis confusio.

2. Si *furunculi* per universam corporis superficiem prorumpant, ut ab *urticaria nodosa* distinguantur. Distinctio ab urticaria.

trium, duodecim pedum, crassitie chordae mediocri s et coloris albidii observatur. Habitat in tela cellulosa subcutanea hominis, praesertim ad pedes. Excitat pruritus intolerabilem, et, nisi vermis extrahitur, funestam inflammationem. Optimi de eo scriptores sunt: KAEMPFER (de dracunculo Persarum, in amoenitatum exoticarum Fasc. V. p. 524.) — GRUNDIER (Commerc. Litter. Nor. 1740.) et RUDOLPHI (Op. c. Vol. II. P. I. p. 56.)

63) FRANK Epit. Vol. IV. p. 40.

64) HEIM l. c.

quantur, ad sequentes characteres respiciendum est.

Urticaria nodosa.

Furunculi.

- | | |
|---|---|
| <p>a. <i>Pruritu</i> summo stipatur.</p> <p>b. <i>Tubercula</i> irregularia aut subrotunda refert.</p> <p>c. <i>Desquamatione</i> terminatur.</p> | <p>a. <i>Dolore</i> insigniuntur.</p> <p>b. <i>Tumores</i> circumscriptos et acuminatos exhibent.</p> <p>c. Semper in <i>suppurationem</i> transeunt.</p> |
|---|---|

§. XXXIV.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Furunculi interdum cum emolumento contingunt, ac non raro sub convalescentia aliorum morborum *criseos* sistunt *complementum*. Sic a furunculo aliquando febrem intermittentem quartanam solvi, VOGEL docuit⁶⁵). Convalescentes ex typho vidimus, quibus vires non prius, quam ubi unus alterve furunculus prodiisset, restitutae fuerunt. Luculentissimum quoque furunculi critici post erysipelas habuimus exemplum⁶⁶). Maniae, a

65) Praenot. P. I. p. 15.

66) Vetula, erysipelati habituali indolis arthriticae subdita, in eundem morbum initio hyemis 1811. incidit. Erysipelas dorsum occupabat, omnem desquamationem respuens. Conspicua virium prostratio, vigiliae, inquietudo et cephalaea jam vitae insidias struere videbantur, cum, furunculo in medio dorsi comparente, omnia illico in melius mutata fuerint.

copiosa furunculorum eruptione fugatae, casum refert HEIM ⁶⁷⁾. Furunculi autem, qui in senibus aut in hominibus, labe aliqua detentis, circa anum, ad perinaeum et serotum contingunt; eo quod facile ulceribus fistulosis ansam porrigant, mali ominis habentur.

2. In furunculo *locali*, eo quod nulla resolutio expectanda sit, prima suppurationem promovendi est indicatio, ac nisi abscessus, quo decet modo, locum inveniat, durities, per novam solum inflammationem dissipanda, relinqui solet. Ad suppurationem autem promovendam, in modico inflammationis gradu, cataplasma ex mica panis albi et lacte paratum, addito sub magnis doloribus croco, applicatur. Vigente nimio inflammationis impetu, regimen antiphlogisticum in auxilium ducendum est. Econtra si processus inflammationis et suppurationis lente incederent, cepae assatae, mel farinae mixtum ac similia, furunculo imponenda forent. Quoprimum autem mobilis est nucleus, is, nisi sponte secedat, per artem extrahatur, quo neglecto, cicatrix nulla formabitur, atque ulceris chronici fistulosi periculum imminebit. Raro hoc in opere cultro opus est. Praesentibus insectis sive vermibus, illa *foliis nicotianae tabaci et oleo* necanda, hi vero caute

Cura.

67) L. c. p. 161.

caute abigendi sunt ⁶⁸). *Furunculus symptomatiscus*, praeter curam localem, et remedia, morbo primario accommodata, exposcit. Latente diathesi scrophulosa, optime usus *sulphureti antimonii et hydrargyri*, cum *extracto conii maculati* conducit.

68) Pro *filaria medinensi* sequentem methodum commendat KAEMPFER: „Loci, ubi erumpere tentat, durities emplastro aliove medicamento emolliente maturatur, ut vermis infixus suppuratione sensim prolixiatur; deprehensi portio, quanta lenem attractionem sequitur, circa ligulam pollicaris longitudinis rotatur et epithemate retinetur, ne in ulcus recedat. Hoc indies gemina obligatione a pure suo liberatur, iterata semper attractione et totalis eductionis qualicunque tentamine. Raro vivus illico extrahitur (nisi in scroti cavo, vel sub pectoris cute haeret, ut media ejus pars arripi queat), plerumque diebus circiter decem elapsis aufertur. Cautio est, ne fiat attractio fortis et subitanea; illa inanis est et dolores excitat, haec periculosa, qua vermis plerumque rumpitur et intro recedit, multis symptomatibus aegrum afficiens, donec largiori suppuratione, vel eodem illo, vel novo ulcere excernatur. Verme penitus egesto, ulcus fistulosum vulgari quovis remedio paucos intra dies et supra omnem tractantis fidem, facillime sanatur. Vulgus pauper sola cepearum, sub cinere tostarum, impositione totum maturationis et eductionis negotium nec infeliciter perficit. Sunt, qui frequenti aquae frigidae affusione sibi consulere satagant,“ (l. c. p. 533.). Et *assae foetidae* locus concedendus videtur (*Schreiben des Dr. DE CARRO zu Wien über den Hautwurm in HUFELAND's und HILMEL's Journal der prakt. Heilkunde. 1813. p. 112.*).

ducit. In furunculo ex labe scorbutica et venerea orto, aliquoties *acidum nitricum dilutum* intus assumptum profuit. Rebelles furunculos, indolis ignotae, sed aperte ex vitio totius systematis pululantes et continuo recrudescentes, tum *decocto corticis ulmi campestris* ⁶⁹⁾, tum connubio *radicis acori calami, smilacis chinae* et *baccarum juniperi communis* pluries debellavimus. Nec *ulcera artificiosa* ad brachia in morbo rebeli negligenda sunt.

CAP. VIII.

De Anthrace et Carbunculo.

§. XXXV.

Definitio. Historia.

1. *Anthrax* est tumor inflammatorius, urens, circumscriptus, apice elevatus, citissime in gangraenam transiens. — *Carbunculus* est *vesicula*, sive potius *phlyctaena* gangraenosa, ambitu indurato, livido, splendente instructa ⁷⁰⁾.

2. Jam

69) Uncia una corticis pro libra desocti.

70) Uterque morbus indistincte vocatur: GRAEC. Ἀνθράξ. — LATINE carbunculus, furunculus gangraenosus,

Historia.

2. Jam HIPPOCRATES anthracum et carbunculorum mentionem iniecit ⁷¹⁾. Ita GALENUS ⁷²⁾, CELSUS ⁷³⁾, PLINIUS ⁷⁴⁾, ARETAEUS ⁷⁵⁾, AEGINETA ⁷⁶⁾, AETIUS ⁷⁷⁾ alique. HAHNIUS quidem et TRILLERUS; veteres, sub nomine anthracis, *variolas* descripsisse, crediderunt ⁷⁸⁾, at docte hanc opinionem WERLHOFFIUS refutavit ⁷⁹⁾. Clarior anthracis et carbunculi notio apud Arabas, praecipue apud AVICENNAM obvenit ⁸⁰⁾. Exactissima autem horum morborum descriptio recentioribus tem-

pus, malignus. — ARAB. *Giamrach*, *pruna*. — PERS. *Atshac* (GOLII lexicon. p. 651.) *ab atshca*, ignis. (NICOLAI lexicon harmonicon p. 70.) — GERMAN. *Brandbeule*, *Karfunkel*. — GALL. *charbon*, *carbuncle*, *anthrax*, *pustule maligne*. — ANGL. *carbuncle*, *anthrax*. — ITAL. *carboncello*, *crusco*, *carbonchio*. — HISP. *Lobanillo*. — ROSS. Огненной Вережь. — POLON. *Powietrzna chrosta*.

71) Epid. lib. II. Sect. I.

72) Lib. de atra bile. cap. 4.

73) Lib. V. c. 28. Lib. VI. c. 6. §. 10. c. 18. §. 5.

74) Histor. Natur. Lib. XXVI. c. 1. §. 4.

75) Lib. I. c. 9. de acut. morb. caussis.

76) Lib. III. c. 22. §. 29.

77) Cap. de pustulis in febribus.

78) Opuscul. medica. Vol. II. p. 13.

79) Disquisitio de variolis et anthrace. Opp. T. II. III. p. 745.

80) Lib. IV. Sect. 3. Tract. 1. c. 9.

temporibus debetur, opera FOURNIER ⁸¹), BORDENAVE ⁸²), CHAMBON ⁸³), VIMAT ⁸⁴), CHABERT ⁸⁵), ENAUX et CHAUSSIER ⁸⁶), LEMAISTRE ⁸⁷), CHOPART ⁸⁸), BUREL ⁸⁹), ACHARD ⁹⁰), CHATENET ⁹¹), PEREZ DE HERRERA ⁹²), MONAREDO et MOLINA ⁹³), QUINONES LAS LANGOSTAS ⁹⁴), TOSI ⁹⁵),

BAL-

81) *Observations et experiences sur le charbon malin.*

Dijon 1769.

82) *De anthrace. Theses anatomico-chirurgicae, resp.*

J. J. ROBIN. Parisiis 1765.

83) *Traité de l'anthrax ou de la pustule maligne. Paris*

1781. Et: Encyclopédie méthodique. Médecine T. 3.

Paris 1790. art. — Anthrax.

84) FOURCROY *médecine éclairée. T. I. p. 118.*

85) *Traité du charbon ou anthrax. Paris. 1782.*

86) *Methode de traiter la morsure etc., et de la pustule maligne.*

87) *Journal de médecine. T. 7. p. 254.*

88) FOURCROY l. c. p. 343.

89) *Ibid. T. 3. p. 11.*

90) *Ibid. T. 2.*

91) *Essay sur l'antrax. Paris, an. XI.*

92) *De carbunculis animadversiones. Pintiae 1604.*

93) *Paradoxa sobre la curacion local del carbunculo maligno. Jaen. 1701.*

94) *Del carbunculo. Madrit. 1720.*

95) *De anthrace seu carbunculo tractatus. Venetiis 1576.*

BALDINGER ⁹⁶⁾, GMELIN ⁹⁷⁾, PALLAS ⁹⁸⁾, HEILROTT ⁹⁹⁾, SCHRAUD ¹⁰⁰⁾, BRENSKY ¹⁾, KAUSCH ²⁾, HOFF ³⁾, MATHY ⁴⁾, KOPP ^{*)}, MAURER ^{**)}.

§. XXXVI.

Divisio. Symptomata. Autopsia cadaverum.

Divisio. 1. Anthraces et carbunculi in *symptomaticos* et in *primarios* dividuntur. De illis, utpote pestis et februm gastricarum symptomatibus, jam egimus ⁵⁾; quare de his tantummodo hic sermo erit.

2. Tum

96) *Neues Magazin.* 3. B. S. 73.

97) *Reise nach Siberien.* 4. Thl. S. 143.

98) *Reise durch Russland.* 2. B. S. 307. 544.

99) Librum, rossico sermone, sed ablato frontispicio, sine titulo, possideo.

100) *Nachricht vom Scharbock in Ungern, und Geschichte, des brandigen Ausschlages, welcher Pokolwar genannt wird.* Wien 1805.

1) *HORN'S Archiv* 1811. Februar.

2) *HUFELAND'S Journal der prakt. Heilkunde.* 1811. Septbr.

3) *Beobachtungen und Bemerkungen über die sogenannte schwarze Blatterkrankheit.* Altenb. 1812.

4) *Briefe über Gegenstände der Therapie.* 1. Thl. Berlin. 1801.

*) *Jahrbuch der Staatsarzneykunde.* Fünfter und sechster Jahrgang, 1813.

**) KOPP l. c.

5) P. I. V. I. §. XXXVII. 3. 4. §. LIX. 5.

2. Tum anthrax, tum carbunculus, cum pruritu, veluti ab ictu insecti, sive a scintilla, incipit. Sequitur vel *tumor* durus, inflammatorius, urens, solitarius, magnitudine plerumque baccae juniperi, vel majore, apice elevatus, in medio punctum sive maculam aut vesiculam gangraenosam exhibens (*anthrax*); — vel *vesicula*, sive potius *phlyctaena* gangraenosa, ambitu indurato, livido, splendente, instructa (*carbunculus*). Utroque in casu, sensus in puncto gangraenoso deletur, ac loca propinqua, praevio interdum glandularum vicinarum morbo augumento, rubore erysipelaceo, sive tumore oedematoso, sive utrisque, nunc cum, nunc sine dolore, corripiuntur. Rubor ille ad partes vicinas nonnunquam cum foco mali confluit; tumor vero vel supra eum elevatur, vel profundius haeret. Focus, aut crustam cineritiam, nigram (*eschara*), aut consuetae gangraenae humidae imaginem refert. Ibi anthrax sive carbunculus dicitur *siccus*, hic *humidus*. Raro malum solis integumentis inhaeret, sed plerumque musculos, tendines et pinguedinem afficit. Incisa anthracis aut carbunculi *sicci* substantia albicans, flava, livida, nigricans, ac non nisi paucas ichoris guttas manans, conspici solet. Anthrax vel carbunculus *humidus*, conspicuam et ex plurimis foraminulis saepe manantem saniei copiam largitur. Nunquam vero hisce in morbis suppurationis animadvertuntur indicia. Elapsis a
prima

prima morbi origine nonnullis horis, interdum uno alterove nychthemero, aegri vires franguntur, caput obtuse dolet, pulsus fit debilis, somnus inquietus est, et animus dejicitur. Jam vero febris, calore universae cutis vel nullo, vel modico, pulsu autem admodum frequente, saepe vacillante, aut contracto stipata, subintrat. Conqueritur aeger de anxietate, de doloribus vagis artuum, et de peculiari cordis sensu, quod ipsi sublevari videtur. Sequuntur vaniloquia, hebetudo, stupor, ac, nisi mature succurratur, mors ipsa. Feliciori in casu eschara secedit, vel gangraenae limites ponuntur, atque rejectis partibus mortuis, ulcus remanet purum, ocyus serius relictā cicatrice plus minus deformi, sanandum. Quoad *sedem* anthracum et carbunculorum, observati ii fuerunt ad oculos ⁶⁾, ad palpebras ⁷⁾, ad genas reliquamque faciem ⁸⁾, ad collum ⁹⁾, ad nucham ¹⁰⁾, ad dorsum

6) Herodotus Intreduct. c. 15. — LIEUTAUD *Journal de médecine* T. 29. p. 469.

7) AEGINETA Lib. 3. c. 22. §. 29. — AMATUS LUSITANUS Cent. 4. cur. 9. — DUPONT in CAPELLE *Journal de Santé*.

8) ACHARD, CHOPART l. c. WOYNIEWICZ Diss. de carbunculo faciei. Vilnae 1812.

9) CAVILLARDI *observations iatro-chirurgiques*. Lyon 1640.

10) TESTART *Journal de médecine* T. 43. p. 525. — MEASE in JONES *chirurgical Works*. — WERLHOFF l. c. — Plurima exempla anthracis nucham obsidentis in propria numero praxi.

um ¹¹⁾, ad mammas ¹²⁾ et ad manus ¹³⁾. Anthracem faucium ¹⁴⁾ ad scarlatinam, anthracem vero ni ¹⁵⁾ ad furunculum, gangraena accidentali tipatum, pertinuisse arbitramur ¹⁶⁾.

3. Animadvertente CHOPART, textus cellulosus partium anthraci sive carbunculo contiguarum sanguine soluto repletus, pulmones rubri, tumidi, sero innatantes, epiploon et mesenterium livida, intestina inflammata, gangraenosa, aliquando cum volvulis ¹⁷⁾, inveniuntur.

Autopsia
cadaverum.

§. XXXVII.

- 11) PANAROLUS Pentecost. II. — KIRKLAND *on the present state of surgery*. Vol. 2. — GOEKEL Consiliorum Cent. I. No. 53. JONES *transactions of Philadelphia*. Vol. I. P. I. No. 26.
- 12) BUREL l. c.
- 13) FRID. EPIPHANIO centum historiae.
- 14) ARETAEUS l. c. — TOURNEFORT *relation d'un voyage au Levant*. — *Recueil des actes de la Société de Santé à Lyon*. Vol. I. p. 28.
- 15) GARENGEOT *chirurgische Operationen*. 2 Thl. 5 Cap. S. 335.
- 16) Et POTT anthracem ani ad furunculum revocat (*Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Wundarzneykunst*. Dresd. 1771. S. 79.)
- 17) BERTIN *relations des accidents extraordinaires observés à la Quadeloupe sur les negres du quartier de la Capesterre, à la suite de l'usage qu'ils ont fait de la chaire d'animaux, mort d'une maladie épizootique*. (HUFELAND's Journal 1811. Octob.)

§. XXXVII.

C a u s s a e.

Contagium
epizooti-
cum.

1. Communissima carbunculi caussa in commercio cum bobus, vaccis et capris, *lienitide*, ut vocant, vel simili lue laborantibus, invenitur ¹⁸⁾: sicuti enim carnes hujusmodi animalium comestae, febres gastricas carbunculis *symptomaticis* stipatas gignunt ¹⁹⁾, ita jam solus eorum *attactus* carbunculo *primario* locum concedit. Visi enim sunt carbunculi ex cura bouum aegrotantium ²⁰⁾, ex tractatione pellium caprarum lue defunctorum ²¹⁾, ex detractatione pellis tauri infecti ²²⁾, ex introductione brachii in intestinum bovis aegri ²³⁾, ex

san-

18) Sic docent carbunculi saepius tum in Lithuania, tum prope Warsoviam (sub nomine *crustae nigrae, czarna Krosta*), tum in nonnullis Galliae meridionalibus regionibus (*charbon provincial*) obvii et quidem hic a PLINII temporibus (HARDUINUS in notis ad PLINIUM l. c. p. 391. — BOUCHE Lib. I. Historiae Provinciae. c. 8. p. 47.).

19) P. I. Vol. I. §. LIX. 5.

20) CHAIGNEBRUN in *histoire de l'academie des sciences à Paris* 1764.

21) SEZZONI in *Salzburger med. chirurg. Zeitung*, 1804. 3. B. S. 143.

22) J. P. FRANK in judaeo observavit.

23) *Fränkische Sammlung*. 3. B. S. 267.

sanguine bovis mactati ²⁴⁾, ex anatome vaccae ²⁵⁾, ac, uti vulgus in Lithuania contendit, ex ipso aëris contigui, ab effluviis epizooticis inquinati, afflatu Contagium lienitidis tam facile ex animalibus aliis ad hominem pervenire; ab homine vero ad hominem, uti videtur, haud propagari, mirum est *).

2. Jam PALLAS suspicatus est, anthracem in *Insecta;* *Siberia* endemicum (vulgo *Morawaja Isiva*) ab *insecto* originem trahere. Hanc opinionem et HEIROTT, et HOPF et REHMANN defendunt, quamvis nullus eorum praesentiam insecti demonstrare hucusque potuerit. Constat saltem, anthracem sibericum aestate fervidissima et in locis paludosis, ab insectis inquinatis, grassari, ac non solum homines, sed et equos bovesque, et in genere animalia, pauca lana oblecta, afficere. Constat inter *Calinucos*, insecta varia, praecipue *phalangium araneoidem*, *scolopendram morsitantem*, *bibionem sanguinarium* (vulgo *Moskora*) vitia cutis, anthraci similia, producere; nec minus constat, morbum, sine discrimine sexus et aetatis, inopinate cum pruritu et tumore, illi, qui ex punctura insectorum oritur, plane simili, ingruere, et cum cer-

24) GUALENDRINI in *Giornale di medicina*. Vol. 5. p. 135. REMER in HUFELAND's *Journal* 1814. Januar. P. 68.

25) *Göttingische gelehrte Anzeigen*. 1793. S. 165.

*) BRERA *giornale di medicina pratica* 1812. Cap. 4.

certissimo insectorum antidoto, *nicotiana*, profligari. Si objicias, malum sibericum, praepremis quidem faciem, sed haud raro et partes tectas prehendere; — exiguo insecto viam undique patere, facile respondetur. Praeterea BUREL historias trium aegrotantium, anthrace in Gallia correptorum, refert, quorum duo sensum puncturae ab insecto perceperunt, et tertius insectum, araneae simile, cum digitis arripuit. Observationes hujus naturae et apud CHOPART, ACHARD et RICHARD obveniunt ²⁶⁾. VIMAT, insecta per se innoxia, e. c. muscas, fortuito ichorem ulcerum malignorum, sive contagium epizooticum secum ferre, ac insonti alias punctura anthracem sive carbunculum excitare posse, autumat.

Cachexia.

3. Senes, cachectici, ebrietati dediti, retentionibus urinae obnoxii ²⁷⁾ animique curis vexati, anthraci haud raro subjecti sunt. Excitatur idem morbus in valetudinariis aut convalescentibus ab aestu solis ²⁸⁾ et a repetita vesicatoriorum in eundem locum applicatione ²⁹⁾. Et *bilis* inter causas illius pertinere videtur ³⁰⁾.

§. XXXVIII

26) *Recueil d'observations de médecine militaire*. Vol. 2. p. 517.

27) LA FONTAINE in *Götting. Anzeigen*. 1803. S. 626.

28) PORTAL *Précis de chirurgie pratique*. Vol. 2.

29) A vesicatorio ad nucham, brevi temporis spatio, ter repetito, bis hujus partis anthracem J. P. FRANK observavit.

30) Carbunculi hac ex causa, potius *symptomata* febris ga-

§. XXXVIII.

D i a g n o s i s.

- 1 Anthraces et carbunculi confundi queunt ^{Facilis confusio.}
 cum *erysipellate*, cum *furunculo* et cum *cancro* *).
2. Auctores nonnunquam anthraces et carbunculos pro *erysipellate* habuisse et vice versa, ^{Distinctio ab erysipelate.}
 ex dictis ³¹⁾ arguere licet. Differunt sequentibus notis.

Erysipelas.

- a. Ruborem *diffusum* exhibet.
- b. Pustulae tantummodo sub morbi *curriculo* evolvuntur.
- c. Gangraena solum in morbi *acme* aecedit.

Anthrax et Carbunculus.

- a. Anthrax, tumorem inflammatorium *circumscriptum* prae se fert.
- b. Carbunculus, in *primo* jam morbi *limine* pustula notatur.
- c. Gangraena *initium* tum anthracis tum carbunculi comitatur.

3. An-

gastro-biliosae constituere videntur. Interea carbunculus Hungaricus (POKOLVAR), quamvis symptomatibus febrilibus vix stipetur, attamen pro *bilioso* habetur a SCHRAUDIO (l. c. p. 112.).

*) Addere possum: cum *bullis* aut *pemphigo*, sic enim nuper Cl. HENNING accidisse videtur (HUFELAND's und HIMLY's *Journal der prakt. Heilkunde* 1813. Septbr. p. 89.) Hac in historia dijudicanda praecipue retinendum est, aegrum officium *macellarii* exercuisse. (p. 91.).

31) Cap. VI §. XXVI. 4.

Distinctio
a furuncu-
lo.

3. Anthracem et carbunculum pro morbis, gradu tantum a furunculo diversis, habitos fuisse, nomen *furunculi maligni*, quod illis tributum fuit, testatur. Conspicua autem inter hos morbos intercedit differentia:

Furunculus.

- a. Centro tumoris maxime *dolente* instruitur.
- b. Suppurationem *semper* exhibet.
- c. *Nucleo* in medio instructus est.

Anthrax et Carbunculus.

- a. Centrum mali *sensu orbatum* referunt.
- b. Suppurationem *nunquam* offerunt.
- c. *Gangraenam* in medio exhibent.

Differentia
inter anthr.
et carbunc.

4. Anthracis et carbunculi nomina ut *synonyma* vulgo sumuntur. Ex tradita autem utriusque mali definitione, alius opinionis nos esse elucet. Nec antiqui scriptores ³²⁾ anthracis a carbunculo distinctionem, cui nuperrime et MOUTON accessit ³³⁾, neglexerunt. Neque *gradu* tantum, e. c. uti

ery-

32) AVICENNA, anthracem sub nomine ignis *persici*, et carbunculum sub eo *prunae* descripsisse videtur. FRANC. WIDEMANN inter anthracem et carbunculum differentiam statuit, quod hic sedem suam semper in glandulis cutis habeat, ille vero in panniculo tum carnoso, tum adiposo (*Kurze und allgemeine Lehre der Wundarzneykunst. Augspurg. 1737. 2. edit. S. 299.*)

33) *Dictionnaire des sciences médicales. Paris 1812. T. 2. p. 183.*

erysipelas levigatum ab erysipelate pustuloso, dicti morbi inter se differunt: cum vesicula sive phlyctaena carbunculi tumori inflammatorio anthracis non *superveniat*, sed morbi illius jam constituat *initium*. Differentia demum anthracis a carbunculo ipsi caussarum diversitati superstruitur; insecta enim, cachexia *anthracem* potius; — contagium autem epizooticum *carbunculum*, *pustulam* scilicet malignam proprie dictam, excitant.

5. Cum carbunculo similitudinem habere videtur morbus, inprimis regionibus calidis proprius, de quo AETIUS ³⁴⁾, DIOSCORIDES ³⁵⁾, SEVERINUS ³⁶⁾, RIVERIUS ³⁷⁾, FORESTUS ³⁸⁾, potissime vero STRACK ³⁹⁾ sub nomine *epinyctidis* egerunt. Consistit epinyctis in *pustula* solitaria, sublivida, vel subnigra, maxime *noctu* in cute erumpente, cum dolore intensissimo, instar ignis urente, humore tenui et acri referta, post paucos dies in ulcus ichorosum sordidum abitura, materiam viscosam glutinosam fundente ⁴⁰⁾; nunc vero in *pustu-*

Epinyctis,
thermin-
tum quid
sint?

L 2

lis

³⁴⁾ Tetrab. IV. Serm. 2. c. 61.

³⁵⁾ Facile parab. cap. 172.

³⁶⁾ De recondita abscessuum natura. Lib. VII.

³⁷⁾ Observat. communic. No. 1.

³⁸⁾ Obs. chirurg. Lib. I. obs. 16.

³⁹⁾ HOEGEL Diss. de epinyctide. Mogunt. 1776.

⁴⁰⁾ STRACK quandoque plagas, quinque aut sex pollices long.

lis plurimis, discretis, eodem tempore in trunco vel et in extremitatibus corporis, fabae magnitudine vel etiam minore, erumpentibus. Thermintum Galeni huc pertinere verisimile est 41).

§. XXXIX.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Anthraces et carbunculi neque resolutionem, neque suppurationem admittunt; ac nisi ante totius systematis adfectionem, qua decet ratione, curemus, aegrotum praecipitant. Frequenter vero nimis morbi initium ab ignaris vilipenditur. Anthrax faciei, animadvertente jam AETIO, prae aliis malignus est. Pessimi quoque ominis observatur anthrax senum, nisi, eo comparente, alia evanescant incommoda. Nunquam autem carbunculum *criticum* vidimus. In genere, dum hi morbi sibi ipsis limites ponunt, bonum est. Si vero affectio localis celerrime decurrit, si morbus universalis eam proxime sequitur; mors ipsa, spatio pau-

longas, quatuor vero pollices latas, hinc inde cutem ipsam nigram, quasi igne adustam, secedente paulatim eschara profundiore, *foveam* in cute relinquente observavit. Cicatrices similes *Berolini* apud nonnullos, qui, fatente egregio HEIM, morbo cutis vix definiendo antehac laboraverant, me observasse recordeor.

41) *Therminti* GALENO sunt pustulae, basi rubra, purpurea, in apicem nigrum desinentes, summe dolentes, cum gangraenae periculo.

paucorum dierum, aliquando secundo jam ingruente nychthemero, praevidenda est.

2. Leges *politiae medicae*, adversus morbo-^{Prophylactica.}rum epizooticorum propagationem stabilitae, pericula quoque carbunculi hoc ex fonte contrahendi avertunt. Qui ab insectis oriuntur anthraces, hi forte cum *fumo*, ex stercore et vegetabilibus, in locis suspectis accensis, per aërem disperso, praepedirentur. Et corporis superficiem oleo illiniri, vel faciem saltem ope reus oleo foetenti imbuti obtegi, non inutile erit. Nec *assae foetidae* parandum foret.

3. In anthrace et carbunculo *a caussa externa* ^{C. generatim.} nascentibus prima indicatio est: irritationem inflammatoriam compescere, focus mali destruere, ac influxui illius in universum corpus limites ponere. Praesente *caussa interna*, actio principii morborum ad cutem promovenda, primae viae, si opus est, expurgandae, ac vires vitae sustinendae sunt. Haec ultima indicatio, et facto jam vitii localis in morbum universalem transitu, locum habebit.

4. Ad compescendam inflammationem focus ^{C. localis.} mali ambientem, praeter *hirudines*, *cataplasma emolliens* applicandum est. *Fomenta frigida*, hoc in morbo cum successu jam tentata ⁴²⁾ et quae ana-

42) YONGE in BEDDOES contributions to physical and medical knowledge. 1799. No. 5. Vide et FRIESE Annalen.

1. B. 1s St. No. 4.

analogia anthracis cum gangraena a gelu commendare videtur, ulteriori tentamini, saltem in recenti morbo, subjicienda forent. Senescente malo, ac inducto jam sphacelo, *fotus* partium finitimarum cum *herbis aromaticis in vino decoctis*, conducit. Plagae gangraenosae, parum extensae, *caustica*, e. c. aut *pulvis super-sulphatis aluminæ fusi* (*alumen ustum*), aut *nitræ argenti fusus* (*lapidis infernalis*), aut *urias antimonii* (*butyrum antimonii*), ne dicamus de *igne* ⁴³⁾ et *calce viva* ⁴⁴⁾ olim adhibitis, imponi queunt. Eschara jam mobilis, ut ichori liber concedatur effluxus, forficibus abigitur. Praesente autem majoris ambitus sphacelo, a causticis abstinendum, et *scarificatione* partis mortuae haec a viva separanda est. Licet et duplex filum cum acu incurvata per locum gangraenosum ducere, ac sumtis elevatisque extremitatibus illius, hunc discindere, ac si quid de sphacelo remaneat, per scarificationem abigere. Vel ipsa partis affectae *amputatio* proposita fuit ⁴⁵⁾. Loco, prius a gangraena obsessio, *unguentum* aut *digestivum*, aut de *styrace*, aut

aegy

43) CELSUS lib. V. c. 8. No. 1. — DE LA VIGNE: Ergo anthraci ferrum et ignis? Paris. 1616.

44) AETIUS l. c.

45) HELVETIUS: Ergo amputatione tutius, quam decussata sectione, anthrax serpens curandus? Paris.

aegyptiacum, aut simile ⁴⁶⁾ applicari debet. Interim a rebus nimis irritantibus abstinemus, ac ODIERI potius consilium, cataplasma ex *pulvere carbonum*, *opio* et *camphora* commendantis ⁴⁷⁾, sequimur. Immo si ulcus omnino purum fuerit, illud filamentis carptis, aqua tepida imbutis, cooperiri ac sanationis opus naturae committi, sufficiet. Siberiae populi anthracem cum acu vel subula perforare ac ope *muriatis ammoniae* et *foliorum nictianae tabaci* perfricare solent. Sunt inter eos, qui sine praevia scarificatione *lixivium potassae* et *decoctum tabaci* cum *alumine* super anthracem applicent. Alii cataplasma calidum ex pulvere *herbae solani dulcamarae* cum *muriate ammoniae*, *fermento panis* et *farina avenae* anthraci imponunt. Confirmata magis suspicione latentis in anthrace Siberiae insecti, *sulphuris* et *mercurii* virtus exploranda foret. Item *gummi resinae ferulae assae foetidae*.

5. Ve-

46) CHAMBON sequens commendat remedium: R. Pulveris acetatis cupri (aerugo crystallisata) unciam unam; — aloes succotrinae, gummi resinae myrrhae aa. unciam semis; — alcohol camphorati et ammoniati, theriacae venetae, mellis puri aa. unciam unam. F. unguentum. — MENERET unguentum ex vitello ovi et uncia una muriatis sodae (sal commune) parat et anthraci illiniri iubet (*Journal de médecine de Paris* 1810. p. 82.)

47) *Manuel de médecine pratique* p. 48.

C. univer-
salis,

5. *Venae sectio*, quamvis a medicis antiquis et non ita pridem a BERTINIO in anthrace et carbunculo commendata, tamen, rite cum aliis animadvertente CHAMBEON, vix locum obtinet. Prehenso econtra jam toto systemate et praesentibus indiciiis gastricis, nulla obstante contraindicatione ad *emeticum*, a SCHRAUDIO maxime laudatum, sine mora confugiendum est. A *remediis alvum purgantibus*, quoniam lente agunt, ac vires facile prosternunt, abstineri suademus. In anthrace a morbo universali originem trahente levia *diapnoica* cum parvis *tartritidis stibii et potassae* dosibus conducunt. Febrem ingruentem *acidis* tum *mineralibus*, tum *vegetabilibus*, inprimis *succo citri medicae* ⁴⁸⁾, temperare oportet. Decrescentibus magis magisque viribus, *decoctum corticis cinchonae officinalis*, infusum radicis *aristolochiae serpentariae*, *camphora*, *subcarbonas ammoniae*, cum *vino* et *jusculis carneis meracibus*, potissima sistunt auxilia. Vel somno indulgere, vel ab eodem abstinere ⁴⁹⁾ aeger cupiat, ejusdem hoc votis relinquimus. Sub *convalescentia* omnis in conditionem viscerum abdominalium dirigi debet at-

ten-

48) BERTIN l. c.

49) BORELLI, de carbunculo in urbe *Rupecurum* endemico loquens, abstinentioniam a somno per novem dies potissimum fuisse remedium, refert. (Cent. 2. observat. Obs. 12.)

entio, ac labefactata eorum functione, potissime
ad remedia amara, si alvus tarda fuerit, lenibus
purgantibus nupta, deveniendum est.

CAP. IX.

De Zostere.

§. XL.

Definitio. Historia.

. Phlyctaenae conglomeratae, magnitudine cir-
ter pisi, cum summo ardore, imprimis noctur-
no, praevia febre, interdum cum anxietate et
ymptomatibus gastricis ad unum tantummodo
orporis latus prorumpentes, *zosterem* ⁵⁰⁾ con-
stituunt.

2. PLINIUS primus inter veteres de *zostere* *Definitio.*
mentionem iniecit⁵¹⁾. De hoc morbo porro scrip-
serunt

50) A GRAEC. Ζωστήρ, Ζώνη — Circinus PLINII. Zo-
na aliorum. Zona ignea FR. HOFFMANNI. Ignis sa-
cer *auctor*. Hieropyr VOGELII. Herpes zoster, —
erysipelas zoster SAUVAG. — erysipelas phlyctaenodes
CULLENII. GERM. Der Gürtel. GALL. Ceinture dar-
treuse. ANGL. Shingles. ROSS. Рожесщной поясъ.

51) Lib. XXVI. cap. XI. Hist. natural.

serunt Jo. RHODIUS ⁵²⁾, M. A. SEVERINUS ⁵³⁾,
 NIC. TULPIUS ⁵⁴⁾, Jo. LANGIUS ⁵⁵⁾, Jo. HEELW
 GIUS ⁵⁶⁾, FR. HOFFMANNUS ⁵⁷⁾, SIM. SCHULZIUS ⁵⁸⁾,
 H. BRECHTFELDUS ⁵⁹⁾, PLATERUS ⁶⁰⁾, M. ADOL
 PHUS ⁶¹⁾, GULDENBRANDUS ⁶²⁾, inprimis vero LOR
 RY ⁶³⁾, BORSIERI ⁶⁴⁾, SCHROEDER ⁶⁵⁾ et WICH
 MANN ⁶⁶⁾.

§. XLI.

Symptomata. Causae.

Sympto-
mata.

1. Morbus cum sensu aegritudinis et cum do
 loribus artuum incipit. Accedit febris, pulsu fre
 quente et duro stipata. Haud raro amaror oris
 nausea, vomituro, cephalaea, anxietas, dys

pnoe

52) In notis ad Scribonium Largum. comp. 63.

53) Lib. IV. De recond. abscessuum natura. cap. IX.

54) Lib. III. obs. med. cap. 44.

55) Epist. 32.

56) Obs. physic. med. obs. 71.

57) Med. rat. syst. T. IV. P. I. cap. XIII.

58) Eph. N. C. Dec. I. an. 3. obs. 4.

59) Act. med. Hafn. Vol. I. obs. 108.

60) Op. T. II. p. 23.

61) Act. phys. med. Vol. X. obs. 9. p. 33.

62) Act. Soc. R. Hafn. Vol. I. p. 142.

63) Op. c. p. 17.

64) Op. c. Vol. II. §. 40.

65) De febribus erysipelatosi.

66) Op. c. I. B. S. 64.

pnocia et aliquando lipothymiae comparent. Jam primo morbi die, longe vero saepius secundo aut tertio, zoster, praevio maximo cutis ardore, raro ad caput ⁶⁷⁾ et collum ⁶⁸⁾, saepius ad extremitates tum superiores ⁶⁹⁾ tum inferiores ⁷⁰⁾, nec non ad abdomen ⁷¹⁾, frequentissime autem ad thoracem, prorumpit. Consistit exanthema hoc in phlyctae-
nis sive vesiculis, magnitudine circiter pisi, con-
glomeratis, racemosis, saepe confluentibus, sero
flavescente, rubello, interdum sublivido, odoris
exparte, acri, repletis, summum ardorem excitan-
tibus. Cutis conditio inter phlyctaeas, saltem
quidquam discretas, normalis cernitur. Id vero
zosteri proprium est, quod constanter unum so-
lummodo partis affectae latus, cinguli instar,
ad mensuram aliquot digitorum transversorum,
ambiat e. c. *caput*, ab auris parte postica, ad me-
dium nasi, vel frontem, veluti sertum, — *collum*,
a media laryngē ad medium nuchae, — *thora-*
cem, a medio sterni ad spinas vertebrarum dorsi,
— *abdomen*, a linea alba ad spinas vertebrarum
lumbalium, vel ab una ad alteram cristam ossium
ilei,

67) BURGIIUS in Eph. nat. cur. Dec. II. an. 3. obs. 171. —
Acta mea clinica. Vol. III. p. 22.

68) Unum solummodo vidi exemplum.

69) Zosterem antibrachii partem superiorem, veluti di-
midium armillae ambientem, in femina scenica poloni-
ca observavi.

70) BORSIERI l. c.

71) HAEN theses pathologicae de divis. febr. p. 3.

ilei, — *brachia* vel *crura*, a medietate sive superiore, sive inferiore etc. Peracta exanthematis eruptione, febris cum reliquis symptomatibus, saltem diurno tempore, remittit; noctu enim singula, et inprimis ardor loci affecti, exasperari solent. Tempus efflorescentiae inconstans est, vidimusque zosterem nunc spatio septem dierum devictum, nunc ad sextam hebdomadem protractum; quin immo de *chronico* zostere, apud BORSIERI habetur exemplum. Versus finem vergente morbo, phlyctenae flaccidae et corrugatae redduntur, ac partim cum desquamatione, partim cum exulceratione, aliquando cancro simili *), terminantur, quae ultima crustis aegre recedentibus, nonnunquam relictis fovea et dolore, profligatis ipsis jam exanthematis vestigiis, per longum tempus excruciente, ansam porrigit.

Causae. 2. Aetas juvenilis et media, nec non sexus sequior, potissimum zosteri subjiciuntur. Tempore inprimis hyemali hic morbus, in regionibus septentrionalibus, ut videtur, communior ⁷²⁾, occurrere solet. Plerumque refrigerium et errores in diaeta ansam illi porrigunt. Nec zosteri interdum *veneream* originem tribuere alieni sumus ⁷³⁾.

Rhus

*) Tale exemplum tempore, quo scribo, coram me habeo, exulcerationem scilicet dimidii brachii, ad aspectum plane cancrorum exhibentem.

⁷²⁾ Acta mea clinica l. c.

⁷³⁾ Ex duobus viris, cum femina lue laborante, eodem

Rhus toxicodendron nequaquam inter causas zosteris pertinere, jam dictum est.

§. XLII.

D i a g n o s i s.

1. *Zoster cum miliaribus, cum bullis, cum erysipellate, cum exanthemate mercuriali, cum hydroa et cum herpete confundi potest.*

2. *Miliaria, figurâ quodammodo zosteri similia, eo facilius cum eo confundi possent, quod utrique exanthemati saepe anxietas praecedat.*

Miliaria.

- a. Exanthema secundarium.
- b. Sudores eruptioni praecedunt.
- c. Solummodo pruritu, neque eo constante, eruptio annunciat.
- d. Certis corporis limitibus non circumscribuntur.

Zoster.

- a. Exanthema primum.
- b. Sudor vix ullus ante eruptionem.
- c. Ardor non solum eruptionem adnunciat, sed quoque eandem comitatur.
- d. Unum tantum partis affectae latus ambit.

3. Dum

circiter tempore commercium habentibus, unum *ulcus glandis* acquisivisse, in altero *zosterem abdominis* setutum esse, compertum habeo. Ille tandem in *luem universalem* incidit.

Distinctio
a bullis

3. Dum de *bullis*, lentium seu pisorum tantummodo magnitudine et dolore ardente ac intolerabili insignitis legimus ⁷⁴⁾, *zosterem* pro *bulli* fuisse habitum, supponimus.

Bullae.

- a. Dolor urens solummodo eruptionem praecedit, hac vero facta, moderatur.
- b. Maxima vesicarum, maturitatem adeptarum, pars magnitudinem *amygdalarum* attingit.
- c. Serum in vesicis contentum diaphanum et insons observatur.
- d. Limites minime agnoscunt.

Zoster.

- a. Dolor urens per omne morbi curriculum fere aequalis perseverat.
- b. Phlyctaenae nunquam *pisi* volumen superant, saepeque minores sunt.
- c. Serum, in phlyctaenis contentum, turbidum et acre est.
- d. Ad unum solummodo latus circumscriptus est.

Distinctio
ab erysipellate.

4. Quamvis BORSIERI et NESSI ⁷⁵⁾ *zosterem* ab *erysipellate* inprimis pustuloso distinxerint; horum tamen differentia primum a WICHMANNO recte stabilita fuit.

Ery-

⁷⁴⁾ REIL memorabilia clinica. Vol. I. Fasc. 2. p. 149.

⁷⁵⁾ Op. c.

Erysipelas pustulosum.

- a. Cutis, cui pustulae insident, rubore roseo plerumque detenta est.
- b. Pustulae *serius* quam rubor comparent.
- c. Volumen pustularum admodum *varium* est.
- d. Pustularum sedes *superficialis* est.
- e. Facta eruptione ardor remittit, ac aeger noctu multas non expectatur angustias.
- f. Exanthema diffusum.
- g. Crustae sub exsiccatione conspicuae, densae.

Zoster.

- a. Phlyctaenae cuti, colore normali praeditae, insident.
- b. Phlyctaenae *initium* exanthematis constituunt.
- c. Forma phlyctaenarum *stabilis* observatur.
- d. Phlyctaenarum sedes est *profunda*.
- e. Ardor vel facta eruptione continuatur, noctu intolerabiles excitando cruciatus.
- f. Exanthema *circumscriptum*.
- g. Crustae minimae, tennes.

Addit WICHMANNUS: erysipelas, symptomatibus gastricis stipari, zosterem autem absque illis obvenire; — aliter vero nos docuit experientia.

§. XLIII.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Zoster quidem aegros ob intolerabiles cruciatus et vigilias exhaustire, nunquam vero vitae insidias struere solet. Animadvertente PLINIO ⁷⁶⁾, res forte aliter se haberet, si morbus iste *totum hominem* afficere posset.

Cura. 2. Zoster instar exanthematis primarii gastrici curatur. Ne dolorum et inquietudinis causa, priusquam febris temperata et vitium gastricum deletum sit, ad *opium* confugiamus, cavendum est. Praescribitur autem hoc, debito tempore, sub forma, sic dicti, *pulveris Doveri*. Decrescentibus in diuturniore malo viribus, *cinchonae* et *vini* usus juste a *Fordyce* commendantur. Parti affectae, nisi desperabundus aeger locale auxilium quaerat, nil applicatur; tunc vero *cataplasma* ex mica panis, lacte et croco imponi potest. Crustarum autem spontaneus secessus expectari debet. Dolor a morbo relictus ope *vesicatorii*, loco affecto imposito, aufertur.

76) L. c.

CAP. X.

De Exanthemate mercuriali.

§. XLIV.

Definitio. Historia.

1. *Exanthema*, praevis symptomatibus febris Definitio.
 catarrhalis ac haud raro pyalismi, sub forma
 nunc papularum profunde rubrarum, confluen-
 tium, — nunc tuberculorum obscure rubentium,
 — nunc pustularum miliformium, prorumpens,
 ac incauto hydrargyrii usui originem debens, no-
 bis *mercuriale* dicitur.

2. Quamvis mercurii effectus aliquando noci- Historia.
 vi in corpus humanum jam dudum innotuerint⁷⁷⁾;
 doctrinam tamen morbi, de quo agitur, pro nova
 habemus. Prima illius rudimenta apud B. BELL⁷⁸⁾,
 J. PEARSON *) occurrunt et HORN **); addide-
 runt

77) BRENDL Progr. de inopinatis ex mercurio dulci no-
 xis. Opusc. T. I. p. 69. — SCHREIBER Diss. de mor-
 bo mercuriali. Erfurt. 1792.

78) *A treatise on gonorrhoea virulenta and lues venerea*,
 Vol. 2. p. 228.

*) *Observations on the effects of various articles of the ma-
 teria medica in the cure of lues venerea.* p. 167.

**) *Archiv f. med. Erfahr. Jahrg. 1812. 13 Heft. p. 145.*

runt his plura ALLEY ⁷⁹⁾, MORIARTY ⁸⁰⁾, SPENS ⁸¹⁾,
M^r. MULLIN ⁸²⁾ aliique ⁸³⁾.

§. XLV.

Symptomata. Caussae.

Sympto-
mata.

1. Incipit morbus veluti febris catarrhalis, cum magna et inconsueta inquietudine, debilitate, pruritu cutis, et nonnunquam, ut vidimus, cum sudoribus, odorem specificum, illi oris sub salivatione mercuriali quodammodo similem, manantibus. Plurimi simul ptyalismum et faucium inflammationem experiuntur. Vigente per unum alterumve diem febre, eruptio contingit, nunc sub forma *papularum*, tum laete, tum profunde rubrarum, summopere prurientium, instar *rubeolae*, — nunc sub ea, *nodulorum* sive *tuberculorum*, profunde rubrorum, circiter veluti *urticaria nodosa*; — nunc tandem sub forma *pustularum* miliaria-

79) *An essay on a particular eruptive disease arising from the exhibition of mercury. Dublin 1804. — Observations on the Hydrargyria, or that vesicular disease arising from the exhibition of mercury. Lond. 1810.*

80) *A description of the mercurial lepra. Dublin. 1804.*

81) *History of three cases of erythema mercuriale. (Edinburgh medical and chirurgical Journal 1805. No. 1. p. 7.)*

32) *Essay on erythema mercuriale. (Edinburgh med. and chir. Journal 1806. No. 5. p. 37.)*

83) *Acta mea clinica. Vol. III. p. 22.*

liarium, fluido pellucido, acri, rodente, saepe specificè foetente, repletarum, quae pustulae disruptae crustas, uti in herpete, gignunt. Sedes communissima exanthematis sunt scrotum et crura; non raro autem illud ad lumbos, ad abdomen vel super totam corporis superficiem, non excepta semper facie, extenditur. Facta eruptione, febris non solum non remittit, sed invalescit potius. Idem in graviore [saltem malo, de symptomatibus catarrhalibus, quibus cephalaea, pondus praecordiorum superaccedunt, dicendum est. Duratio efflorescentiae varia, ab una scilicet hebdomade usque ad mensem fere. Versus finem vergente morbo, vel desquamatio, vel secessus crustarum incipiunt. Desquamatio locum obtinet, dum eruptio sub forma papularum vel tuberculorum contingit; crustae vero plerumque occurrunt, dum eruptio ex vesiculis constitit. Sunt hujusmodi crustae ex flavo brunneae. Alias pustulae solidescunt ac demum desquamantur.

2. Peculiaris aegri adversus mercurium idio- Causae
syncrasia, forte a dispositione scorbutica derivanda *), — hydrargyrum, quacunque demum
ratione, ac quocunque in morbo, nimia copia ad-

M 2 hibi-

*) Convenimus hoc sub respectu cum CHISHOLM, qui mercurium solum pro causa occasionali ulcerum et impetiginum mercurialium habet. (*Are thoses diseases attributed to mercurial action on the system of the human body, peculiarly and exclusively generated by it? — Vide Medical and surgical Edinb. Journal. Vol. 8.*)

hibitum, — vel refrigeratio corporis sub modico etiam huius remedii usu, — potissimas exanthematis mercurialis causas sistere videntur. Hunc morbum nuper *in prole*, ubera matris, mercurium sumentis, sugente, ad crurum internam superficiem, sine ullis luis venereae symptomatibus, vidimus.

§. XLVI.

D i a g n o s i s.

Nominis
ratio.

1. Quoniam morbus, de quo agitur, neque leprae, neque erythematis notas prae se fert; eum potius *exanthema mercuriale*, quam sive *lepram mercurialem*, sive *erythema mercuriale*, quibus nominibus MORIARTY et M' MULLIN usi sunt, vocare maluimus. Posset et *Hydrargyria* *), aut *Eczema mercuriale* **) denominari.

Facilis
confusio.

2. Exanthema mercuriale confundi potest cum *miliaribus*, cum *urticaria*, cum *zostere*, cum *rubeola*, cum *herpete* et cum *impetiginibus venereis*.

Distinctio
a miliaribus.

3. *Exanthema mercuriale*, tum ob formam papulosam sive pustulosam, quam saepissime refert, tum ob peculiarem aegri inquietudinem, tum ob sudores frequenter foetidos, facile pro *miliaribus* haberi potest. Immo errorem hunc ii, qui

*) ALLEY op. cit. altero.

**) PEARSON l. c.

mercurium inter causas miliarium recensent ⁸⁴), commississe videntur.

Miliaria.

- a. Plerumque ad latera colli, ad mammas, ad antibrachia erumpunt.
- b. Peracta eruptione pruritus in multis nullus, in aliis satis moderatus.
- c. Liquidum in pustulis contentum mite, aliquando inodorum.

Exanthema mercuriale.

- a. Plerumque ad scrotum et crura efflorescit.
- b. Pruritus vel peracta eruptione continuatur, et quidem summus.
- c. Liquidum in pustulis contentum acre foetidumque.

4. Quod sub forma tuberculorum sese exhibet *Exanthema mercuriale*, hoc aegre ab *urticaria nodosa* distinguitur. Distinctio ab urticaria.

Urticaria nodosa.

- a. Plerumque in febribus, symptomatibus gastricis stipata, occurrit.
- b. Apex tuberculi colore ex albo rubro instruitur.
- c. Exanthema fugax est.

Exanthema mercuriale.

- a. Plerumque cum febre, quasi catarrhali, comparet.
- b. Totum tuberculum colore obscure rubro, notatum est.
- c. Exanthema constans.

5. *Exan-*

Distinctio
a zostere.

5. *Exanthema mercuriale* sub forma pustularum erumpens, utpote summe pruriens, ac anxietate stipatum, pro *zostere* haberi posset, nisi illud *totam*, quam aggreditur partem, hoc *medietatem* tantum detineret.

§. XLVII.

Prognosis. Cura.

Prognosis.

1. Si quis exanthema mercuriale pro symptomate luis venereae haberet, atque ob id in usu mercurii magis magisque continuaret, de salute aegri desperandum foret. Econtra, sub recta medela, exanthema mercuriale morbum sistit, interdum quidem rebellem, sed plerumque in aegrotantibus caeterum vigentibus periculo destitutum. Aliter res in valetudinariis se habet*). Qui eruptionem hujus exanthematis pro indicio sanatae jam luis venereae agnoscunt, in gravi errore versari videntur.

Cura.

2. Exanthema mercuriale veluti febris catarrhalis curatur. Interea libenter ibi remediis antimonialibus abstinemus, ac magis quam hic alvum movere studemus. Conducit et balneum simplex, te-

*) ALLEY inter 43 aegrotantes, (38 mares et 15 feminas) octo habuit demortuos. Dividit nuperrime *hydrargyriam* in *mitem*, *simplicem*, et *malignam*. (Op. c. altero.)

tepidum. Ad affusionem frigidam *) in morbo tot symptomatibus catarrhalibus stipato confugere non audemus. Devicta febre, tum *balnea sulphurica*, tum usus internus *aquae, gaz hydro-sulphuretum* continentis, prosunt. Somni defectui *opium* ad vespervas porrectum occurrit. Scriptores supra allati, usum localem *aquae calcis*, ac dein adspersionem subtilissimi pollinis *carbonum, farinae* sive *amylis* suadent; nos vero externa huic exanthemati remedia haud adponimus. Omnes a *plumbo* abstinere. *Ferrum* potius tentamini subiendum foret, utpote in ulceribus faucium a mercurio commendatum **).

CAP. XI.

De Scarlatina.

§. XLVIII.

Definitio. Historia.

1. *Scarlatina* ⁸⁵⁾ exanthema primarium, Definitio.

*) Bonum ab hac methodo effectum ALLEY expectat, ac ipse nunquam adhibuit (l. c.).

**) HORN l. c.

85) GERM. *Scharlachfieber*. — GALL. *Fièvre scarlatine*.

giosum sistit, praevis plerumque faucium affectione et febre prorumpens, cutim colore rubro obducens, ac desquamatione, relicto inprimis hydropis periculo, evanescens.

Historia. 2. Gentem Judaicam ⁸⁶⁾, Graecos ⁸⁷⁾ et Arabas ⁸⁸⁾ scarlatinam, saltem malignam, cognovisse, extra omnem dubitationis aleam positum est. Nihilominus absoluta hujus morbi descriptio primum *Ingrassiae* debetur ⁸⁹⁾. Secuti sunt FORESTUS ⁹⁰⁾, WIERIUS ⁹¹⁾, BALLONIUS ⁹²⁾, BONE-

TUS

ne. — ANGL. *scarlat fever*. — ITAL. *Scarlatina*. — BAT. *Purpur-hoorts, roothont*. — ROSS. Скарлатина, кармезинная сынь. POLON. *Szkarlat*.

86) *Osservazioni e riflessioni sulle scarlatine, di BENEDETTO FRIZZI. Trieste 1811. §. 1.*

87) ARETAEUS de morbis acutis, lib. VII. — AETIUS tetra. II. serm. 4.

88) AVICENNA Lib. IV. Fen 2. Tr. 4. 6. (Scarlatinam *Hemeka*, id est, betam rubram, vocat), — HALY ABBAS theorice lib. VIII. cap. 14. — RHAZES cap. XIV. cont. XVIII. 3. et ad Almansor.

89) De tumoribus praeter naturam. Tr. I. cap. I. (Refert, scarlatinam jam ante a. 1500. Neapoli sub nominibus *rossania*, *rossalia*, a colore scilicet rubro, sermone italico, *rosso*, notam fuisse.)

90) Obs. 2. Lib. VI. (Auctor de epidemia Amstelodami a. 1517. a TYENGIO observata, loquitur.)

91) Observ. rar. (Epidemia Germaniae inferioris a. 1564 et 1565 describitur. Vid. et SCHENK Obs. lib. VI. P. 775.)

92) De epidemiis. Lib. I. 2. et consultat. med. Lib. I.

(Do

TUS⁹³), ALPHONS. DE FONTECHA⁹⁴), PEREZ CASCALES GUADALAJOVA⁹⁵), P. M. DE HEREDIA⁹⁶), MERCATUS⁹⁷), CARNEVALA⁹⁸), NOLA⁹⁹), SGAMBARTUS¹⁰⁰), CORTESIUS¹), AETIUS AETUS²), SEVERINUS³), BARTOLINUS⁴), ALAYMUS⁵), SENNER-
TUS

(De epidemia Parisiis a. 1581, sub nomine *rubiole* grassante, quaestio est.)

93) Sepulchret. T. I. p. 479.

94) Disput. de angina. Lib. II. p. 22.

95) *Tract. de garotillo*. Matriti 1611.

96) De angina maligna. Vid. opusc. med. T. III.

97) Consultat. med. 14. de gutturis anginosi et lethalibus ulceribus; vulgo garotillo. Francf. 1625.

98) De epidemico strangulatorio affectu. Neapol. 1620.

99) De epidemico phlegmone anginoso. Neapol. 1620.
(Optimus de scarlatina, Neapoli epidemice grassante, scriptor.)

100) Opuscul. de pestilenti faucium affectu Neapoli saeviente. 1620.

1) *Miscell. med.* Messin. 1625.

2) *Liber de morbo strangulatorio*. Romae 1636.

3) *Lib. de recondita abscessuum natura*. Edit. Francf. 1643. p. 428.

4) *De angina puerorum Campaniae Siciliaeque epidemica*. Paris. 1648.

5) *Consultatio pro ulceris Syriaci, nunc vagantis, curatione*. Panormi 1632.

TUS ⁶⁾, DORINGIUS ⁷⁾, SMETIUS ⁸⁾, LOEW ⁹⁾, SYDENHAM ¹⁰⁾, MORTON ¹¹⁾, HUXHAM ¹²⁾, STORCH alias PELARGUS ¹³⁾, UNKER ¹⁴⁾, LANGHANS ¹⁵⁾, PLENCIZ ¹⁶⁾, HAEN ¹⁷⁾, GORTER ¹⁸⁾, SCHOENME-

ZEL

6) Op. omn. Vol. I—IV. T. VI. cap. 12. p. 483. (morbo nomen minime impertit.)

7) Epist. ad SENNERTUM. Vid. BONET. med. septentr. collat. Lib. II. c. 17.

8) Miscell. medica. Francf. 1611. p. 564. 568.

9) Hist. epid. Hung. Act. N. C. p. 26.

10) Opuscul. p. 328.

11) De morbillis et febre scarlatina. cap. IV—V.

12) Opp. de aëre et morbis epidemicis; nunc sub nomine febris anginosae (Vol. I. p. 92.), nunc febris miliaris rubrae (l. c. p. 60. Vol. VII. p. 115.), nunc febris miliaris malignae (Vol. I. p. 123.), nunc scarlatinae simplicis (l. c. p. 135. Vol. VII. p. 113.), nuncque eruptionis erysipelatosae (Vol. I. p. 95.).

13) Praktischer und theoretischer Traktat vom Scharlachfieber, wie solches vor etlichen zwanzig Jahren her, als eine seltsamne, jedock zuweilen grassirende Kinderkrankheit, aus vielen zur Hand gekommenen-Casibus kennen gelernt. Gotha 1742.

14) Conspect. med. p. 607.

15) Brevis delineatio morbi, qui a. 1652 in valle Simmia, epidemice grassatus est; in Act. Helvet. T. II. p. 260.

16) Op. med. physic. T. III. Vindob. 1762. Habetur versio germanica auct. Pflug. 1779. Et PLENCIZII filius animadversiones de scarlatina scripsit in MOHRENHEIMS Wiener Beyträgen. 2. B. S. 39.

17) Theses sistens febr. divisiones. p. 25.

18) Prax. med. T. II.

ZEL ¹⁹), BOEHMER ²⁰), BRUNNING ²¹), FOTHER-
GILL ²²), COTTON ²³), STARR ²⁴), WALL ²⁵), RUS-
SEL ²⁶), GRANT ²⁷), JOHNSTON ²⁸), WITHERING ²⁹),
PERCIVAL ³⁰), CLARK ³¹), SIMS ³²), PE-

ART

- 19) Diss. de scarlatina in annis 1775 — 76 epidemica.
Heidelberg. 1779. (FRANK delectus opusc. med. Vol. II.
p. 253.)
- 20) De febre scarlatina epidemice grassante. Halae
1764.
- 21) Constitutio epidemica Essediensis a. 1769 et 70. sis-
tens historiam febris scarlatino - miliaris anginosae. Ve-
sel. 1772.
- 22) *Account of the sore-throat etc.* Lond. 1751.
- 23) *Lettre to Dr. MEAD.*
- 24) *Philosophical transactions.* 1749. No. 46. 49.
- 25) *Medical Tracts, — Gentlemann's Magazin.* Vol. 21,
P. 497.
- 26) *Oecon. nat. in morb. gland.* p. 105.
- 27) *On fevers.* Vol. 2. p. 129.
- 28) *Memoirs of the medical Society of London.* Vol. 3.
art. 16.
- 29) *On the scarlat fever and sore-throat.* Lond. 1779.
(Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte. 5. B.
18 St.).
- 30) *Essays medical and experimental.* Lond. 1772.
- 31) *Observations on fever attended with ulcerated sore-
throat, as it appeared at Newcastle upon Tyne the year
1778.*
- 32) *Of the scarlatina anginosa as it appeared in London
in the year 1786.* (Mem. of the med. Soc. of London.
Vol. I.

ART 33), WALDON 34), CRICHTON 35), PAERS et
 BLACBURNE 36), RUSH 37), MALOCIN 38),
 LOISY 39), NAVIER 40), (HOMEL 41), RABOURS 42),
 LORRY 43), BRUGNONE 44), NANNONI 45), BER-
 TRANDI 46), ASCOW 47), BANG 48), EICHEL 49),
 Bi-

33) *Practical information on the malignant scarlat-fever
 and sore-throat.* 1802.

34) *Medical and physical Journal.* No. 94. p. 552.
 (Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte. 24. B.
 3 St.)

35) Vide infra.

36) FRIESE apud WILLAN op. c. p. 256. Not. ***).

37) *Philadelphical medical inquiries and observat.* 1789.
 p. 102.

38) *Histoire de l'academie des sciences, Art. esquinancie
 maligne.*

39) *Récueil d'observations de medecins d'hôpitaux militai-
 res pr. MR. RICHARD DE HAUTESIERK.* Vol. 2.

40) *Sur plusieurs maladies populaires qui sont regnées à
 Chalons sur Marne* 1753.

41) *Abhandlung über die brandige Bräune.* 1749.

42) *De ulcere tonsillarum.* (*Mémoires de l'académie de
 Montpellier — Journal de médecine* T. 31.)

43) *Actes de la Soc. R. de médecine.* Vol. 2.

44) *Opuscoli interessanti.* Torino 1777. Vol. I.

45) *Trattato di-chirurgia.* T. 2. p. 42.

46) *Opere anatomiche e cerusiche.* T. I. p. 57.

47) *Acta R. Societ. med. Havn.* Vol. II. p. 91.

48) *Ibid.* No. 3.

49) *Ibid.* No. 1.

BICKER ⁵⁰⁾, WILHELM ⁵¹⁾, HAGSTROEM ⁵²⁾, WILHE ⁵³⁾, SCHAEFFER ⁵⁴⁾, CAPPEL ⁵⁵⁾, HENRICI ⁵⁶⁾, KREYSSIG ⁵⁷⁾, TITIUS ⁵⁸⁾, STRUVE ⁵⁹⁾, STIEGLITZ ⁶⁰⁾, KLETTEN ⁶¹⁾, REICH ⁶²⁾, HORN ⁶³⁾,

HEIM

50) *Samml. auserles. Abhandl. für prakt. Aerzte.* 9. B. S. 132.

51) *Historia febris scarlatinosa a. 1766. Herbipoli epidemice grassantis.* Würzburg 1766.

52) *Samml. auserl. Abh. f. prakt. Aerzte.* 14. B. 5. St.

53) *Diss. inauguralis de angina infantum in patria (Suecia) recentioribus annis (1757 — 1764.) observata.* Upsal. 1764.

54) *HUFELAND'S Journal der prakt. Heilkunde.* 6. B. S. 224.

55) *Abhandlung vom Scharlachausschlage.* Gött. 1803.

56) *Ad historiam scarlatinae symbolae nonnullae.* Kilias Holsat. 1799.

57) *Op. c. (cap. III. § XII. 2. Not. 26).*

58) *Diss. de scarlatina, observationes et meletemata quaedam.* Wittenberg. 1796.

59) *Untersuchungen und Erfahrungen über die Scharlachkrankheit.* Hannov. 1803.

60) *Versuch einer Prüfung und Besserung der jetzt gewöhnlichen Behandlungsart des Scharlachfiebers.* Hannover 1807.

61) *De varia malignitatis ratione in febre scarlatinosa observationibus illustrata.* Lips. 1811.

62) *Neue Aufschlüsse über die Natur und Heilung des Scharlachfiebers.* Berlin 1810.

63) *Archiv für med. Erfahrung.* 1811.

HEIM ⁶⁴), BENEDICT ⁶⁵), ne dicamus de scriptoribus vel universam doctrinam medicam, vel eam morborum cutis in genere amplectentibus, inter quos ultimos WILLAN et FRIESE primum hic occupant locum.

§. XLIX.

Symptomata. Autopsia cadaverum.

Generatim. 1. Cum multum intersit, rectam *curriculi* exanthematum primariorum habere rationem, verum nil magis huic notioni obstet, quam diffusa symptomatum specialium illustratio, hanc illustrationem ad diagnosin remittimus atque hic solummodo decursum *scarlatinae* tum *simplicis*, tum *inflammatoriae*, tum *gastricae*, tum *typhodis* succincte exponemus.

Sc. simplex.

2. *Scarlatina simplex* cum sensu debilitatis, facie pallida, levi horripilatione, subsequente calore, siti, fauciumque affectione ingruit. Cuncta symptomata horis vespertinis augentur. Primo ad finem vergente nyctihemero, sive secundo incipiente, nonnunquam serius, praevio interdum tali sensu, ac si cutis aciculis puncta esset, exanthema sub forma punctulorum et macularum rubrarum, varias corporis partes occupantium, deinde confluentium, et sese per universam superficiem

ex-

64) Ibid.

65) *Geschichte des Scharlachfiebers, seiner Epidemie und Heilmethode.* Leipz. 1810.

extendentium apparet. Si digito tunc cutis comprimatur, rubor evanescit ac ablata compressione redit. Peracta eruptione, febris et faucium affectio vel imminuuntur, vel plane evanescunt. Jam tertio, quarto ab eruptione die, non raro quaedam desquamatio sub forma furfurum plurimis in locis animadvertitur, et exanthema decrescit, donec idem septimo sive octavo die morbi, comparente ampliori desquamatione, evanescat. Eodem hoc tempore, vel sudor universalis, vel urina cum sedimento puriformi, vel lenis alvi fluxus, aegritudini finem imponunt.

3. *Scarlatina inflammatoria* saepe a lassitudine, morositate, tristitia, capitis pondere, raucedine, rigiditate musculorum nuchae et maxillae inferioris, per aliquot dies perseverantibus, praesagitur. Sequitur febris cum horrore, cui calor summus, pulsus frequens, nunc depressus, nunc durus, cutis sicca, ardens, epistaxis, facies accensa, oculi fulgentes, rubri succedunt. Aliàs morbus immediate cum febre orditur. Ea vigente, quocunque in casu, faucium affectio, deglutitione summopere dolente stipata, molestissima fit. Examinatis faucibus rubor coccineus tonsillarum, palati, veli penduli, linguae et gingivarum, saepe sine partium affectarum tumore, conspicitur. Tonsillae plerumque plus minus lymphæ coagulabili obductae. Vox nasalis est. Glandulae submaxillares, quin immo et parotides, non raro tument.

Sc.inflam-
matoria.

tument. Interdum apparatus symptomatum gastricorum prodit. Versus noctem manifesta exacerbatio, saepe cum delirio, sopore, convulsione, respiratione calida anhelosa, suspiriis intersecta, occurrit. Exanthema tempore et modo, superius indicato, contingere ac decurrere solet. Saepe cutis praeter universalem ruborem, papulas miliformes aut phlyctenas exhibet. Peracta eruptione, febris haud multum remittit, quin immo, saepe invalescit, quod si acciderit, facile cerebrum, aures, trachea, pulmones, ventriculus, intestina, uterus et vesica urinaria ita in consensum trahuntur, ut symptomata, inflammationi horum viscerum propria, in conspectum veniant. Nec rarum est, sive miliaria, sive aphthas accedere. Nisi aeger decedat, febris plerumque sexto aut septimo die, ampla accedente desquamatione, solvitur. Interdum ea ad tertiam hebdomadam, vel et quadragesimum diem ⁶⁶⁾ protrahitur. Quot pericula convalescentem expectent, infra palam fiet.

Sc. gastrica.

4. *Scarlatina gastrica* symptomata, medium fere inter scarlatinam simplicem et inflammatoriam tenentia, exhibet. Praeterea haud raro debilitas conspicua, peticulae, et ascaridum lumbricoidum secessus ⁶⁷⁾ observantur.

5. *Scar-*

66 VOGEL's *Handbuch*. 3. Thl S. 235.

67) Sic in epidemia Cephaloniae accidit (ANGELO ZULATTI in *Giornale di medicina*. Vol. 2. No. 29.)

5. *Scarlatina typhodes* cum ingenti virium Sc. typho-
des. prostratione ac vertigine incipit; sequitur frigus, succedentibus calore, acutissimoque capitis dolore. Pulsus ut plurimum frequentes, parvi, interdum ab initio morbi, pleni et duri. Urina pallida. Urgent anxietas, diarrhoea et vomitus. Accedunt lipothymiae, suspiria, vigiliae aut sopor. Oculi fiunt turbidi aut rubri et lacrymantes. Aeger, vel sub ipsa deglutitione, sensum constrictionis potius quam doloris in faucibus percipit. Hae si examinentur, maculae ex albo cinereae, circulo rubro sive livido circumdatae, cito livescentes vel nigricantes, praecipue ad tonsillas, in conspectum veniunt. Nonnunquam et narium cavitates simili pacto laborant. Halitus maxime foetet, ac acerrimus ichor ex partibus gangraena correptis manat, qui, ab infantibus deglutitus, ventriculum et intestina aggreditur, vel in pulmonem depluit, varias hisce in organis excitando turbas. Neque parotides et ptyalismus raro hic observantur. Interdum collum et pectus cum suffocationis periculo riget atque intumescit. Primo sive secundo die, aliquando serius, exanthema, nunc levigatum, nunc miliforme, nunc pustulosum, mox rubrum, mox lividum, prodit. Occurrunt simul peticulae, vibices, miliaria. Inter ea morbus, symptomata typhi gravissimi, praesertim haemorrhagias, subsultus tendinum, singultum, exhibens, crescit, ac interdum gangraena,

per

per tubam EUSTACHII ad aurem proserpens, tympanum destruit. Plurimi hac sub rerum positione circa quartum morbi diem moriuntur. Felicioribus, secedente eschara fauces depurantur, et comparente sudore universali, vaporoso, calido, exanthema desquamatur. At, vel tunc multa aegros pericula circumdant.

Autopsia
cadaverum.

6. Cadaverum, de quibus agitur, superficies nunc rubet, nunc livet, nunc variegata est. Facile epidermis secedit, ac alia putredinis praematurae indicia cernuntur. Nonnullis ichor cruentus ex ore et naribus manat. Saepe vasa sanguinea turgida, meninges et cerebri superficies inflammatae, ventriculique cerebri sero repleti sunt. Tympani erosionem praeter alios HORN vidit ⁶⁸⁾. Lympha coagulabilis non solum fauces obducit ac interdum sub forma pseudomembranae obturat ⁶⁹⁾, sed aliquando in ipso textu celluloso musculos colli ambiente, invenitur. Interdum sphacelus faucium, ad oesophagi initium extensus occurrit. Neque exempla gangraenae, internam superficiem tracheae ⁷⁰⁾ et tubi intestinalis ⁷¹⁾ obducentis, desunt. Saepissime pulmones, vel prorsus normales,
vel

68) L. c. S. 263.

69) STARR l. c. Tab. I.

70) TAFFIUS obs. med. p. 42.

71) LE CAT *Philosoph. Transact.* Vol. 12. *Leskische Uebersetzung.* 4. B. S. 217. — LIEUTAUD *précis de médecine.* T. 2. p. 518.

vel roseo colore notati, sero copioso innatant. Vel eorum oedema hic observatum est ⁷²⁾. Nec hydrops pericardii in dubium vocari licet. Tumorem oedematosum scroti enormem CAPPÉL ⁷³⁾ et VOGEL ⁷⁴⁾ conspexerunt. Praeterea cadavera hominum ex scarlatina peremtorum saepe vestigia aliorum morborum chronicorum, inprimis hepatis, lienis et mesenterii, exhibent.

§. L.

C a u s a e.

1. Observationes CLARKII ⁷⁵⁾, HEBERDENII ⁷⁶⁾, C. praedisponentes, SIMSII ⁷⁷⁾ et nostrae docent: 1. infantes infra decimum aetatis annum quammaxime scarlatinae obnoxios esse; 2. utrumque sexum ad vigesimum annum usque pari pacto ab hoc morbo affici, ita tamen, ut non quodlibet individuum necessario illi subjiciatur ⁷⁸⁾; et 3. a vigesimo autem anno rarissime mares *), saepissime vero feminas, in-

N 2

pri-

72) CLARK l. c. p. 210.

73) L. c. S. 88.

74) L. c. S. 235.

75) L. c. et apud WILLAN l. c. S. 263.

76) Comment. de morbor. histor. et curat. p. 15.

77) L. c. p. 438.

78) Permulti medici, nec me excepto, inter aegros scarlatina affectos versantur, quin morbum contrahant.

*) Hoc ipso momento aegrum, vigesimum octavum aetatis

primis graciles et puerperas ab eo corripit. — Scarlatina plerumque circa aequinoctium tum vernale, tum autumnale occurrit ⁷⁹⁾. Quae hoc tempore evolvitur, haec per totum hyemis curriculum grassari solet. Verum nec aestatem hic morbus respuit ⁸⁰⁾. Vidimus eum continuo per plures annos regnasse ⁸¹⁾. Patet igitur SCHOENMEZELIUM omni jure contendisse, annuam constitutionem parum vel nil in scarlatinam influere ⁸²⁾.

C. excitans.

3. Causa scarlatinam excitans, procul dubio in *contagio* specifico locata est. Sic docet inprimis modus, quo hic morbus propagatur. Propagatur enim per contactum aut commercium cum aegris scarlatina laborantibus vel cum ipsis ex hoc morbo convalescentibus ⁸³⁾, nec non per usum suppellectilis, vestium, et mercium infectarum. Propagatio ista, nunc facillime, nunc difficulter locum obtinet, ita ut scarlatinam interdum cum LENTINIO ⁸⁴⁾, haud contagiosam dixeris

tatis suae annum numerantem ac scarlatina detentum, curo.

79) PLENCIZ l. c.

80) WITHERING l. c. p. 250. — RUSH l. c. p. 102. — WILLAN l. c. p. 264.

81) Vindobonae, ab anno 1797. — ad a. 1801.

82) L. c.

83) WILLAN l. c. p. 194.

84) *Beyträge zur ausübenden Arzneyswissenschaft.* 1785.

ris ⁸⁵). Nil potentius actionem contagii scarlatinae adjuvat, quam corporis, imprimis aestuantis, refrigeratio. Fertur, quod ii, qui effluvia aegrorum scarlatina laborantium prope suscipiunt, saepe sensum sulphatis cupri ad linguam percipiant et hinc inde in nauseam et salivationem incidunt ⁸⁶); verum id nunquam animadvertere potuimus. Periodus latentis contagii, nobis videtur plerumque quinque dierum. Sic et HEBERDEN aumat ⁸⁷). Duos solummodo dies BINNS ⁸⁸), tres sive quatuor WITHERING ⁸⁹) et septem GRANT ⁹⁰) stabiliverunt. Quoad originem contagii scarlatinae, densa adhuc ea caligine involuta est. Interim omni attentione opinio NAVIERI et PLENCIZII digna videtur, utpote qui scarlatinam tum a propriis animalculis, tum a pecudum affectionibus derivant ⁹¹). An forte *carbunculus oris* pecudum species scarlatinae malignae? — Ex homine in canem scarlatinam migrasse, HEIM refert ⁹²).

3. Caus.

85) WILLAN l. c. S. 194. — Acta mea clinica. Vol. III. p. 17.

86) WILLAN l. c. S. 296.

87) L. c. p. 18.

88) L. c.

89) L. c. p. 61.

90) L. c. p. 363.

91) Locis citatis.

92) L. c. p. 72.

C. proxi-
ma.

3. *Caussam proximam* scarlatinae in inflammationem specificam superficiei cutis, potissimum retis mucosi ponimus. Patet inde scarlatinae cum erysipellate affinitas, quae praeterea a febre, a rubore cutis, ad compressionem digiti evanescente, hac cessante revertente, a desquamatione et a proclivitate ad extravasatum, abunde confirmatur. Scarlatinam nisum naturae ad repellendam veterem novamque generandam epidermidem sistere, hypothesis est, ab aliis jam satis refutata ⁹³).

§. LI.

Diagnosis.

Symptomatum
illustratio.

1. Ut superius innuimus, potiora scarlatinae symptomata, nempe *faucium affectionem*, *febrem* et *eruptionem cutaneam*, speciatim nunc ad trutinam revocabimus.

Faucium
affectio.

2. In scarlatinam nemo incidit, quin ocysus serius *faucium* patiatur *affectionem*. Sic, exceptis CLARK et RUSH, omnes jure testantur scriptores. Constat autem haec faucium affectio *rubore*, *dolore* et *tumore*, nunc simul, nunc *separatim* obvenientibus. *Rubor*, formâ striae, per palatum molle sub uvula decurrens, saepe primum suscepti scarlatinae contagii indicium sistit. Serius is totam faucium cavitatem, praecipue tonsillas,

⁹³) *Jenaer allgemeine Literaturzeitung* 1810. No. 208. quo loco REICHII opus ad trutinam vocatur.

las, occupare, et plerumque ad oris cavum sese extendere solet. Haud raro rubor ob lympham coagulabilem fauces ita obducentem, ut albescant, ac falsam, rarissime hic latentis, abscessus imaginem prae se ferant, non animadvertitur. Alias rubor faucium sine omni incommodo praesto est, ac nychthemeri spatio jam evanescit; unde quam facile sit eum non animadvertere, quivis sponte intelligit. Plerumque tamen rubor hic ardore sive dolore stipatur, qui dolor in nonnullis epidemiis, morbi adventum annuntiat ⁹⁴), alias sub curriculo tantum aegritudinis, scilicet die septimo ⁹⁵), octavo, nono ⁹⁶), apparet. Maxime ille ad tonsillas sub opere deglutitionis, saepe impedito sive deletio, percipitur. Ingesta tunc vel ex oris angulis, cum saliva aliquando cruenta ⁹⁷), depluunt, vel per nares redeunt, concomitantibus impotentia verba rite articulandi, *tussi* ⁹⁸), et voce nasali interdum rauca, stridula ⁹⁹). Trismus

94) LOISY l. c. p. 263. Idem testatur EICHEL et SCHOENMEZEL.

95) Vidit Goettingae a. 1784 et 1785 pater meus, vidi Vilmæ hyeme a. 1811-1812.

96) Sic accidit in epidemia Berolinensi (Acta medica Vol. II. p. 20.)

97) PLENCIZ l. c. p. 20.

98) SIMS l. c. p. 405.

99) RUSH l. c. p. 102. Verum croup ex rubore scarlatinoso ad tracheam propagato observavit BATERMANN.

num ¹⁰⁰⁾ nunquam hic vidimus. Sub maximis licet faucium doloribus et deglutitionis impedimento, partes affectae tamen vix multum tumoris exhibent, ac potius *rigere* videntur. Interdum ab *aphthis* obsidentur. De gangraena faucium, utpote de exitu, speciei scarlatinae typhodi proprio, infra agemus.

Febris.

3. *Febris* pro varia morbi indole, variis symptomatibus stipari, ex dictis ¹⁾, elucet. *Frigus* ad duodecim horas protractum fuisse, LOISY ²⁾ refert. *Calor* interdum minor, quam ex rubore cutis expectandum foret; alias maximus et a thermometro confirmatus ³⁾ observatur. *Pulsus* raro magnus, fere semper obscurus, creber, et variabilis ⁴⁾, aliquando, praecipue apud infantes, intermittens et irregularis obvenit. *Urina* nunc limpida, nunc rubra, nunc nigra ⁴⁾. Versus finem morbi

(Report of diseases treated at the public Dispensary near great Carey-street. London from Sept. 1811 — to Jun. 1812. In Edinb. med. surgical Journ. 8. Vol. 9)

100) WITHERING l. c. p. 18. 21. — WILLAN l. c. p. 261.

1) § XLIX.

2) l. c. p. 265.

3) Ad 112 gr. Th. F. apud WILLAN l. c. p. 203.

4) Pulsuum istam in scarlatina fere *specificam* conditionem verbis describere nequeo, sed attentionem medicorum pro ea sollicito.

4) HEIM l. c. S. 70.

morbi lotium non raro sedimento puriformi, furfuraceo, quasi squamoso instruitur. *Sudor* vix unquam ante morbi finem animadverti solet. *Odorem specificum*, quem aegros scarlatina affectos spirare, HEIM contendit ⁵⁾, minime percipere potuimus. Febris scarlatinosa sat constanter *exacerbationes* vespertinas et nocturnas patitur. his vigentibus, aeger facilius, quam aliis in morbis, aliena loquitur ⁶⁾.

4. *Eruptionem* scarlatinae inter finem primi et initium secundi morbi diei posuimus, atque ita in genere. Non desunt enim exempla scarlatinae vel febrem praecedentis ⁷⁾, vel eam post nonnullas horas sequentis ⁸⁾, vel tertio, immo quarto ⁹⁾ morbi die erumpentis. Prima quidem eruptio plerumque ad faciem, jugulum, pectus et ad brachia, sed hinc inde vel ad crura et ad abdomen contingit. *Puncta*, sub quorum forma exanthema erumpit, innumerabilia cernuntur; *maculae* ad figuram rotundam tendunt. Saepe circumferentiae plurimarum macularum sese invicem attingunt, donec confluant, quod spatio unius nychthemeri accidere solet. Attamen rubor ad dorsum raro continuus, ac plerumque sub adpectu retis vasorum,

Eruptio
cutanea.

5) L. c. S. 69. 74.

6) HEBERDEN l. c.

7) HEISTER Compend. med. C. 3. Sect. 6.

8) LOISY l. c. Vol. I. p. 342. — EICHEL l. c.

9) HEBERDEN l. c. p. 20.

rum, quasi arte injectorum, apparet. Evidentissime exanthema ad lumbos, coxas et articulationes, floret. Calor illius ab initio est ex pallido, coccineus, cancri cocti fere instar, aut si quis verecundiae gratia erubesceret; deinde vero obscure ruber, veluti beta rubra, vel et lividus evadit. Probe autem notandum est, variam cutis conditionem, permultum in colorem exanthematis influere. Qualiscunque vero sit rubor, id, ut diximus, peculiare habet, quod ad compressionem digiti evanescat, ac ea ablata, a peripheria ad centrum redeat. Scarlatina nunquam tumore, saltem universali, stipatur. Manus econtra ita interdum tument, ut aeger digitos flectere nequeat. Et faciei palpebrarumque intumescentia nonnunquam observatur ¹⁰⁾. Animadvertente Sims, tumor cutis in scarlatina id proprium habet, quod valde doleat ¹¹⁾. Exanthema huiusmodi non solum universam corporis superficiem externam occupare, sed sese vel ad viscera extendere, tum ex descriptione morbi, tum ex autopsia cadaverum, elucet. Rubor oculorum primum in ea albugineae parte apparet, quae a palpebris tegitur ¹²⁾, unde medicus, ut mature de oculorum statu certior fiat, palpebras remove debet. Non obstante rubore, oculi lucem satis ferunt, et quamvis saepe tumidi sint,

atta-

10) BICKER l. c. p. 145. — STIEGLITZ l. c. p. 110.

11) L. c.

12) WITHERING l. c.

attamen nunquam lacrymantur. Scarlatinam neque naribus parcere, docet earum rubor, ac rara quidem, at haud neganda¹³⁾ et a BICKERO jam observata¹⁴⁾ sternutatio. Dysuria et tenesmus, quibus scarlatina interdum insignitur, de exanthematis ad vesicam urinariam et ad anum extensione testari videntur. Interdum autem scarlatina tantummodo *partialis* est. Id imprimis ad pectus, brachia, et genua, praecipue in adultis¹⁵⁾, vel fugato ante tempus universali exanthemate, eoque redeunte¹⁶⁾, contingit. Scarlatina nempe aliorum exanthematum instar, citius quam par esset, imprimis ob susceptum refrigerium, evanescere solet, quin immo datur, nobis aliisque¹⁷⁾ pluries visa, *febris scarlatinosa sine omni efflorescentia*. Stabilitur illius praesentia: dum aeger, qui scarlatinam nunquam perpessus erat, tempore quo morbus iste grassatur, in febrem incidit cum faucium affectione, characteres cynanches scarlatinae

13) WILLAN l. c. p. 198.

14) L. c.

15) NEUMANN in HORN's *Archiv* 1811. 2. B. 309.

16) HEIM in HUFELAND's *Journal* 1812. 38 St. S. 66.

17) HAGSTROEM l. c. p. 463. — JOHNSTON l. c. p. 353.

— DE MEZA l. c. p. 58. — SIMS l. c. p. 413. —

WITHERING l. c. p. 22. — VOGEL l. c. p. 226. —

CLARK l. c. p. 361. — LOISY l. c. p. 263. —

SCHAEFFER in editione operis ARMSTRONGII de morbis infantum p. 150. — CAPPEL — l. c. S. 77. —

STRUVE l. c. S. 193. — J. P. FRANK l. c. p. 67. etc.

nosae exhibente, nec non cum cute valde ardente, dumque totus morbus tempore scarlatinae praescripto, praecipue cum epidermidis desquamatio-
ne, terminatur. Interea exempla febris scarlati-
nosae sine scarlatina rariora numerarentur, si cu-
tis examen debita semper diligentia institueretur,
ac ruboris partialis major haberetur ratio ¹⁸⁾. Cae-
terum cavendum est, ne omnem mox ruborem
superficie corporis, potissimum apud lotrices et
feminas cuti candida instructas ac vehementer fe-
bre laborantes, pro scarlatina declaremus. —
Exanthemati huic *triplex est forma*, unde scarla-
tina dividitur in *levigatam*, in *miliiformem* et in
pustulosam. — *Scarlatina levigata* sive *plana*,
superficiem cutis tum visui, tum tactui aequa-
lem et planam offert. *Scarlatina miliiformis* sive
papulosa, quam EICHEL ¹⁹⁾, BICKER ²⁰⁾, LORRY ²¹⁾,

Bor-

18) „Non raro vidi exteriorem partem carpi levi rubore suffusam, cujus nusquam alibi reperire potui vestigium.“ (HEBERDEN l. c. p. 17.) — In puero septenni, nuper ex *cynanche gangraenosa*, quarto morbi die Vilnae defuncto, scarlatina, in quam per tres dies incassum inquisiverunt medici, non nisi *paucas ante mortem horas*, a chirurgo vesicatoria curante, fortuito detecta est,

19) L. c. p. 8.

20) L. c. p. 151.

21) L. c. p. 7.

BORSIERI ²²⁾, J. P. FRANK ²³⁾, LAUTH ²⁴⁾, CAPPEL ²⁵⁾, KREYSSIG ²⁶⁾, KIESER ²⁷⁾ aliique ²⁸⁾ descripsere, cutem universam, praecipue ad digitos et ad abdomen, asperam, anserinam, ac si granulis minutis sive seminibus milii conspersa esset, offert. — *Scarlatina pustulosa* sive *phlyctae-nosa*, sive *vesicularis*, cujus STÖRK ²⁹⁾, BARALDI ³⁰⁾, ROSENSTEIN ³¹⁾, DE MEZA ³²⁾, RUSH ³³⁾, KREYS-SIG ³⁴⁾, J. P. FRANK ³⁵⁾ et KIESER ³⁶⁾ ratio-nem

22) L. c. §. 31. ex: *Giornale di medicina di PIETRO ORTESCHI*. Vol. 9. No. 19.

23) L. c.

24) *Vom Witterungszustande, dem Scharlachfriesel und bösen Hals*. 2 Abthl. S. 23.

25) L. c. S. 141.

26) L. c. S. 12.

27) HUFELAND's *Journal* 1812. 18 St. S. 36. 29 St. S. 65.

28) HAHNEMANN in *Reichsanzeiger* 1806. N. 191. et in HUFELAND's *Journal* 24. B. S. 139. nec non WENDELSTAEDT ibid. 27. B. 3 St., sub erroneo nomine, *febris purpurae miliaris*.

29) *An. med. secund.* p. 46.

30) *Raccolta d'opusc. med. pratici*. Vol. 2. p. 202.

31) *Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten*, 6te Auflage mit Anmerkungen von LODER und BUCHHOLZ. S. 361.

32) *Compend. med. pract.* p. 59.

33) L. c. p. 123.

34) L. c. S. 57.

35) L. c.

36) L. c. 29 St. S. 83.

nem reddiderunt, *pustulis*, ortum exanthematis comitantibus, vel parum postea comparentibus, vel *phlyctænis* sive *vesiculis*, variolis similibus ³⁷⁾ ac die sexto, octavo, et tardius erumpentibus, primum sero, non aëre ³⁸⁾, repletis, dein, absorpto scilicet liquido, vacuis, plerumque desquamatione, interdum, praesertim in facie, crustis ³⁹⁾, terminandis, instruitur. In genere scarlatina *duplicem*, ut diximus, *desquamationem* exhibet, quarum una, die tertio sive quarto eruptionis, sub forma furfurum minimarum, praecipue ad extremitates, altera, die septimo, octavo, vel tardius, sub adpectu furfurum majorum vel squamarum, occurrit. Haud raro integra epidermis, partis denudatae, inprimis manuum et plantae pedum, figuram referens, interdum simul cum crinibus, unguibus ⁴⁰⁾ et verrucis ⁴¹⁾, secedit *). Et desquamationis species in oris et faucium cavis ⁴²⁾,
ne

37) Scarlatina variolosa, SAVVAG.

38) Sic docuit ROSENSTEIN.

39) BARALDI l. c.

40) Tale exemplum pater meus in femina Parmensi a. 1787 habuit.

41) LENTIN *Beyträge* No. 210.

*) Nullibi accuratius structura cuticulae apparet, quam in frustis, quae scarlatinae culpa, secedunt: lineas enim sulcatas spirales in digitorum apice, et ramoso-parallelas in vola manus, exhibent.

42) „Visa fuit lingua, sub desquamationis tempore, ita

ne dicamus in ipsa urina, animadvertitur. Ad volas manuum et ad digitos nova epidermis, aliquando jam sub antiqua, semi-elevata, compars, ruborem, a compressione digiti, non sine doloris sensu evanescentem, ac si pars vernice obducta esset, splendentem, exhibet *).

5. Scarlatinae variae formae cum *miliaribus* Facilis
cum *urticaria*, cum *erysipelate*, cum *morbillis*, confusio.
cum *porrigine*, cum incipiente *lepra squamosa*,
et cum *cynanche faucium* confundi possunt.

6. Scarlatinam miliariformem saepius sub no- Distinctio
mine miliarium, praecipue rubrarum descriptam a miliari-
fuisse, WILLAN et FRIESE demonstrarunt 43). Er- bus.
roni huic eo facilius locus est, cum, rite animad-
vertentibus LOISY, BRÜNNING et. PLENCIZ, mi-
liaria haud raro cum scarlatina connubium
ineant.

Milia-

a sua sorditie depurari, ut ejus epidermis cum spatulis rejiceretur. Similes lamellae ex narium quoque cavo secedebant." (EICHEL l. c. p. 10.) — Ipsam linguam cum palato desquamatam vidit STORCH (l. c. p. 215.)

*) Certum hinc est, quod cuticula, quo minus aëri exposita est, eo magis mucosa esse consuevit, exemplo partium internarum, quas cuticula mucosa et lubrica obvestit.

43) Op. c. p. 234. Provocant ad WINKLERUM (Eph. N. C. Dec. I. a. 6. 7. obs. 42.), ad LANGIUM (Prax. med. cap. 13.), ad SCHACHERUM. (De febre acuta exanthematica. Lipsiae 1723), ad ETTMÜLLERUM (De febre p. 527.)

Miliaria

- a. Raro in infantibus occurrunt.
- b. A sudore specifico praecedi solent.
- c. Scarlatinae tantummodo provectae superveniunt.
- d. Rarissime super totum corpus extenduntur.
- e. Rarissime faciem detinent.
- f. Evidentissima sunt ad latera colli et ad mammas.
- g. Desquamatio aut nulla aut parva observatur.

Scarlatina miliformis.

- a. morbus, infantilis est.
- b. Sudor ante eruptionem vix ullus observatur.
- c. Primis morbi diebus adest.
- d. Maximam corporis superficiei partem occupat.
- e. Faciem aliarum partium instar obducit.
- f. Evidentissima est ad digitos et ad articulos.
- g. Desquamatio conspicua.

Distinctio
ab urtica-
ria.

7. *Scarlatinam cum urticaria confuderunt SAUVAGES* 44), nonnullique inter auctores, qui de scarlatina ex esu cancri fluviatilis scripserunt 45).

Ur.

p. 527.) et ad RAYOERUM (Miscell. N. C. Dec. I. an. 3.).

44) *Urticariae nomen scarlatinae urticae impertit.* (cap. V. §. XXI.)

45) *Ibid.* §. XXII. 2.

Urticaria.

- a. Morbus haud contagiosus.
- b. Eruptio, sub magno pruritu, rapide contingit.
- c. Maculae inaequales, prominentes, tuberculosae, discretæ, in centro fere albescentes, sunt.
- d. Erratica et fugax est.
- e. Sub frigore ut plurimum evidentior fit.
- f. Sine vestigiis disparat.

Scarlatina.

- a. Morbus in genere valde contagiosus.
- b. Eruptio, lentius, et sine vero pruritu, locum obtinet.
- c. Maculae circulares, planae vel asperae, confluentes, omnino rubrae.
- d. Absente errore in regimine, efflorescentia satis constans observatur.
- e. A frigore evanescit.
- f. Desquamatione terminatur.

8. *Scarlatina*, quae, more consueto, uni-^{Distinctio}versam corporis superficiem occupat, ob id ^{ab erysipe-}late. ipsum *ab erysipellate* distinguitur ⁴⁶⁾. Non ita *scarlatina partialis*.

Ery-

46) Cap. VI. §. XXVI. 2.

Erysipelas

- a. Raro et per accidens tantum faucium affectione instruitur.
- b. Contagii vix adest suspicio.
- c. Sensim sensimque extenditur.
- d. Rubor saepe splendens, maxime ardens.

Scarlatina partialis.

- a. Constans observatur faucium affectio.
- b. Contagii plerumque certitudo.
- c. Praevia utplurimum scarlatina universali erumpit.
- d. Rubor haud splendens, parumque ardens.

Specierum
considera-
tio genera-
tim.

9. Cum descriptio curriculi variarum specierum scarlatinae ad diagnosin ipsarum rite instituendam haud omnino sufficere posset; hinc in tanti momenti negotio, vel sequentia addere, utile duximus.

Sc. simplex.

10. *Scarlatina simplex*, optime a SYDENHAMO 47) et a PROSPERO MARTIANO 48) descripta, ac ipsi interdum scarlatinae malignae intercurrentes 49), quamvis a CULLENIO haud visa sit, neque relate ad caeteras species constantem rationem habeat 50),

fre-

47) L. c.

48) Comment. in epidem. Hippocr. Lib. II. Sect. 3. v. 20.

49) Sic jam medici Neapolitani, et BICKER, FOTHERGILL aliique observarunt.

50) WILLAN l. c. p. 264.

frequentissime tamen, saltem in Lithuania, obvenire solet. Diagnosis illius potissimum ex remissione vel cessatione febris et faucium affectionis, a peracta jam eruptione, desumitur. Forma plerumque levigata; hinc inde tamen miliformis esse solet.

11. *Scarlatina inflammatoria*, a WITHERINGIO et SIMSIO exactissime descripta, epitheto *anginosae* sive *cynanchicae* non satis a reliquis speciebus distincta, haud raro, praecipue sub adspectu miliformi, obvenit. Diagnosis potissimum ex vehementia febris, faucium inflammationis vel peracta eruptione continuantis, nec non ex lentiori et irregulari, saepe viscerum phlogosi insignito, curriculo, depromitur. Reliqua a WILLANO alata diagnostica ⁵¹⁾ admodum incerta videntur.

12. *Scarlatina* haud raro *symptomatibus gastricis*, diarrhoea scilicet ⁵²⁾, vomituratione ⁵³⁾, constrictione ventriculi ad lipothymiam usque ⁵⁴⁾, insignitur; utrum vero ideo semper *gastrica* sit, ex dictis ⁵⁵⁾, dijudicandum.

13. *Scarlatina typhodes* sive *maligna*, tum a medicis Neapolitanis, tum a WIERO, BALLONIO,

O 2

Mor-

51) L. c. p. 203.

52) JOHNSTON l. c.

53) RUSH l. c.

54) PLENCIZ l. c.

55) Cap. I. §. IV. 19.

MORTONO, RUSSELIO, LANGHANSIO, WILKIO, CRAMERO, praecipue vero a FOTHERGILLIO et WILLANO, sub nomine saepe *cynanches gangraenosae* describitur. Quamvis enim, testantibus observationibus tum nostris, tum aliorum ⁵⁶⁾, et alii morbi, praecipue typhus in hominibus scorbuticis, gangraenam faucium exhibeant, attamen cynanchen illam faucium *epidemicam* et *contagiosam*, de qua fasti medici, nunquam sine exanthematis cujusdam mentione, et tantum eousque doctrina scarlatinae rite inclaruit, loquuntur, ad scarlatinam typhodem pertinuisse, cum praecipuis praesentis aevi medicis censemus. Ne quis autem credat, cynanchen faucium gangraenosam, ad scarlatinam typhodem constituendam absolute requiri, enimvero tum in epidemia scarlatinae, quae in orphanotrophio Vindobonensi a. 1801. saevierat, tum in *scarlatina puerperarum* in nosocomio majori ejusdem urbis ⁵⁷⁾, tum in epidemia a WALDONIO de-

scripta,

56) PETRUS A. CASTRO (de febre maligna punctulari §. 22. p. 232. Norimb. 1652.), RAMMAZZINI (Constitut. a. 1691—1694.), GRAMER (De anginae gangraenosae differentiis. Halae 1783.), PERKIN (*Essay for a nosological and a comparative view of the cynanche maligna or putrid sore throat, and the scarlatina anginosa, or scarlat fever with angina.* Lond. 1787.) DENGEL (Diss. in anginae malignae aetiologiam eique convenient. med. method. inquisit. Goett. 1792).

57) Pulchre hunc morbum descripsit articulus ac ingeniosus vir, MALFATTI-(HUFELAND's *Journal*, 12. B. 3. St. p. 120.)

scripta, saepe omnes scarlatinae typhodis notas, sine ulla faucium gangraena, invenimus. Quo magis vero scarlatina typhodes signo pathognomnico destituitur, eo magis caveri oportet, ne fortem alterius speciei scarlatinae gradum cum ea confundamus. Febris, aliquando in pulsu pauca⁵⁸), sed maxima virium jactura stipata. Haec virium prostratio, nec non contradictio symptomatum, evacuationes colliquativae, inprimis haemorrh-

p. 120.). Incipiebat aegritudo plerumque primis a puerperio diebus, ingenti virium prostratione; accedebat *levis faucium dolor*, subsequente scarlatina, saepe levigata, interdum miliiformi, coloris obscuri, violacei. Vires inde magis magisque infrangebantur, testantibus extremitatibus subfrigidis, saepe calori urenti succedentibus, pulsu minimo, anxietate et nonnunquam narium haemorrhagia. Lochia intolerabilem foetorem spargebant, ac aegrae fere omnes, *qualiscunque adhibita fuerat medela*, sine omni sive febris puerperalis, sive metritidis symptomate moriebantur. Similis morbi BANGIUS (Praxis medica p. 118.) meminit, et vehementer cum WILLANO (l. c. p. 231.) suspicamur, nonnullas epidemias inter puerperas sub nomine *miliarium rubrarum* descriptas, revera ad scarlatinam pertinuisse.

58) In epidemia insulae *St. Vincent*, observante COLLINS, infantes septimo morbi die, non solum nullum febris indicium exhibebant, sed erecti sedebant, ac de faucium tantum affectione conquerebantur. (*Medical communicat.* 2 Vol. Art. 22. p. 363.). „Nec multum fidere oportet, inquit MERCATUS, si febris non mox apparuit aut succrescat.“

morrhagiae et peticulae, certiora scarlatinae typhodis, sistunt indicia. Quoad faucium affectionem, crustae nigrae, quae et in benigna occurrunt scarlatina, nequaquam cum maculis gangraenosis, vix non semper cum halitu cadaveroso obvenientibus, confundi debent.

Sc. cum
dentitione.

14. Memorabilis est *scarlatinae cum dentitione* complicatio, praesertim cum vel simplex scarlatina aliquando dentium dolore ⁵⁹⁾, interdum a vehementi lumbagine secuto ⁶⁰⁾, instruat.

§. LII.

Prognosis.

Pericu-
lum.

1. Quamvis scarlatina simplex vix morbi nomen mereatur; attamen, tum ob facilem in diagnosi ⁶¹⁾ et in regimine errorem, tum ob pericula convalescentiam circumdantia, de illius exitu, imprimis in scrophulosis, aut sub dentitionis opere, semper caute judicandum est. Quantum periculi scarlatina inflammatoria et typhodes portentant, ex illarum descriptione et epidemiarum historia ⁶²⁾, elucet.

59) BOEHMER l. c.

60) SIMS l. c.

61) Scarlatina puerperarum etiamsi malignissima, saepe sub miti aspectu decurrere solet, ac expertissimos licet medicos facile in errorem ducit. Idem aliquando de scarlatina infantum valet.

62) In epidemia Amstelodamensi a TRENGIO observata, quibus intra sex vel octo horas apta remedia non adhibe-

elucet. Scarlatina gastrica, rite curata, sat benigna observatur.

2. Mali in scarlatina ominis sunt; coma, Semiotica, offuscatio oculorum, surditas, siccitas narium aegrum ad repetitam et inanem munctionem cogens ⁶³⁾, dentium stridor, impotentia deglutiendi, anxietas, respiratio difficilis, suffocationis periculum, diarrhoea vires prosternens, emphysema ⁶⁴⁾, peticulae, vibices, largae haemorrhagiae, urina pauca, fuga exanthematis ante debitum tempus et quin desquamatio sequatur, nervorum turbae, tremor cordis, abortus ⁶⁵⁾, aliaque ex prognosi encephalitiidis, peripneumoniae et typhi desumenda.

3. Nisi

hibebantur, ante sedecim vel viginti horas subito moriebantur. Teste BALLONIO autumnus a. 1575, omnes peribant, et non proficiebat hilum ars ea, quae multis auxilio esse solet. In epidemia a MERCATO descripta quivis, a morbo correptus, ante quartum diem moriebatur. Londini a. 1786—1787 duae tertiae partes aegrorum inter diem septimum et decimum nonnum interiere (WILLAN l. c. p. 213.). Apud KREYSSIG plurimi die tertio et quarto obierunt, ac pauci vitam ultro sextum protrahabant. Familias, quarum proles omnes a scarlatina periit, novimus. Septem eorum trucidatos numerabat mercator Pragensis.

63) KREYSSIG l. c.

64) WENDT *Klinisch. Annal.* S. 88—90.

65) BALLONIUS l. c.

Mala resi-
dua.

3. Nisi desquamationis opus rite absolvatur, haud pauci aegrorum, quamvis convalescentiae proximi, in febrem tumore et doloribus abdominis, vomitu, excoriatione circa anum, respiratione difficili, pectorisque cruciatu stipatam, quae plerumque sexto aut octavo die interficiuntur, incidunt; vel inopinate inquieti facti convelluntur, delirant, continuo e lecto prosiliunt, ac post aliquot horas fatum supremum subeunt ⁶⁶⁾. Nonnulli febrem intermittentem ⁶⁷⁾, longe autem saepius febrem hecticam, suppurationis internae effectum, experiuntur. Aliàs scarlatinam sequi solent: insignis cutis sensibilitas ⁶⁸⁾, dolores et tumores articulorum veluti in rheumatismo acuto ⁶⁹⁾, eorumque suppuratio ⁷⁰⁾, metastasis ad coxam, femoris luxationem producens ⁷¹⁾, abscessus ad mammas ⁷²⁾, ad parotides, ad glandulas submaxillares, axillares, inguinales ⁷³⁾, mesentericas ⁷⁴⁾.

66) NAVIER l. c. p. 21. — BICKER l. c. p. 160. — DE MEZA Acta Havn. T. II. p. 67.

67) HORN'S *Archiv.* 1811. S. 257.

68) CLARK l. c. p. 362. — Cutim a minimo attactu doluisse, observavi.

69) BICKER. RUSH.

70) SIMS l. c. p. 407. — WITHERING l. c. p. 18. 24.

71) *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte* 2. B. S. 7. 8.

72) WITHERING l. c.

73) BICKER l. c. p. 151.

74) FRIESE apud WILLAN l. c. p. 241.

cas *), tumores testicularum ⁷⁵⁾, erosio vasorum sanguiferorum subsequente haemorrhagia ⁷⁶⁾, urina cruenta ⁷⁷⁾, parulis et stomacace ⁷⁸⁾, ulcera ad angulos oris et linguam ⁸⁰⁾, abscessus colli et faucium, nonnunquam ad jugulum feliciter aperti ⁸¹⁾, alias ad externam vel internam gutturis partem letali eventu depleti ⁸²⁾, tussis chronica, asthma convulsivum ⁸³⁾, epilepsia ⁸⁴⁾, chorea St. Viti ⁴⁵⁾, mania

*) Diarrhoeae puriformes et cruentas scarlatinae reliquias, ex suppuratione glandularum meseraicarum, probabiliter jam ante scarlatinam labefactatarum, observavi.

75) HEBERDEN l. c.

77) BALDINGERS *Magazin*, 9. B. 3^{te} St. S. 208.

77) LORRY l. c.

78) Vilnae, hyeme a. 1811 — 12, saepius obveniebant.

79) In orphanotrophio Vindobonensi plurimi superata scarlatina scorbutici fiebant.

80) WILLAN l. c. — Saepe idem, tempore indicato, Vilnae conspexi.

81) HAGESTRÖM l. c.

82) RUSH l. c. Tale exemplum nuper in infante trium annorum conspexi.

82) J. P. FRANK a. 1793, pro viro Mediolanensi in consilium vocatus est, qui octavo aetatis anno scarlatinam perpassus erat, ex qua tussis chronica, post viginti duos annos in asthma convulsivum conversa, ortum duxit.

84) FRIESE l. c.

85) FRIESE l. c. et KREYSSIG l. c. S. 69.

86) WILLAN l. c. p. 208.

mania ⁸⁶⁾, aurium fluxus ⁸⁷⁾, sudores colliquati-
vi ⁸⁸⁾ et frequentissime *anasarca*. Morbus hic,
utpote ex scarlatina ortus, primum a STORCHIO,
dein, ne de recentissimis auctoribus loquamur, a
PLENCIZIO, WITHERINGIO, FRANKIO, et WEND-
TIO descriptus, interdum sub ipso desquamationis
stadio, hinc inde prima convalescentiae septima-
na, utplurimum inter decimum et vigesimum ab
exanthematis termino diem, nunquam post sex-
tam hebdomadem, cum lassitudine, morositate,
anorexia, adoritur; quibus tumor oedematosus,
faciem, praeprimis palpebras, manus et praecipue
extremities inferiores detinens ac plerumque no-
ctu evolutus, sequitur. Haud raro febris, inter-
dum faucium dolore stipata, constanter vero uri-
na pauca, carnis loturae instar, fere sanguinea,
aut brunneae, aut ex atro fusca, nonnunquam cum
sedimento roseo, globulos cruentos continente,
animadvertitur. Post paucos jam dies universa
corporis superficies, genitalibus, praesertim scroto,
non exceptis, hydropis *anasarca* phaenomena ⁸⁹⁾
prae se fert. Nisi mature tanto occurratur malo, facile
signa hydropis sive pectoris ⁹⁰⁾, sive abdominis ⁹¹⁾

sive

86) WILLAN l. c. p. 208.

87) RUSH l. c. — WENDT l. c.

88) Sic in femina a. 1793 in clinico instituto Ticinen-
si decumbente vidi.

89) Cap. XLI. §. CLXX, 1.

90) P. II. Vol. II. Cap. de Hydrothorace.

91) P. III. Vol. II. Cap. de Ascite.

sive cerebri ⁹²⁾ superveniunt. Causam transitus scarlatinae in hydropem, tempore hyemali communioris, sive in peculiari genio epidemico morbi ⁹³⁾, sive, quidquid dicat HEIMIUS ⁹⁴⁾ in refrigeratione corporis, sive in animi pathematibus, sive in erroribus diaetae, sive in cohibitis praepostere evacuationibus, praecipue diarrhoea, sive in opere desquamationis interrupto, sive in praevia systematis lymphatici labefactione, quaerimus. WILLANO contendenti, hydropem frequentiore et majorem esse, dum exanthema laete floruerat et largam exhibuerat desquamationem ⁹⁵⁾, nullo pacto assentiri possumus. Causa proxima hydropis post scarlatinam interdum quidem in atonia, longe autem saepius, testantibus observationibus medicorum Florentinorum ⁹⁶⁾, in statu inflammatorio exsudationem serosam largiente, locata est.

92) P. II. Vol. I. Cap. de hydrocephalo.

93) Sub nonnullis scarlatinae epidemiis, hydropem, irrita magna convalescentium cura, secutum, aliàs, nulla fere adhibita cautela, non abortum vidi. Comparandae sunt observationes VOGELII (l. c. §. 75.) et KRETSIGII (l. c. S. 73.).

94) L. c. S. 71.

95) L. c. p. 207.

96) Avvisi sopra la salute umana. T. 3. N. 5. — Jos. CALVI commentaria de hodierna Etrusca clinica. Extat in RONCALLI PAROLINI medicina Europae. — BOR-
SIERI l. c. §. 90. 91. 92.

est. Nisi morbus hic copiosa urinarum excretionē, vel sudore universali primis hebdomadibus solvatur, plerumque curriculo mensis, praecipue apud juniores et graciles, letalis evadit, unde *Cullenium* eum pro haud periculoso declarasse ⁹⁷⁾, vehementer miramur.

Secunda
infectio.

4. Scarlatinam *bis* eundem hominem aggredi posse ex eo elucet, quod ii, qui hunc morbum jam perpassi sunt, dum aegrotantibus scarlatina laborantibus adstant, interdum in faucium inflammationem, omnes characteres cynanches scarlatinae referentes ⁹⁸⁾, vel in febrem, exacte scarlatinae stadia percurrentem ⁹⁹⁾ incidere queunt. Scarlatinam autem *bis normali modo evolvi*, semel tantum vidimus ^{*}), minimeque viderunt WILLAN ¹⁰⁰⁾, WITHERING ¹⁾, ROSENSTEIN ²⁾ etc. Possibile

⁹⁷⁾ First lines. §. 664.

⁹⁹⁾ WILLAN l. c. p. 210. — WAGNER in *Frankfurter medic. Wochenblatt*, 1783, 23, 24. St.

⁹⁹⁾ In memorabili illa epidemia scarlatinae, quae in orphanotrophio Vindobonensi a. 1801, mense Novembris ingruit, plurimi, qui praegressis annis scarlatinam jam habuerunt, nunc solum in febrem, instar scarlatinae curriculum absolventem, inciderunt.

^{*}) In aegro in clinico Vilmensi decumbente. Lege et WETZLER in *Salzb. med. chirurg. Zeitung*. 1814. No. 8. p. 127.

¹⁰⁰⁾ L. c. p. 216.

¹⁾ Vide secundam editionem op. c.

²⁾ Op. c. cap. 16.

sibile id solum credunt, HEBERDEN ³⁾ et FORMEY ⁴⁾. Cavendum est, ne *ejusdem* scarlatinae, praepostere antea fugatae, post mensem, ut observavimus ⁵⁾, praevio miliari exanthemate *reditum*, cum desquamatione, pro *secunda infectione*, habeamus.

§. LIII.

C u r a.

1. Ad scarlatinam praepediendam commenda-
 ta fuere: errhina et collutoria ex ammoniac cum
 sufficiente quantitate aquae ⁵⁾, acida mineralia
 diluta tum interne, tum externe sub forma gar-
 garismatis ⁶⁾, subfumigia vel ope acidi muriatici
 sive simplicis sive oxygenati, vel ope acidi nitri-
 ci ⁷⁾, minimae doses succi inspissati herbae atropae
 belladonnae ⁸⁾, et ipsa scarlatinae insertio ⁹⁾,
 de quarum autem rerum effectibus, cum non qui-
 vis

3) L. c. p. 22.

4) *Medic. Ephemerid. von Berlin*. 1. B. 1. Heft. p. 15.

5) In clinico Vilnensi.

6) WITHERING l. c.

7) SIMS l. c. — NEUMANN *Aufsätze und Beobachtungen für Aerzte*. 1. B.

8) BINN's apud WILLAN p. 294. — AUGUSTIN *Archiv der Staatsarzneykunde* 1. B. 18 St. S. 10.

9) HAHNEMANN *Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers*. Gotha 1801.

9) FRITZE l. c.

vis homo necessario scarlatinae subijci debeat, arduum est judicare. Salus igitur in sola fuga contagii quaeri debet, cui scopo regulae adversus febres contagiosas jam traditae ¹⁰⁾, praecipue vero cura severa scholarum et ambulacrorum publicorum infantilium inserviunt.

C. sc. simplicis.

2. *Scarlatina simplex* secundum regulas generales ¹¹⁾ curatur. Neminem hoc ex morbo mori, nisi diligentia medici, pharmacis scilicet multifariis, SYDENHAM edixerat ¹²⁾, ac experientia testatur.

C. sc. inflammatoria.

3. Ad infringendam *scarlatinae inflammatoriae* vim, duo potissimum, praeter regimen generale ¹³⁾, auxilia sese exhibent, sanguinis scilicet et caloris detractio. Accedit lenis alvi purgatio. De singulis speciatim. — Febrem vehementem, cum pulsu pleno, duro et constante, calorem urentem, spirandi difficultatem, cum dolore quasi pleuritico, turgorem faciei, cephalaeam cum proclivitate ad encephalitidem, ardorem ventriculi et vomitum, nec non gravem faucium inflammationem, *venae sectionem* in quocunque scarlatinae inflamm-

¹⁰⁾ P. I. Vol. I. §. IV. 1. In Anglia nosocomia pro febribus contagiosis etiam scarlatinae dicata sunt (Jos. FRANK's Reise. 2. Thl. S. 301.).

¹¹⁾ Cap. I. §. VI.

¹²⁾ Sect. VI. Cap. 21.

¹³⁾ Cap. I. §. VI.

flammatoriae stadio, exposcere, MORTON ¹⁴⁾, FREIND ¹⁵⁾, DE MEZA ¹⁶⁾, LANGHANS ¹⁷⁾, BORSIERI ¹⁸⁾, VOGEL ¹⁹⁾, J. P. FRANK ²⁰⁾, KREYSSIG ²¹⁾, CAPPEL ²²⁾, STRUVE ²³⁾ aliique docent. Minorem huic operationi latitudinem CULLEN ²⁴⁾, HUXHAM ²⁵⁾ et COTTON ²⁶⁾ concedunt, ac eam fere prohibent CLARK ²⁷⁾ et WITHERING ²⁸⁾. Sane non omnis scarlatina, quamvis inflammatoria, venae sectionem perfert, unde indicatio potissimum a caractere illius sive annuo, sive epidemico desumenda est. In genere, nisi aeger plethoricus sit atque pulsum fortem et constantem exhibeat,

14) De febre inflammatoria universali. Cap. 5.

15) Historia medicinae p. 21. edit. Venet.

16) L. c. Vol. I. c. 18.

17) *Deutliche Anweisung sich selbst von den gefährlichsten Krankheiten zu befreien.* 1. Thl. S. 24.

18) Op. c. Vol. II. §. 85.

19) L. c. p. 242.

20) L. c. p. 88.

21) L. c. p. 130.

22) L. c. p. 192.

23) L. c. p. 273.

24) L. c. §. 660.

25) L. c.

26) L. c.

27) L. c. p. 170. 173.

28) L. c. p. 73.

beat, ob solam faucium, etsi gravem inflammationem, phlebotomiam *non* instituimus, sed *hirudines* sex, octo, duodecim circa collum poni, jubemus. Methodus haec saepe et complicationi dentitionis cum scarlatina accommodata est. Ad venae sectionem vero utique recurrimus, praesentibus in scarlatina inflammatoria signis sive peripneumoniae, sive gastritidis, sive encephalitidis, quo ultimo in casu et vena jugularis externa sauciari potest ²⁹⁾, *Cucurbitulis cruentis*, hirudinum loco, praecipue inter scapulas commendatis, ob periculum refrigerationis haud favemus, Mirum autem est, scarlatinam refrigerationi admodum adversam, sub certis rerum positionibus *affusionem* sive *lotionem frigidam* perferre. Medendi ista ratio a CURRIE primum commendata ³⁰⁾, a GREGORY ³¹⁾, REID ³²⁾, KOLBANY ³³⁾, NASSE ³⁴⁾, PETZ *) et WETZLER **) confirmata, a nobis quidem

29) PLENCIZ l. c. FREIND l. c.

30) Op. c. p. 458.

31) In propriis infantibus scarlatina laborantibus, se primum affusionem frigidam felicissimo rerum successu adhibuisse, mihi clarissimus Vir Edinburgi a. 1803. retulit.

32) *Medical and physical Journal*. Vol. 9. p. 27. *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte*. 25 B.

33) *Beobachtungen über den Nutzen des lauen und kalten Waschens im Scharlachfieber*. Presburg 1808.

34) HUFELAND's *Journal* 1811. October 4s St. S. 1.

*) MARCUS *Ephemeriden der Heilkunde* 6. B. 2s Heft.

**) *Salzburg. med. chirurg. Zeitung*. 1814. No. 8. p. 127.

dem necdum adhibita, sed, si methodus consueta diuturniori praxi confirmata quadam in epidemia nos derelinqueret *), procul dubio tentanda, sub iisdem circumstantiis, sub quibus illam in typho commendavimus ³⁵⁾, praesertim sub magno cutis calore, et summa illius siccitate, inter primum et quintum morbi diem, modo indicato ³⁶⁾, secunda quaque hora, locum obtinere dicitur. Forte et aqua frigida ore detenta contra cynanchen conducere-
ret? — Ad impetum inflammatorium scarlatinae magis magisque infringendum, nisi alvus jam nimis flueret, tum ad clysteres *antiphlogisticos*, tum ad *lenia evacuantia*, a SYDENHAMO quidem et a JUNKERO reprobata, sed a STORCHIO, ROSENSTEINIO, PLENCIZIO, BURSERIO, HAMILTONE ³⁷⁾ et STIEGLITZIO jure commendata, confugiendum est. Praeterea ad cynanchen leniendam *decoc-
tum tepidum herbae malvae rotundifoliae*, sive radicis *Althaeae officinalis*, sive *seminum hordei
dystichi*, addita si lubet tertia lactis parte, apud adultos pro oris *fotu*, apud infantes pro *injectione* faucium ³⁸⁾, apposito collo antea cataplasmate

*) Adspersionem aquae frigidae sine summa necessitate adhibere, inconsultum est.

35) P. I. Vol. I. §. LV. 3.

36) Ibidem.

37) Op. c. p. 30. — *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte*. 24. B. 23 St.

38) WENDT op. c. S. 32 — 35. *Injectio levi manu, inclinato*

Frank Prax. I. 2.

P

mate subcalido ex mica panis et lacte linteo fimo suscepto, conducunt. Praesentibus sive aphthis sive excoriationibus impuris gingivarum, cum halitu foetente, *infusum foliorum salviae officinalis cum subborace potassae* ³⁹⁾ aut cum nonnullis *acidi muriatici guttis et melle*, pro *collutorio*, tentari potest, dummodo non nimis irritent. *Acetatem plumbi* ⁴⁰⁾ et *capsicum annuum* ⁴¹⁾ nunquam hic usurpavimus. Si devicto impetu morbi inflammatorio, pituita densa, fauces et pulmones ita obrueret, ut suffocatio inde timenda foret, *emeticum* ^{*}), sub forma liquida ⁴²⁾, suppeditari debet.

C. sc. gastricae.

4. *Scarlatina gastrica emetico*, a WITHERING, HUXHAM, CULLEN, CLARK, RUSH aliisque commendat, curari potest, praesentibus magna sub studio invasionis virium dejectione, inquietudine et anxietate, absentibusque indiciis inflammationis viscerum abdominalium aliisque vomitorii contraindicationibus. Re dubia, *lenia purgantia emetico* anteponi merentur. *Muriatem hydrar-*

clinato antea corpusculo, imprimis capite aegrotuli ope syringulae angulo oris introductae, instituitur.

39) E. c. boracis drachmam semis vel integram ad libram infusi salviae.

40) RAULIN et BOUCHER in *Journal de medecine* Vol. 8.

41) CURRIE infusum ab initio ex grano uno, pro uncia una aquae parari jussit.

*) ALBERS in *Salzb. med. Zeitung*. 1813. No. 26. p. 11.

42) VOGEL l. c. p. 42. 52.

drargyri, praecipue sub vermium complicatione, reliquis remediis palmam praeripere plurimi docent⁴³⁾, ast methodum simplicissimam, exanthematibus gastricis in genere accommodatam, optime et hic nobis satisfecisse fatemur.

5. *Scarlatina typhodes*, si ab initio fuerit sive inflammatoria sive gastrica, tunc secundum regulas hucusque traditas, ita tamen, ut maxime virium habeatur ratio, tractatur. Cautissime hinc venae sectio, a SYDENHAMO et GRANTIO laudata, cujus vero deleterios effectus CHOMEL, CAPPEL et KREYSSIG recensuerunt, locum obtinet. Idem, monente FOTHERGILL, de *emetiis* dicendum. Declarato jam typhode caractere, vires vitae, consilio HUXHAMI, FOTHERGILLII, GRANTII aliorumque, remediis leniter excitantibus et transpirationem promoventibus (certe non veris sudoriferis) sustinendae sunt. Huc pertinent: *liquor acetatis ammoniae*, *succinas ammoniae empyreumaticus*⁴⁴⁾, *vinum antimoniale HUXHAMI*⁴⁵⁾, *aura*, sic dicta

C. sc. typhodis.

P 2

cam-

43) CAPPEL l. c. S. 202. 266. — STRUVE l. c. S. 282.

— KREYSSIG l. c. S. 107. Vid. et HUFELAND's *Journal*. 12. B. 3^o St.

44) E. c. pro aegrotulo quatuor annorum. R. Aquae florum sambuci nigrae uncias quatuor. Spiritus cornu cervi succinati grana quindecim. Syrupi sambuci unciam unam. M. D. S. Capiat omni hora cochlear infantile.

45) R. Vini tartradiis stibii et potassae (Pharmac. castr. Ru-

camphorata ⁴⁶⁾ etc. Provectioni in morbo, praecipue accedente faucium gangraena, ad validiora remedia deveniendum est. Testantibus NAVIER, HAEN, PLENCIZ, MORTON, FOTHERGILL, JOHNSTONE, HUXHAM, CULLEN, CLARK, PERCIVAL, WALL, *cortex cinchonae officinalis*, sub forma decocti saturati, extracti et clysterum porrectus, praecipuum inter ea occupat locum. Miramur WITHERINGIUM et CURRIE contrarium contendisse. Accedunt *acida*, vel cum *cortice*, vel cum vehiculo mucilaginoso sive alio suppositanda. *Acido carbonico* utebatur WALDON ⁴⁷⁾, *sulphurico* SIMS ⁴⁸⁾, *nitrico* DÜRR ⁴⁹⁾ et AUTENRIETH ⁵⁰⁾,
nuria-

Ruthenae) drachmam unam, aquae rosarum uncias quatuor. Syrupi Alkermes unciam semis. M. D.

46) R. Emulsionis amygdalinae saccharatae uncias sex. Mucilaginis gummi arabici unciam semis. Camphorae rasae granum unum.

47) R. Carbonatis potassae scrupulum unum. Solve in uncia una tincturae camphorae (cujusnam dispensatorii?) D. — R. Succo citri, tincturae cinamomi aa unciam unam. M. cap. sub actu effervescentiae omni hora sive bihorio. Si diarrhoea oriatur, auctor aliquot laudani guttas addit.

48) R. Infusi rosarum rubrarum uncias septem. Acidi sulphurici diluti, syrupi rosarum q. s. ad gratum saporem.

49) HUFELAND's *Journal* 25. B. 23 St.

50) *Versuche* 1. B. S. 381.

muriatico oxygenato WILLAN ⁵¹⁾, STANGER ⁵²⁾, BRAITHWAITE ⁵³⁾. Nos plerumque *tinctura aromatica sulphurea*, *decocto cinchonae* nupta, cui et KEARSLEY ⁵⁴⁾ favet, usi sumus. *Carboas ammoniae*, sub calore urente, delirio et proclivitate ad soporem a PEART ⁵⁵⁾ laudatur. Tandem *vino* sub iisdem rerum positionibus ac in typho ⁵⁶⁾ et hic locus est. Idem de *vesicatoriis* facile quidem gangraenosam plagam inducentibus, sed sub sopore, aurium dolore et pulsu debili, rite monentibus PERCIVAL, NAVIER et BUCHAN ⁵⁷⁾, quid quid dicant WITHERING et CULLEN, utilissimis, valet. Nunquam adhibuimus vel *balnea* tepida et *lavationem* corporis ope aquae calidae, suadente REID, vel *capsicum annuum* (*piper indicum*) a STEPHENS propositum ⁵⁸⁾ ac in epidemia a JOHN COLLINS descripta

51) L. c. p. 275.

52) *Medical and physical Journal*. No. 62.

53) *On the utility of oxygenate muriatic acid in the cure of scarlat fever.* (*Annales of medecine for the year 1803*. P. 487.)

54) *Gentlemans Magazin* Vol. 39. p. 522.

55) Sic praescribit. R. Alkali volatilis sicci drachmannam unam. Solve in aquae unciiis quinque. Cap. omni 2. 3. 4. hora duo cochlearia theae.

56) P. I. Vol. I. §. LV. 10.

57) *Médecine domestique* p. 273.

58) R. Capsioi (small red pepper, or three of the common cayenne pepper) quantum duobus cochleariis ordinariis capia-

scripta ⁵⁹⁾ corticis ipsius virtutem excellens, vel speciem *terrae absorbentis* sive *cretae*, cujus laudes CHIARAMONTI canit ⁶⁰⁾ quaeque per argumenta a priori haud rejicienda videtur, vel *muriatem hydrargyri*, olim quidem exhibitum ⁶¹⁾, de quo vero recentiores auctores silent, vel *gummi resinae lauri myrrhae* in aceto solutam et in decocto hordei porrectam atque a KEARSLEY laudatam ⁶²⁾. — Ad faucium gangraenam arcendam *collutoria* commendata fuere, ex *infuso rosarum rubrarum acidulato* ⁶³⁾, ex *decocto* sive *ligni haematoxyli campechiani*

capiatur. Muriatis sodae cochlearia duo parva thea-
na, contunde invicem in massam et adde aquae ebul-
lientis pintam dimidiam. Liquor frige factus coletur
et addatur aceti acerrimi pinta dimidia. Capiat (adul-
tus) omni horae dimidio cochlearis ordinarii quanti-
tatem. Dosis pro infantibus pro ratione aetatis im-
minuitur. Sumpto hoc remedio convulsiva quasi oe-
sophagi et stomachi reactio sequitur, cum caloris ma-
joris sensu ad fauces orisque cavum, sed mox singula
sedantur, cum universi corporis calore.

59) *Medical communications*. Vol. 2. p. 372.

60) *Osservazioni del contagioso mal di Ganna*. Napoli 1637.

61) HUXHAM l. c. part. 3. p. 115. — BAXLEY in RICH-
TERS *chirurgischer Bibliothek*. 5. B. p. 737.

62) L. c. p. 533.

63) BINNS sic praescribit: R. Infusi rosarum libram
unam. Acidi muriatici diluti scrupulum unum, Mel-
lis rosarum unciam unam.

pechiani ⁶⁴⁾, sive *corticis quercus roboris* ⁶⁵⁾, sive *radicis contrayervae* ⁶⁶⁾, ex *alcohol camphorato* ⁶⁷⁾, ex *simplici alcohol aqua remixto* ⁶⁸⁾, ex *tinctura myrrhae* ⁶⁹⁾, quorum remediorum loco, solummodo *decoctum cinchonae officinalis cum acido muriatico* ⁷⁰⁾, adhibuimus. Juvat quoque locis gangraenosis faucium, consilio SWIETENII ⁷¹⁾ et BORSIERII ⁷²⁾, mel cum *acido muriatico*, vel cum *tinctura myrrhae* illinire, donec eschara secedat, quo in casu iterum ad emollientia confugiendum est. Quid *subfumigia ex acido nitrico* ⁷³⁾, ex *aqua carbonate ammoniae mixta*

64) BINNS. R. Ligni campechensis unciam unam. Coq. ad col. librae unius.

65) BINNS.

66) FOTHERGILL l. c. p. 64.

67) NAVIER gargarisma, ex aceto, aqua, melle, et spiritu vini camphorato compositum, exhibebat.

68) SIMS.

69) *Medici Sueciae* : R. Infusi florum salviae libram unam, tincturae myrrhae drachmam unam, mellis rosarum unciam unam. M.

70) R. Decocti corticis cinchonae libram unam, acidi muriatici diluti scrupulum unum, mellis rosarum unciam unam. M.

71) Comment. T. II. §. 817.

72) L. c. §. 415.

73) WILLAN l. c. p. 281. Contendit hujusmodi subfumigia non solum faucium gangraenae, sed et propagationi contagii prospicere.

ta ⁷⁴⁾ ex *aceto* sive *simplici* ⁷⁵⁾ sive *camphorato* ⁷⁶⁾, sive cum *myrrha* ⁷⁷⁾ valeant, experientia destituti, ignoramus. Rarissime, saltem apud infantes, *scarificationi* plagae gangraenosae faucium, nunc cum successu ⁷⁸⁾, nunc infauste ⁷⁹⁾ susceptae, locus esse videtur. Tumefactis glandulis *sapo ammoniacalis* sive *unguentum althaeae* cum *unguento oxydi hydrargyri cinerei* illiniri potest. *Regimen diaeteticum*, uti in typho ⁸⁰⁾.

C. convalesc., et reliquiarum.

6. Quousque desquamationis indicia animadvertuntur, eousque convalescens domo exire nequit. Porro aëri libero, sensim sensimque adsuesci debet. Ut desquamationis opus acceleretur, cutisque corroboretur, ODIER lavationem universi corporis ope vini rubri, saponis et aquae calidae, commendat, simulque id caute et cito absolvi, atque aeger illico linteis calidis abstergi debere, monet ⁸¹⁾. Victus esto modicus, animusque tranquillus. Si natura in alvo deponenda deficiat, aut somnus cum ciborum desiderio haud redeat, more SYDENHAMI et HAMILTONI.

74) BORSIERI l. c. §. 417.

75) FRIESE apud WILLAN l. c. p. 281.

76) BORSIERI l. c. §. 420.

77) WALL, JOHNSTON, RUSH, GREGORY.

78) BORSIERI l. c. §. 413.

79) LIEUTAUD *Précis de médecine* T. 2. p. 521.

80) P. I. Vol. I. §. LV.

81) Op. c. p. III.

ut lenia alvum evacuantia praescribenda sunt, quo peracto debiliores, si opus sit, infuso frigido cinchonae cum lacte refici queunt. Maxime vero ad urinae secretionem respiciendum est, quae dum languet, illico decocto radicis ononidis spinosae, vel foliis digitalis purpureae, vel carbonate potassae⁸²⁾ excitanda. Cura hydropis anasarca suo loco tradetur⁸³⁾. Ad illud praepediendum balnea tepida suavit LENTIN⁸⁴⁾. Suffocationis periculum, interdum muriate hydrargyri cum extracto hyoscyami et vesicatorio, pectori applicito, avertitur. Parulis et stomacace incipientes, citissime aqua frigida sive glacie ore detentis, saepeque renovatis, debellantur. Caeterae scarlatinae reliquiae secundum regulas tum traditas⁸⁵⁾, tum debitis locis tradendas, curantur.

82) WITHERING l. c. p. 83. Nonnulla grana cum potu exhibet.

83) Cap. XLI. §. CLXXIV.

84) Memorabilia.

85) P. I, Vol. I. §. LVI.

CAP. XII.

De Morbillis.

§. LIV.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. *Morbilli* ⁸⁶⁾ exanthema primum, contagiosum constituunt, quod praevis animi inconsueta irritabilitate, symptomatibus catarrhalibus et febre, quarto circiter morbi die, sub forma punctulorum rubrorum, prominentium efflorescit, ac die octavo desquamatione, saepe furfuracea, cum periculo potissimum subsequenter phthiseos pulmonalis et ophthalmiae, terminatur.

Historia. 2. Morbillos sub nominibus *exanthematum*, *ecthymatum*, *ecphymatum*, *eczematum* etc. veteres cognovisse, MANARDI ⁸⁷⁾, FERNELIUS ⁸⁸⁾, TRUCO-

NI

⁸⁶⁾ GERM. *Die Masern*. GALL. *La rougeole*. ANGL. *Measles*. ITAL. *Morbilli*. ROSS. *Kopb*. POLON. *Odra*.

⁸⁷⁾ *Epist. med.* VII. p. 137.

⁸⁸⁾ *De absc. rerum caussis*. II. 12.

NI⁸⁹⁾, SENNERTUS⁹⁰⁾, SALMASIUS⁹¹⁾, HAHNIUS⁹²⁾ et TRILLERUS⁹³⁾ contenderunt; verum ex doctis GRUNERI disquisitionibus⁹⁴⁾, illos una cum variolis, a quibus gradu solum differre credebantur⁹⁵⁾, in Europa innotuisse, apparet. Genuinae morbillorum, praecipue epidemicorum, descriptiones, saepe sub nomine aut *Blactiarum* aut *Rubeolarum*, potissime SYDENHAMO⁹⁶⁾, HUXHAMO⁹⁷⁾, FR. HOFFMANNO⁹⁸⁾, ELLERO⁹⁹⁾, SCHLIER-

BACHIO

89) Tract. de variolis et morbillis. p. 232.

90) De febr. IV. 12. p. 510.

91) De ann. climat. p. 720.

92) Variol. antiquit. c. I. §. 2—16.

93) In epistol. ad calc. HAHNI de carbone pest. p. 4.

94) Variolarum antiquitates ab Arabibus solum repetendae §. 7—14. 17.

95) RHazes (de variolis et morbillis in continent. Lib. XVIII. cap. 8. interprete PERAGIO Judaeo 1486), OMNIBONUS (de arte medica infantum. Lib. IV. c. 22. p. 185). FAVENTINUS (Empirica de variolis et morbillis c. 22. p. 387), FUCHSIUS (Institut. medicae. Lib. III. Sect. I. p. 440). FONTENUS (Comment. in SEBASTIANUM AUSTRIUM de puerorum morbis. Cap. I. p. 513) et ETTMULLERUS (Doctrina practica Lib. I. c. 15. p. 369).

96) Opp. p. 47. 243. 291.

97) Op. T. I.

98) Opp. Vol. IV.

99) De cognosc. et curand. morbis. (Epidemia Berolinensis a. 1751. describitur).

BACHIO ¹⁰⁰), RANOE ¹), RAUO ²), KLAIBERO ³), HOMIO ⁴), WATSONIO ⁵), VOGELIO ⁶), MALOUI NO ⁷), DE LA ROBERDIERE ⁸), WENDTIO ⁹) et LE ROUX ¹⁰) debentur.

§. LV.

Symptomata. Autopsia cadaverum.

M. simp-
lices.

1. *Morbilli simplices sive benigni*, morositate, anorexia, tussi sicca, raucedine, sternutatione, continua emungendi necessitate, oculorum pruritu et rubore, lucis intolerantia, lacrymatione et febre ingruunt, quae symptomata cum remissionibus plerumque matutinis, ad quartum usque diem protrahuntur. Hac die, exanthema sub forma punctulorum prominentium, rubrorum, coloris fere fructus rubi idaei, primum ad faciem, dein ad pectus, ventrem et reliquum corpus, sine pru-

100) Act. phys. med. Vol. VI. obs. 59.

1) Act. soc. med. Hafn. T. I.

2) Historia febr. morbillosae a. 1751. in agro Geislingensi grassante.

3) De epidemia rubeolosa Kircho-Teccensi a. 1768.

4) *Klinische Versuche* S. 102.

5) *Medical observations and inquiries*, Vol. 4. No. 11.

6) L. c. 3 Th. S. 219.

7) *Histoire de la Soc. R. des sciences* 1749.

8) *Recherches sur la rougeole*. Paris 1776.

9) Op. c.

10) *Traité sur la rougeole*. Paris et Strasbourg 1807.

pruritu, et quin symptomata stadii invasionis multum remittant, in conspectum venit. Efflorescentia tres, quatuor dies, sub continua febre, tussis, ac haud raro sub cruoris e naribus stillicidio, perstat, atque circa octavum, vel nonum morbi diem, praevia plerumque desquamatione furfuracea, evanescit.

2. *Morbilli inflammatorii* eadem symptomata M. inflammatorii. stadii invasionis, at in majori gradu exhibent. Praeterea dolet caput, inflamman-
tur oculi, tum-
ent palpebrae et aeger a tussi, sive inani, sive sputo crudo stipata, a dolore punctorio pectoris, a decubitu impedito, a dyspnoea, a somnolentia, et a pavoribus sub somno excruciat. Maxime autem febris, cum frigore incipiens, ac dein summo calore, siti, pulsu pleno aut contracto et duro, exacerbationibus nocturnis, palpitatione cordis, haemorrhagiis praemagnis, interdum vomitu et diarrhoea stipata, viget. Sub finem tertii nycthemeri, interdum quinto, sexto die, morbilli erumpunt. Nullum inde affertur levamen, quin immo tussis inprimis exasperatur, ac non raro sudores inanes superveniunt. Stadium efflorescentiae ad nonum vel undecimum morbi diem protrahi, et veluti in morbillis simplicibus terminari solet, nisi febris, peripneumoniae symptomatibus insignita, continuet, quo in casu sive convalescentia, sive transitus morbi in phthisin
aut

aut in alia mala, sive mors citius tardius subsequitur.

M. gastrici.

3. *Morbilli gastrici* veluti simplices decurrunt, at majori virium prostratione et consuetis signis sive saburrarum, sive bilis, sive pituitae, sive vermium comitantur.

M. typhodes.

4. *Morbilli typhodes* a tussi fere convulsiva, a virium prostratione animique dejectione, interdum diu perseverantibus, praecedi solent. Tandem frigus, succedente calore interno, cum reliquis consuetis morbillorum futurorum signis, ingruit. Adsunt praeterea cephalagia, vertigo, vigiliae sive sopor, delirium, cardialgia, aliquando vomitus, aut diarrhoea, fluxus dysentericus, tenesmus, haemorrhagiae effrenae, tremores, subsultus tendinum, aliaque febris typhodis symptomata. Exanthema nunc citius nunc tardius solito, interdum praeviis convulsionibus, uno impetu per universum corpus, coloris plerumque fuscisive atri, saepe cum interjectis peticulis, erumpit, vel aeger sub eruptionis opere e medio tollitur. Efflorescentia hinc inde per paucas solummodo horas protrahitur, ac praepostere fugata, singulorum symptomatum augmentum, aphoniam, sphincterum paresin, gangraenam variarum partium, et mortis stertorem post se trahit. Nec omnes, qui desquamationis periodum attingunt, vades emersisse censendi sunt.

5. Mor-

§. Morbillos, viscerum superficiem obtegen- ^{Autopsia}
 tes ^{cadaverum.} ¹¹⁾, nunquam observavimus, vidimus autem
 eadem prorsus phaenomena, quae post febres catar-
 rhales in cadaveribus obvenire solent ¹²⁾, inpri-
 mis inflammationem tracheae ultra bipartitionem
 extensam, materiam puriformem, internam bron-
 chiorum superficiem obducentem, serum in cavi-
 tate pectoris extravasatum, pulmonem sanguine
 turgescens, aliquando roseo colore obductum,
 nunquam vero, nisi praesentibus forte tuberculis,
 inflammatum aut suppuratum. Aliorum obser-
 vationes ¹³⁾ hic cum nostris plane conveniunt.

§. LVI.

C a u s s a e.

1. Quamvis aetas infantilis et juvenilis atque C. praedis-
 constitutio irritabilis praecipue ad morbillos ^{ponentes.}
 praedisponant; tamen hoc exanthema nec proli,
 sive in utero adhuc delitescenti ¹⁴⁾, sive vix in
 lucem

11) LIEUTAUD *Precis de médecine* p. 604.

12) P. I. Vol. I. §. LXV. 4.

13) HOME l. c. p. 112. — Act. med. Berolin. dec. II.
 Vol. X. p. 28. — HORST in HUFELAND's *Journal*.
 17. B. 18 St. S. 69.

14) LEDELIUS Eph. N. C. dec. II. an. 3. obs. 97. — HIL-
 DANUS observ. chirurg. No. 56. — WILLAN l. c.
 p. 175.

lucem editae ¹⁵⁾, nec senibus ¹⁶⁾ hominibusque constitutionis validae parceret. Nullo anni tempore morbilli limitantur ¹⁷⁾ ac interdum is, qui sub una epidemia morbo resistit, altera adventante succumbit ¹⁸⁾, paucissimi enim immunitate a morbillis gaudent.

C. excitantes.

2. Causa morbillos excitans *contagium* est, a varioloso, cum quo in Europa innotuit ac saepe societatem init, vel cui aut antecedit, aut succedit, plane diversum, caussae tussis ferinae ¹⁹⁾, nequaquam vero illi scrophularum ²⁰⁾, quodammodo simile, re ipsa vero omnino sui generis, ac membranae mucosae vias respirationis ambienti, inprimis

15) GIRTANNER *Abh. üb. d. Kinderkränkh.* S. 232. — saepeque ipse vidi.

16) MÜLLER *Eph. N. G. Cent. 5. 6. Obs. 13.* — HEIM feminam septuaginta sex annorum cum morbillis vidit (*HUFELAND's Journal* 1812. 3. Heft. März).

17) Doctissime id FRIESE apud WILLAN demonstravit l. c. p. 172.

18) Sic junior Marchio B. Ticini vere 1790 a morbillis affectus est, et frater natu major, cum aegroto commercium alens, liber mansit, donec eundem morbum mense Augusti ejusdem anni Viennae susceperet.

19) POHL de morbillorum cum tussi ferina similitudine. Vide: *Neueste Samml. auserles. Abhandl. f. Wundärzte.*

48 St. S. 282. — CACCIALUPI Prolusio de tussi ferina et morbillis. Ticini 1792.

20) *Pyretologia.* p. 165. edit. Ticinensis.

mis infensum. Contagium hoc sat fugax ²¹⁾, contagii scarlatinae instar et facilius ²²⁾, interdum solummodo inter nonnullos civium ordines ²³⁾, spargitur, et imprimis inter adultos saepe aliarum nozarum, praecipue aestuationis corporis ²⁴⁾, intensione mentis ²⁵⁾ adjumento, indiget. Stadium latentis contagii morbillorum arte insertorum, sex esse solet dierum ²⁶⁾, illud spontaneorum ad diem decimum sextum protrahi potest ²⁷⁾.

3. Morbillos pro specifica ac exanthemate stipata affectione catarrhali, a bronchitide graviore in casu non aliena, habemus. C. proxima.

§. LVII.

D i a g n o s i s.

1. Symptomata, quae hic speciatim ad trutinam vocare juvabit, sunt: *animi irritabilitas, affectio catarrhalis, febris et eruptio cutanea.* Sympt. illustratio.

2. *Ani-*

21) Teste ROSENSTEIN filum contagio morbilloso imbutum citius natura sua contagiosa privatur, quam quod viru varioloso impraegnatum fuerat (l. c. p. 30).

22) Morbilli rarius quam scarlatina sporadici sunt.

23) Hyeme a. 1811—1812 morbilli Vilnae solummodo inter Judaeos obveniebant.

24) Saepius morbillos post choreas observavimus.

25) WILLAN l. c. p. 163.

26) HOME l. c. S. 102.

27) WILLAN l. c. p. 162.

Frank Prax. I. 2.

Q

Animi ir-
tabilitas.

2. *Animi inconsueta irritabilitas*, adventum quidem februm in genere comitans ²⁸⁾, nullibi tamen adeo constans et evidens est, ac in morbillis. Aegri inprimis morosi et iracundi fieri solent, ac a minimo animi motu faciem nunc rubore suffusam, nunc pallescentem exhibent.

Affectio catarrhalis.

3. *Affectio catarrhalis* ocyus serius morbillos constanter comitatur, quare sic dictos *morbillos sine catarrho* ²⁹⁾, pro spuriis jam declaratis ³⁰⁾, ad *rubeolam* remittimus. *Tussis* morbillosa, gravissimo casu excepto, id peculiare habet, quod per paroxysmos advenit ac plerumque circa septimum diem remittit. Quo fortior ea est, eo minus lacrymantur oculi, ac eo rarior observatur *sternutatio*. Hanc solum *post eruptionem* in conspectum venisse cum aliis ³¹⁾, observavimus. *Vomitum* ³²⁾

et

28) P. I. Vol. I. §. XVIII. 2.

29) WILLAN l. c. p. 177.

30) FORDYCE in fragmentis med. p. 63. — VOGEL l. c. §. 58. — METZGER *medizinische Schriften*. 2. B. S. 167.

31) HEBERDEN. J. P. FRANK.

32) *Vomitum* solummodo ad quartum morbi diem obvenire SYDENHAM docuit (Sect. I. cap. 5), at eum per omnia morbillorum stadia perseverasse vidi (Acta mea clinica Vol. III. p. 15). Idem testantur RANOE (l. c. p. 209), TISSOT (*Avis au peuple* §. 222) et J. P. FRANK (l. c. p. 237). In epidemia a SCHLIERBACHIO descripta vomitus a doloribus lancinantibus dorsi et artuum

prae-

et *diarrhoea* ³³⁾, quibus nonnullae morbillorum epidemiae stipantur, affectionem catarrhalem aliquando ad membranam pituitosam tubi intestinalis extendi, testantur. Idem *ischuria* ³⁴⁾ de membrana interna vesicae urinariae docere videtur. Memorabile tandem est connubium, nobis aliisque ³⁵⁾ visum, symptomatum catarrhalium cum iis genuinae *cynanches trachealis* *).

4. *Febris morbillosa* peculiarem proclivitatem Febris. ad *haemorrhagias*, imprimis ad epistaxin, inter quartum et sextum diem communem, exhibet **). Et menstruatio facile huic exanthemati supervenit.

Q 2

nit.

praecedebatur. Morbillos cum symptomatibus *cholerae* nuperrime in matrona Vilnensi vidi.

33) Nonnullae morbillorum epidemiae constanter *diarrhoeam* sociam habuerunt (*Journal de médecine* 1790. Avril. p. 25). Apud RIVERIUM (Cent. I. obs. 71.) et ETTMÜLLERUM (Doct. pract. Lib. I. c. 15. p. 372) vel alvi cruentae cum torminibus fit mentio.

34) RANOE l. c. p. 209.

35) HEIM l. c. p. 90. — J. P. FRANK, in epidemia morbillorum nunc (1814) Vindobonae regnante.

*) Morbilli aestate a. 1814 Vilnae late grassantes pluries, praecipue sub invasionis stadio, genuinum *croup* mihi exhibebant. Hanc complicationem communem esse, fatetur egregius ALBERS *Salzb. med. chirurg. Zeitung* 1813. No. 27. p. 29.

**) Mirum est, morbillos Vilnae 1814 grassantes inter centenos quos curavi aegros nec unum vel epistaxis, vel alterius haemorrhagiae exhibuisse exemplum.

nit. *Pulsus* non raro aliquantulum irregularis. Sub febris exacerbatione potius *somnolentia* quam delirium, aliquando incongruae medelae effectus, animadvertitur. Magnos *sudores* ³⁶⁾, nisi declinante morbo, non conspeximus. Nec specificum transpirationis odorem, de quo HOME ³⁷⁾ et HEIM ³⁸⁾ loquuntur, percepimus. Urina saepissime turbida, albescens. Nonnunquam *ptyalismus* observatur ³⁹⁾.

Eruptio
cutanea.

5. Morbillos citius in hominibus cute delicata instructis erumpere WILLAN existimat ⁴⁰⁾. Quo tempore exanthema jam evidenter ad genas, mentum et latera colli efflorescere incipit, atque interdum palatum, uvulam, tonsillas et linguam detinet ⁴¹⁾, adhuc pauca et sparsa illius stigmata in reliquis corporis partibus obvenire solent. Maxima morbillorum pars in facie et in dorso occurrit; rarissime tamen vultus ita tumet, ut palpebrae inde claudantur ⁴²⁾. Par-

tes

36) MACBRIDE l. c. p. 377.

37) L. c. odorem illi variolarum similem esse contendit.

38) L. c. odorem illi plumarum anserinarum recentium comparat.

39) RANOE l. c. p. 203.

40) L. c. p. 161.

41) LIEUTAUD l. c. p. 604.

42) MACBRIDE. HEBERDEN. Vidi hoc symptoma semel in morbillis nuperrime Vilnae regnantibus, ac facies adeo

tes transpirationi praecipue subditae, e. c. regio pudendorum, popliteae etc. pauciores morbillos exhibent. Exanthema ab initio punctum rubrum circulare, saepissime noduli instar prominens ⁴³⁾, tactui obvium ⁴⁴⁾, coloris obscurioris refert. Ex plurimis tandem punctis *maculae* semilunares, confluentes, inter quas cutis, nunc normalis, nunc punctis solitariis obsessa, cernitur. Violentia febris, aetas admodum tenera, aut provecta, consuetudine exanthematis formae obstat, ac saepe *papulas* ad genas dorsumque manuum, et *vesiculas* miliares ad nucham, pectus et brachia excitant. De *febre* quoque *morbillosa sine morbillis*, a nobis quidem nunquam visa et facile catarrho epidemico cum morbillis simul grassante adscribenda, at possibili, ac, uti in scarlatina docuimus ⁴⁵⁾, determinanda, HAEN ⁴⁶⁾, S. VOGEL ⁴⁷⁾ aliique testantur.

adeo tumebat, ut morbus primo intuitu pro erysipelate faciei haberi potuisset.

43) WEDEKIND hos nodulos, pro glandulis, ex quibus pili cutanei scaturiunt, habet. (RÖSCHLAUB's *Magazin zur Vervollkommenung der Heilkunde*. 4. B. 28 St. S. 233).

44) Morbillorum sub cute latentium exemplum in *Journal de medecine* habetur (l. c.), ac plurima similia nuper Vilnae observavi.

45) Cap. praeced. §. LI. 4.

46) Rat. medendi continuatio. Vol. III. p. 355.

47) L. c. p. 191.

tantur. Morbilli, praesertim in climatibus calidis, interdum adspectum violaceum sive nigrum induunt. In genere, sexto morbi die, quo in facie jam pallescere incipiunt, maxime in reliquo corpore florescere solent. Die nono solum stigmata perpassi, exanthematis relinquuntur, quae decimo, undecimo, plerumque desquamatione furfuracea ⁴⁸⁾, aliquando cum pruritu ⁴⁹⁾, relictisque maculis sublividis, madefacta cute magis conspicuis, evanescent.

Facilis
confusio.

6. Morbilli confundi possunt: cum febre catarrahali, cum peticulis, cum miliaribus rubris, cum urticaria papulosa, cum scarlatina, cum rubeola, cum variolis, cum varicella et cum strophulo.

Distinctio
a febre catarrhali.

7. Regnantibus morbillis, in juvenibus hunc morbum necdum perpassis, quaevis febris catarrhalis, imprimis vero ea, quae symptomatibus coeryzae stipatur, ad quartum morbi diem usque, dubium latentis exanthematis morbilloso, protracta observatione tantummodo diluendum, prae se fert. Idem aliquando de *cynanche tracheali* valet ⁵⁰⁾.

8. Una

⁴⁸⁾ Saepius morbillos sine omni desquamatione evanuisse vidi. Sic quoque acciderat in morbillis a. 1674. a SYDENHAMO descriptis, sicque LUDWIG (l. c. §. 174), RANOE (l. c. p. 208) et SELLE (l. c. p. 165).

⁴⁹⁾ Enormem pruritum ad genitalia puellulae LENTINI descripsit (Memorabilia p. 32).

⁵⁰⁾ Ad pusionem unius anni nuper vocatus ac cuncta si-

gua

3. Una tantum *peticularum* species, in febris Distinctio
 bus gastricis potissime obveniens ⁵⁰⁾, utpote colo-^{a peticulis.}
 re purpureo instructa ac super epidermidem ele-
 vata, pro *morbillis* haberi posset et vice versa.

Peticulae purpureae.

- a. Plerumque sympto-
mata gastrica socia ha-
bent.
- b. Rarissime faciem oc-
cupant.
- c. Vix unquam in macu-
las conflunt.
- d. Tempore indetermi-
nato efflorescunt et fu-
gaces sunt.
- e. Desquamatione vix
unquam terminantur.

Morbilli.

- a. Symptomatibus catar-
rhalibus insigniun-
tur.
- b. Primum et maxime
ad faciem comparent.
- c. Maculas exhibent.
- d. Regulariter effloresce-
re solent.
- e. Saepe desquamatio
observatur.

9. Miliaria rubra.

- a. Sudor inter praecipua
symptomata prodroma
pertinet.
- b. Nulla determinata
morbi die efflorescunt.

Morbilli.

Distinctio
a miliaribus rubris.

- a. Sudor nequaquam in-
ter symptomata pro-
droma numeratur.
- b. Efflorescentia quarto
die contingit.

c. Raris-

gna *croup* inveniens de latentibus simul morbillis du-
bium alui, quod quarto morbi die per exanthematis
apparitionem confirmatum fuit.

c. Rarissime ad faciem
conspiciuntur.

d. *Papulae* magnitudi-
nem lentis excedunt.

c. Evidentissime ad fa-
ciem cernuntur.

d. *Puncta*, sive *maculas*
exhibent.

Distinctio 10. *Urticaria papulosa*.

ab urtica-

ria papulo-
sa. a. Eruptio sub magno

pruritu contingit.

b. Eruptio primo, se-
cundo, raro tertio die
apparet.

c. *Maculae* sat latae, ple-
rumque ad circumfe-
rentiam elevatae, acin-
medio depressae sunt.

d. *Exanthema* volubile
est.

e. A frigore ut plurimum
evidentior.

Morbilli.

a. Eruptio sine pruritu
locum habet.

b. Eruptio plerumque
quarto solum die ani-
madvertitur.

c. *Puncta* prominentia,
aut *maculas* ex iis com-
positas offerunt.

d. *Exanthema* sat con-
stans.

e. Sub frigore facile eva-
nescit.

Distinctio
a scarlati-
na.

11. *Morbillos* et *scarlatinam* unum eundem-
que morbum constituere, MORTONUS edixerat⁵¹⁾ ac
scarlatinam sub nomine *morbilorum* VIOLANTE
descripsit⁵²⁾. Econtra horum *exanthematum* dia-
gnosin exactissime WILLAN⁵³⁾ et KREYSSIG⁵⁴⁾ sta-
biliverunt.

Scar-

51) De morbillis et febre scarlatina. Cap. 4 et 5.

52) De morbillis §. 14—16.

53) L. c. p. 198.

54) L. c. S. 33—46.

Scarlatina.

- a. Tussis sub stadio invasionis, si adsit, brevis et sicca est.
- b. Oculi etiamsi rubri et lacrymis interdum innatantes, lucem tamen ferunt ac nunquam lacrymantur.
- c. Eruptio secundo die contingit.
- d. Exanthema, praeter puncta, maculas exhibet, primum figurae rotundae, dein ita confluentes, ut universam cutim obducant.
- e. Nisi *miliaris* sit, si ve *pustulosa*, cutis plana est.
- f. Laete rubet.
- g. Delirium frequens.
- h. Desquamatio evidentissima.

Morbilli.

- a. Tussis sub stadio invasionis per paroxysmos redit, diuturna cum sputis crudis.
- b. Lucis intolerantia et lacrymatio fere constans est.
- c. Eruptio quarto die fit.
- d. Exanthema puncta circularia refert, solitaria, vel congregata, maculas semilunares gignentia, cum cute intermedia normali.
- e. Fere semper super cutim prominent.
- f. Coloris fructus rubidaei cernuntur.
- g. Delirium rarum.
- h. Desquamatio furfuracea minoris momenti.

Indoles va-
ria.

12. Qualiscunque sit indoles morbillorum, plerumque *quid inflammatorii* exhibent. Haec observatio relate ad *morbillos gastricos*, FRID. HOFFMANNUM ⁵⁵⁾ et BURSERIUM ⁵⁶⁾ minime latuit. Et morbilli typhodes, exceptis nonnullis rarissimis epidemiis, de quibus potissime H. XHAM ⁵⁷⁾, WATSON, KLAIBER, RAU, RAHN ⁵⁸⁾ aliique ⁵⁹⁾ legendi sunt, ab initio morbi inflammatoria instruntur complicatione ⁶⁰⁾ aut eam sub curriculo aegritudinis induunt ⁶¹⁾.

§. LVIII.

Prognosis.

Periculum.

1. Morbilli, exceptis typhodibus, dummodo ad convalescentiae terminum rite curentur, hand multo *periculo* stipantur ⁶²⁾. Gravius affligi solent

55) Op. c. T. IV. p. 189.

56) Op. c. §. 127.

57) Op. T. I. p. 216. 277. 319.

58) Adversaria medico-practica. Vol. I. p. 389.

59) Notitia epidemiae morbillorum Taurini a. 1789 regnantis habetur in *Giornale scientifico letterario e delle arti*. T. 3. P. 3. p. 274.

60) Memorabilem hujus complicationis casum J. P. FRANK retulit (l. c. p. 245).

61) MONRO Op. tract. de febr. inflam. universalibus: Cap. 4. p. 22.

62) Ex 3807 mortuis, spatio sex annorum, 91 a morbillis trucidatos esse, PERCIVAL refert (*Philosophical, medi-*

lent infantes tertium annum necdum attingentes, praecipue sub dentitionis opere, adulti liquoribus fermentatis dediti, gravidae ⁶³⁾, et puerperae. Mares prae puellis a morbillis cruciari ⁶⁴⁾, non confirmatur ⁶⁵⁾. Morbilli aestivi mitiores hyemalibus esse solent. In morbo maligno nulla quidem dies secura, sed *nona* praecipue infensa observatur ⁶⁶⁾. Morbilloꝝ per introductionem *vaccinae* gravius saevire *); falsum est **).

2. Symptomata morbillorum prodroma, quo Semiotica. diutius perseverant et quo vehementius urgent, eo

medical and experimental essays. p. 100. Fatente WATSON, uno anno, unus inter decem, altero, unus inter tres mortuus est (l. c. p. 132). W. BLACK morbillorum mortalitatem ad illam variolarum uti r. ad 10. — vel 12. se habere contendit (*An arithmetical and medical analysis of the diseases and mortality of the human species. p. 64*). In orphanotrophio Londinensi a. 1794. ex viginti octo aegris morbillis laborantibus nullus obiit; a. 1798 ex sexaginta novem sex, et a. 1800, ex sexaginta sex quatuor perierunt (WILLAN l. c. p. 186).

63) Aliter docet WILLAN l. c. p. 175.

64) PERCIVAL l. c.

65) WILLAN l. c. p. 186.

66) FR. HOFFMANN op. c. T. I. p. 188.

*) ROBERT WATT's *history, nature and treatment of chincough. Glasgow. 1813.*

**) *The London medical, surgical and pharmaceutical Repository. 1814. April.*

eo gravior expectandus est morbus ⁶⁷⁾. Verum et praeceps exanthematis eruptio mali omnis est. Spasmi sive convulsiones, eruptionem praecedentes, imprimis sub dentitione, magnum periculum portant ⁶⁸⁾. Idem valet de morbillorum colore violaceo sive nigro ⁶⁹⁾, de praesentia peticularum et ecchymomatum, imprimis vero de *retrocesso* exanthematis paullo post non redeuntis; alias enim animi deliquia, deliria, viscerum inflammationes, praecipue *brouchitis*, hinc inde vel sine retrocessu fatalis, interitum minantur. Modica diarrhoea eruptioni non obstat ⁷⁰⁾, ac inter nonum et decimum diem salutaris observatur. Sic et epistaxis sive menstrua, juxta limites haud excedentia. Satius est, si exanthema septimo morbi die evanescere incipiat, quam si tunc laete adhuc floreat ⁷¹⁾. Desquamatio ad felicem rerum exitum haud absolute requiritur. Respiratio crebra et anhelosa, sine aliis laesi pulmonis indiciis, nequaquam timenda. Optima signa sunt, somnus diu protractus, sudor universalis, tussis cum spu-

67) HEBERDEN. WILLAN l. c. p. 168.

68) WILLAN l. c. p. 164. — SCHLIERBACH l. c.

69) FR. HOFFMANN op. T. II. p. 67. — AVICENNA T. II. p. 74. — RHazes l. c. p. 14.

70) *Journal de médecine*. T. 5. p. 74. In matrona, de qua supra sermo fuit, ipsa cholera eruptioni copiosissimae non obstitit.

71) HEBERDEN l. c.

tis coctis, et urina sedimento puriformi instructa;

3. Absoluto morbillorum curriculo, praecipue Mala residua.
a suscepto refrigerio, et ab usu rerum calefacientium, haud raro *nova febris* cum lateris dolore punctorio, respiratione difficili, pulsu duro, genarumque rubore sive livore, ingruit, aegrum, quo tenerior est aetas, facile paucorum dierum spatio jugulatura. Alias eadem symptomata lente et interdum *periodice*, instar febris intermittentis et cum eodem fere periculo ac subintrante *hydrothorace* decurrunt. *Phthisis pulmonalis* in iis praesertim, qui jam ante morbillorum adventum tuberculis pulmonis laborarunt, occurrit. Saepe diarrhoea, raro salutaris et comparentibus *aphthis*, vix non semper lethalis, morbis pectoris hucusque recensitis conjungitur. Singula haec mala haud raro *crisin* in variis eruptionibus cutaneis agnoscunt. Hujusmodi sunt: 1. *furunculi*, ab initio parum inflammati, lividi, dein ichorem fundentes, difficulter sanabiles et potissimum ad dorsum, regionem umbilicalem, extremitatesque inferiores conspicui; — 2. *pustulae inflammatae* aut *vesiculae aquae*, basi rubrae insidentes, dolore pungente et calore stipatae, imprimis extremitates inferiores et scrotum occupantes; — 3. *bul-lae* sero flaviusculo repletae, ad faciem, pectus et crura obviae; — et 4. *psydracia*, instar psorae, universam corporis superficiem obtegens. Ad
com-

communes porro morbillorum reliquias pertinent:

1. *ophthalmiae* in suppurationem tarsorum maculasque corneae desinentes; 2. *amaurosis*; 3. *fluxus saniei ex auribus* *); 4. *tumores glandularum*; 5. *ulcera* ad oris angulum cum labii superioris tumore, vel ad digitos tum manuum tum pedum, pluries cum carie ossium subjacentium; 6. *spasmi*; 7. *paresis*, praecipue artuum, non sine peculiari partium tensione, 8. *scorbutus* ⁷²⁾ et *vitia cordis* **). Hydropem anasarca nunquam post morbillos conspeximus, ac idem fatetur HEIM ⁷³⁾.

Secunda
infectio,

4. Etiamsi exempla *morbillarum reditus* in eodem subjecto ⁷⁴⁾, et quidem in eadem epidemia

*) Vigente hoc fluxu, ac praesente simul parotide, *auris externae gangraenam*, faciei letali cum eventu communicatam, nuperrime in infante, morbillos parum antea perpresso, observavi.

**) TESTA über die Krankheiten des Herzens. Uebersetzt mit Anmerk. von KURT SPRENGEL. Hal. 1813.

72) JOERDENS (Act. Nat. Curios. Vol. VII. obs. 10). In orphanotrophio mediolanensi, quamvis scorbuto non favente, plurimi, qui hyeme a. 1789—1790 morbillos perpressi erant, vere sequente in scorbutum inciderunt. Idem Vilnae post morbillos hyemis 1811—1812, imprimis inter Judaeos, conspexi.

73) L. c. p. 90.

74) DE LA ROBERDIERE (*Journal de médecine* T. 48. p. 253), HAEN (*Rat. medendi*. Vol. III. p. 352). WENDT (l. c. S. 22).

mia ⁷⁵⁾, absolute rejicere haud audeamus, attamen ea potissimum confusio*n*i *rubeolae* cum morbillis, vel cum *eruptionibus secundariis* adscribenda esse opinamur. Homines, cum aegris a morbillis de*te*ntis arctum commercium habentes, quamvis jam antea eundem morbum p*er*passi essent, ab affectione catarrhali tamen affectos fuisse, WIL-
LAN contendit.

§. LIX.

C u r a.

1. *Institutio morbillorum* primum a HOME a. Prophylactica.
1758 sanguinis sive lacrymarum ope tentata ⁷⁶⁾,
ab ALEX. MONRO ⁷⁷⁾, BURSERIO ⁷⁸⁾ et R. A. VOGELIO ⁷⁹⁾ accuratius descripta, et nuperrime a LOCATELLI sine magno tamen successu adhibita ⁸⁰⁾, sicuti adversus benignos morbillos inutilis, ita vigente ejusdem exanthematis epidemia maligna, in primis si praecepta generalia febribus contagiosis
occur-

75) TOZZETTI *Journal de médecine*. T. 5.

76) Principia medicinae Lib. II. Sect. 8. — *Medical facts and experiments*. p. 258.

77) De venis lymphaticis. p. 58. — *Neues Bremisches Magazin* 2. B. 28. St.

78) Op. c. Vol. III, cap. 8. §. 157.

79) De cognoscendis et curandis c. h. affect. §. 135.

80) LODER's *Bemerkungen über ärztliche Verfassung und Unterricht in Italien während 1811*. Leipz. 1812. S. 36.

occurrendi locum invenire haud possent, nequam negligenda videtur.

C. morbillorum simplicium.

2. *Morbilli simplices* secundum regulas generales curantur ⁸¹⁾. Tuendus praeterea aeger a nimia luce. Ut tussi occurratur, succi vegetabiles subacidi evitari et *res mucilaginosae* ⁸²⁾ tum pro potu, tum pro linctu, tum pro medicamento exhibendae. *Nitras potassae*, a FR. HOFFMANNO, ob id quod eruptionem exanthematis retardare ac pectoris incommoda augere dicat, proscripta ⁸³⁾, nobis sub majori febris impetu semper profuit. SYDENHAMUM regimen calidum commendasse, rite demonstrante DICKSON ⁸⁴⁾, falsum. Certe neque calor nimius neque frigus, a BRUNONE hypothesis et analogiae morbillorum cum catarrho gratia commendatum ⁸⁵⁾, recte animadvertente CULLEN ⁸⁶⁾, morbillis quadrat.

C. morbillorum inflammatoriorum.

3. In nullo exanthemate *venae sectio* tam secure sub quovis morbi stadio, eo invasionis non excepto ⁸⁷⁾ nec contradicentibus epistaxi, menstrua-

81) Cap. I. §. VI.

82) Emulsio Arabica. Decoctum salep, althaeae, seminum lini, mixtura oleoso-gummosa.

83) Opp. T. II.

84) *Bemerkungen der Londoner Aerzte*. 4. B. S. 209. 215.

85) *Element. medicinae*.

86) Op. c. §. 247.

87) Venae sectionem morbillorum eruptionem promovere docuerunt FR. HOFFMANN (l. c. T. IV. p. 189.), RIZZ

(Abh.

struatione, diarrhoea ⁸⁸⁾ institui potest, quam in *morbillis inflammatoriis*. Indicatur potissimum a decubitu impedito, a dolore lateris et a tussi saeva. Infantibus, infra tertium annum constitutis, venae sectionis loco, *hirudines* ad latera thoracis apponimus. Haemorrhagiis non immodicis liberum concedimus decursum. Si virium jactura usum venae sectionis impediat, *folia digitalis purpureae*, ut experti sumus, egregium sistunt remedium. Nisi realis complicatio gastrica praesto sit, *remedia alvum evacuantia* raro ante nonum morbi diem indicantur. Si multa pituita, praesertim in infantibus, fauces et pectus obruat, *vomitibus*, deleta jam inflammatorio impetu, sat tuto moveatur. Versus finem perducto morbo, liberam praeprimis transpirationem postulante ⁸⁹⁾, *lenia diaphoretica* praescribenda. Nisi haec sufficiant, ac si tussis effrena et continua inquietudo somnum impediatur, ad *narcotica*, inprimis ad *hyoscyamum* ⁹⁰⁾, utpote salutarem diarrhoeam non cohibentem, deveniendum. Optime horum remedium usum BURSERIUS, observationes SYDENHAMI,

MOR-

(*Abhandl. der Schwed. Acad. der Wissenschaften*. 2. B. S. 144).

88) Diarrhoeam nimiam sub morbillorum curriculo sponte imminui, jure fatetur SYDENHAM ac confirmat SELLE (l. c. p. 115).

89) J. P. FRANK l. c.

90) Pro infante quatuor annorum granum unum in emulsione ad uncias sex,

MORTONI, LIEUTAUDII et TISSOTI ad trutinam vocando, statuit⁹¹⁾, demonstravitque narcotica, potissimum in tenera aetate ac sub primis morbi stadiis, excepto forte eo invasionis apud hystericas⁹²⁾, periculosa esse.

C. m. gastricorum.

4. Praeceptis universalibus⁹³⁾ etiam *morbillis gastricis* adaptandis, testimonia FR. HOFFMANNI, ROSENSTEINII, STOLLII et TISSOTI addimus, quorum primus, morbum difficulter superari, nisi leni *emetico* evacuentur sordes, asserit, reliqui vero, emetica et purgantia, ab initio adhibita, nimio alvi profluvio in sequentibus stadiis occurrere ac eruptionem exanthematis promovere, jure contendunt.

C. m. typhodum.

5. Curam *morbillorum typhodum* secundum praecepta generalia absolvendo, praecipue latentis *complicationis inflammatoriae* ratio haberi debet. Ea absente, nisi summa respirandi difficultas et pectoris oppressio obstant, MORTONI, WATSONI et praecipue KLAIBERI consilio, ad *decoctum corticis cinchonae*, alias ad *infusum radicis aristolochiae serpentariae* confugiendum est. Aurea verba de *cura transitus morbillorum typhodum in inflammatorios* protulit MORTON. *Haemorrhagiae vitae periculum minitantes*, praeter remedia

91) Op. c. Vol. II. §. 180—183.

92) FR. HOFFMANN l. c.

93) Cap. I. §. VI. 10.

6. Symptomata *peripneumoniae* in convales-^{C. malorum}
centiam incidentia, vel retrocessus effectus, *venae,*^{residuorum}
sectionem, hirudines, cucurbitulas cruentas, et si
vires admodum deficient, *digitalem purpuream,*
sinapismos, vesicatoria, pediluvia, frictiones
cutis exigunt. *Suffocationi* imminenti muria-
tem hydrargyri, remedium et caeteris morbillo-
rum reliquiis adversum, nunquam conduxisse vi-
dimus. Praesentibus signis *phthiseos pulmonalis*
cum febricula quasi intermittente, ne praeposte-
re ad corticem confugiamus, cavendum est. Le-
vamen tunc potius a *remediis mucilaginosiis,* a *di-*
gitali, et a *lacte* obtinetur, quod ultimum, au-
ctore LASSONIO ⁹⁵⁾ princeps *diarrhoeae morbillosae*
sistere solet remedium, cui tamen in nonnullis
epidemiis *pulverem ipecacuanhae cum opio* ⁹⁶⁾ et
clysteres ex oleo cum infuso chamomillae antepo-
nere

96) Pro infante quatuor annorum grana duo-quatuor in
vehiculo mucilaginoso sex unciarum.

nere debuimus. Quo pacto *hydrothoraci*, *ophthalmiis* aliisque morbillorum residuis occurrendum sit, alibi docebimus. *Convalescentia* uti post scarlatinam curatur.

CAP. XIII.

De Rubeola.

§. LX.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. **E**xanthema primum, adpectu morbillis sat simile, at, vel sine prodromis, vel praevia febre cum symptomatibus rheumaticis fauciumque saepe dolore invadens, jam primo morbi nychthemero erumpens, ac spatio paucorum dierum, plerumque sine desquamatione aut aliis reliquiis evanescens, nobis *Rubeola* ⁹⁷⁾ dicitur.

Historia. 2. Rubeolam jure a morbillis distinxerunt et pro morbo sui generis sub nomine nunc *rubeolae*, nunc *rossaliae*, nunc, uti videtur, *purpurae* descripserunt *medici VRATISLAVIENSES* ⁹⁸⁾, ORLO-

VIVS

⁹⁷⁾ GERMAN. *Die Röthlen, die Wiebelsucht, die Wieblen.*
ROSS. Крпцыха. POLON. Kur.

⁹⁸⁾ *Historia morborum Vratislaviensium a. 1700.*
p. 185.

VIVUS ⁹⁹⁾, SELLIVS ¹⁰⁰⁾, ZIEGLERVS ¹⁾, S. VÖGE-
LIUS ²⁾, HEIMIVS ³⁾ aliiqve.

§. LXI.

Symptomata. Causae.

1. Morbus perstante ciborum desiderio, cum lassitudine, doloribus artuum, lumborum et faucium, caloribus fugacibus et febre, aliquando, ut vidimus, non sine anxietate et surarum crampo, absentibus praeter oculorum ruborem et symptomatibus catarrhalibus ⁴⁾, alias cum ipsa eruptione incipit. In genere tamen eruptio solum versus finem primi nychthemeri apparet, et ita quidem, ut exanthema, coloris fructus rubri idaei, uno fere temporis puncto per universum corpus, maxime ad faciem, ad brachia manuumque dorsum quae

99) Programma de rubeolarum et morbillorum discrimine.

100) Medicina clinica. p. 115. — Rudimenta pyretologiae methodicae. edit. Ticinensis. p. 165. — *Neue Beyträge zur Natur- und Arzneywissenschaft. 1. Thl. S. 117.*

1) *Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft und Chirurg. p. 81.*

2) Op. c. 3. Vol. p. 219.

3) HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde* 1812. 3^a Heft.

4) Semel tantum sternutationem, in femina illi a prima infantia, minima porrecta causa, subdita, observavi.

(quae loca aliquando unice ab eo occupantur) cum pruritu saepe nullo, interdum sive modico, sive magno, sub *triplici forma* in conspectum veniat. Prima forma, quam *rubeolam discretam* vocamus, puncta segregata, arcte circumscripta, morbillis sparsis similia, plerumque vero minus prominentia exhibet; — secunda, *rubeola confluens*, punctis rubris, fere planis, ita confluentibus ut cutis intermedia rubeat, notatur; — et tertia, *rubeola miliaris*, ex papulis magnitudinis seminum sinapis nigrae, hinc inde albicantibus, nonnullis in locis rubeolae confluenti intermixtis, constat. Exanthema cum febre, spatio trium, quatuor, septem ⁵⁾ dierum, plerumque sine ulla crisi, interdum sub sudore et urina puriformi, evanescit. Desquamatio rarissime et tunc solum, dum exanthema sub forma miliari effloruerat, patefit. Convalescentia et morbi reliquiae vix animadvertuntur.

Causae. 2. Aetas infantilis et sexus femineus praecipue ad rubeolam, aliquando epidemice, non sine contagii *suspensione*, *regnantem* ⁶⁾, praedisponunt.

5) HEIM l. c.

6) Vidi rubeolam *epidemicam Ticini* a. 1793, mense Junii, — *Mediolani* mense Julii ejusdem anni et *Vilnae* 1812, mense Martii.

§. LXII.

D i a g n o s i s.

1. *Rubeola cum miliaribus rubris*, cum ur- ^{Facilis}
ticaria papulosa, cum *exanthemate mercuriali*, ^{confusio.}
 cum *scarlatina*, cum *morbillis* et cum *strophulo*
 confundi potest.

2. *Rubeola miliaris*, ob crampum surarum, ^{Distinctio}
 quo interdum stipatur, et ob adspectum, facile ^{a miliaribus rubris.}
 pro *miliaribus rubris*, accipi potest, nisi ad se-
 quentia respiciatur.

Miliaria rubra.

- a. Rarissime faciem oc-
cupant.
- b. Sudores specifici e-
ruptionem praece-
dunt.
- c. Plerumque per *repeti-
ta conamina* erum-
punt.
- d. Aliis morbis superve-
niunt.

Rubeolae miliares.

- a. Maxime faciem deti-
nent.
- b. Nullus ab initio mor-
bi observatur sudor.
- c. *Uno impetu* prorumpunt.
- d. Morbum *primarium*
constituunt.

3. *Urticaria papulosa* in febre rheumatica ^{Distinctio}
 erumpens, cum *rubeola confluyente* confundi <sup>ab urtica-
ria papu-
losa.</sup>
 posset.

Urti-

Urticaria papulosa.

- a. Pruritus saepe in tolerabilis percipitur.
- b. Eruptio ut plurimum secunda, tertia die contingit.
- c. *Maculae*, saltem ad circumferentiam, prominentes sunt.
- d. Efflorescentia inconstans est.

Rubeola confluent.

- a. Raro pruritus magnus occurrit.
- b. Eruptio vel cum morbi ingressu vel primo illius nychthemero comparet.
- c. *Maculae planae* cernuntur.
- d. Efflorescentia constans.

Distinctio
ab exanthema-
mate mer-
curiali.

4. *Exanthema mercuriale*, sub forma papularum laete aut profunde rubrarum prorumpens, non nisi sequentibus characteribus a *rubeola* distinguere licet.

Exanthema mercuriale.

- a. Nullam contagii suspicionem habet.
- b. Orditur cum symptomatibus catarrhalibus.
- c. Pruritus summus.
- d. Ad hebdomadam et ultra protrahitur.
- e. Evidens est desquamatio.

Rubeola.

- a. Contagii suspicionem movet.
- b. Incipit cum symptomatibus rheumaticis.
- c. Pruritus plerumque modicus.
- d. Spatio paucorum dierum terminatur.
- e. Desquamatio vix occurrit.

5. Si-

5. Similitudo rubeolae tum *confluentis* tum *Distinctio miliaris* cum *scarlatina* sive *levigata* sive *miliiformi* ^{a scarlatina.} per se patet: en differentiae.

Scarlatina.

- a. Versus *finem* primi vel ab initio *secundi* nychthemeri prorumpit.
- b. Rubor cutis *laetus*.
- c. Rubor cutis ob compressionem digiti evanescens, hac cessante, solum a peripheria ad centrum redit.
- d. Desquamatio evidens.

Rubeola.

- a. Morbi *initium* comitatur, aut intra *primum* nychthemeron efflorescit.
- b. Rubor cutis *obscurus*.
- c. Rubor cutis ablata digiti compressione non solum a peripheria redit, sed ex punctis exanthema constitutibus undique manat.
- d. Desquamatio vix perceptibilis.

6. *Morbilli* potissimum cum *rubeolis discretis* ^{Distinctio a morbillis.} similitudinem exhibent.

Morbilli.

- a. Stadium invasionis symptomata *catarrhalia* portendit.
- b. Eruptio *quarto* morbi die contingit.

Rubeola.

- a. Stadium invasionis symptomatibus *rheumaticis* insignitur.
- b. Eruptio curriculo *primi* nychthemeri locum habet.

c. Efflo-

- | | |
|---|---|
| <p>c. Efflorescentia fere ad
<i>diem decimum</i> morbi
protrahitur.</p> <p>d. Convalescentiam pro-
priis periculis stipa-
tam habent.</p> | <p>c. Efflorescentia rarissi-
me <i>septimum diem</i> at-
tingit.</p> <p>d. Nulla fere observatur
convalescentia nullae-
que obveniunt reli-
quiae.</p> |
|---|---|

§. LXIII.

Prognosis. Cura.

- Prognosis. 1. *Prognosis* ex ipsa rubeolae descriptione
eruitur.
- Cura. 2. Rubeola secundum regulas generales exan-
thematis primariis medendi curatur.

CAP. XIV.

De Variolis.

§. LXIV.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. *Variolae* 7) exanthema primarium et contagio-
sum sistunt, quod praeviis febre, nausea, vomitu,

7) GERM. *Die Pocken, die Blattern.* GALL. *La petite vérole.* ANGL. *Small-pox.* ITAL. *Il vajuolo.* ROSS. *Ocha.* POLON. *Ospa.*

tu, dolore epigastrii et lumborum, tertio quarto-
ve morbi die, ad faciem aliaque cutis loca, sub
forma macularum rubrarum in medio nodulo sub-
duro praeditarum, prorumpit, ac spatio octo die-
rum in pustulas, quae crustis deinde cooperiuntur,
abit, relictis pro tempore maculis, saepeque inde-
lebilibus foveis, ac non raro vitiis systematis
lymphatici, sensuum aliarumque partium.

2. Veterum Graecorum et Romanorum aevo *Historia.*
variolas non extitisse, post multas doctasque con-
troversias GRUNER demonstravit ⁸⁾. Verisimilli-
mum est, Arabas jam a. 572 post C. N. illarum
notitiam habuisse ⁹⁾; certum autem est, hunc
morbum ex Aegypto interioribusque Arabiae locis,
a Saracenis sub finem tantummodo saeculi undeci-
mi et sequentis initium in Hispanias perlatum
fuisse ¹⁰⁾. Nulla enim fides scriptoribus, qui vario-
las a. 570 Gallias devastasse narrant ¹¹⁾, tribui-
tur ¹²⁾. Ab Hispania variolae rapide in reliquas
Euro-

8) Morborum antiquitates. Vratislav. 1774. Cap. 1.

9) REISKIUS Diss. observ. miscell. med. ex Arabum mo-
numentis. Lugd. Batav. 1746. Obs. 1. p. 9. — SPRENGEL op. c. 2. Th. S. 286.

10) GRUNER Diss. variolarum antiquitates ab Arabibus
solis repetendae. Jen. 1773.

11) Historia Francorum scriptorum. T. II. PAULET
histoire de la petite vérole. Paris. 1768. p. 82.

12) WERLHOFF Disquisit. de variolis et anthracibus
Opp. med. p. 469.

Europae partes, nonnullis regionibus septentrionalibus diu exceptis ¹³⁾ mig arunt. America ante Europaeorum adventum a variolis immunis fuit. Primus ipsarum scriptor est RHAZES ¹⁴⁾. Innumera-
rabiles inde secuti sunt circa idem argumentum auctores ¹⁵⁾, quorum potiores MARCELLUS DONATUS ¹⁶⁾, BETERA ¹⁷⁾, BARTHOLINUS ¹⁸⁾, BELLINGER ¹⁹⁾, FISCHER ²⁰⁾, LOBB ²¹⁾, HELVETIUS ²²⁾,
Hr-

¹³⁾ GMELIN *Reise durch Siberien*. In Praefatione.

¹⁴⁾ De variolis et morbillis ex Arabico latine redditus, quem RICHARD MEAD recudi curavit. Op. med. Edit. Neapol.

¹⁵⁾ Litteratura ampla variolarum apud KRÜNITZ (*Verzeichniss der vornehmsten Schriften von den Kinderpocken*. Leipz. 1768.) et OLBERG (*Beitrag zur Litteratur der Blattern und deren Einimpfung*. Halle 1791).

¹⁶⁾ De variolis et morbillis. Mantua 1569. HALLER Biblioth. med. pr. II. p. 167.

¹⁷⁾ De malignis variolis et petechiis. Brix. 1589.

¹⁸⁾ De variolis hujus anni epidemicis. Hafn. 1656.

¹⁹⁾ *Treatise concerning the small-pox*. Lond. 1721.

²⁰⁾ Diss. Nosologia variolantium curatione, methodo medendi et observationibus singularibus illustrata. Erfurt. 1721.

²¹⁾ *A treatise on the small-pox*. Lond. 1731.

²²⁾ *Idée générale et observations sur la petite vérole*. Lyon 1727.

HILLARY ²³), OBERCAMP ²), MEAD ²⁵), LUD-
WIG ²⁶) OTTO ²⁷), PAULET ²⁸), STORCH ²⁹),
THOMPSON ³⁰), VIOLANTE ³¹), ELLER ³²), TRAL-
LES ³³), TISSOT ³⁴), FORDYCE ³⁵), SWIFTEN ³⁶),
SARGONE ³⁷), BLACK ³⁸), HILDEBRAND ³⁹), BUCH-
HOLZ

23) *Rational and mechanical essay on the small-pox.*
Lond. 1735.

24) *Variolarum praeprimis malignarum ratio et curatio.*
Wirceburg. 1746.

25) *De variolis et morbillis.* Lond. 1747.

26) *Adversaria I. P. 2. No. 2.*

27) *De sede variolarum non in sola cute.* Erlang. 1758.

28) *Op. c.*

29) *Abhandl. von den Blatterkrankheiten.* Eisenach.
1755.

30) *An enquiry into the origin, nature and cure of
small-pox.* London. 1752.

31) *De variolis et morbillis.* Dresd. 1750.

32) *De cognoscendis et curandis morbis.* Sect. 6.

33) *De methodo medendi variolis hactenus cognita, saepe
insufficiente, magno pro inoculatione argumento.*

34) *Epistol. ad HALLERUM de variolis etc.* Lausannae
1761.

35) *Op. c.*

36) *Comment.*

37) *Del contagio del vajuolo e della necessità di tentarne
l'estirpazione.* Nap. 1770.

38) *Observations medical and political on the small-pox.*
London 1781.

39) *Bemerkungen und Beobachtungen über die Pocken in
der Epidem.* 1787.

HOLZ ⁴⁰), ROE ⁴¹), ROUSSEL ⁴²), UNZER ⁴³), DE MEZA ⁴⁴), HENSLER ⁴⁵), WALKER ⁴⁶), ORLANDI ⁴⁷), HOPFENGÄRTNER ⁴⁸), OBERTÄUFER ⁴⁹), DESSESSARZ ⁵⁰), SUASSO *) aliique infra recensendi.

40) *Historia variolarum.* Vid. nova acta phys. medic. T. IV. obs. 38. p. 172.

41) *Treatise on natural small-pox.* Lond. 1780.

42) *Recherches sur la petite vérole.* Paris 1783.

43) *Abhandl. von den Pocken.* Halberst. 1782.

44) *Descriptio variolarum epidemicarum.* a. 1786. in Actis Soc. R. med. Havniensis. Vol. 3. p. 69.

45) *Tentaminum et observationum de morbo varioloso etc.*

46) *Untersuchung der Pocken in medicinischer und politischer Hinsicht.* Leipz. 1791.

47) *De vero variolarum cursu et de propria eas curandi methodo.* Romae 1793.

48) *Beobachtungen und Untersuchungen über die Pockenkrankheit.* Stuttgart 1799.

49) *Medicinish-diätetischer Unterricht über die Natur, Behandlung und Erleichterungsart der Pocken.* St. Gallen 1800.

50) *Mémoires de l'institut national de France pour l'an. 4.*

*) *Morborum exanthematicorum descriptiones, tabularum forma ordinatae: specimen, variolarum atque vaccinarum decursum et curationem exhibens.* Amsterd. 1809.

§. LXV.

Symptomata. Autopsia cadaverum.

1. *Variola simplex* cum morositate, lassitu-^{v. simpli-}
dine, inquietudine et pavoribus sub somno in-^{ces.}
gruit. Facies alternatim rubore et pallore obduci-
tur ac horripilationes subsequente calore in con-
spectum veniunt. Aeger dolores capitis, colli,
axillarum, dorsi, lumborum, artuum, potissime
vero regionis epigastricae, ab attactu auctos, ac-
cusat. Urgent praeterea nausea, vomituritio,
ipseque vomitus. Ad noctem singula mala augen-
tur, ac infantes facile stridore dentium, sopore,
convulsionibus, adulti vero vigiliis, sudoribus
specifice foetentibus, fauciumque siccitate labo-
rant. Pulsus frequens et plerumque mollis. Uri-
na turbida, albescens, subflava, furfuracea ani-
madvertitur. Matutino tempore quaedam sympto-
matum remissio, a nova exacerbatione mox secu-
ta, occurrit, ac sic per triduum, donec quarto
die, praevio cutis pruritu ac tensione, maculae
rubrae, circulares, in medio nodulo profundius
rubro, subduro instructae, primum ad faciem,
praecipue circa labium superius, latera nasi et
mentum, dein ad collum et pectus, ac tandem ad
artus et truncum prorumpant. Absoluta sensim
sensimque spatio duorum nychthemeronum univer-
sa eruptione, febris cum reliquis stadii invasionis
symptomatibus evanescit. Interea plurimae ex va-
riolis,

riolis, ordine, quo effloruerunt, ad basin dilatantur, halone rubro circumdantur, ac in apice vesicula, liquore limido, mox vero turbido, ex flavo albescente repleta, ac foveola in medio praedita, instruuntur. Reliquae maculae, nullo relicto vestigio disparent. Circa septimum et octavum morbi diem, nova febris, *suppuratoria* dicta, accedit, sub qua, praesentibus multis variolis, cutis pustulis intermedia tenditur, intumescit ac rubet; unde facies, clausis palpebris oedematosis, horrendum saepe adspectum refert. Interim cutis tumor oedematosus saepius et sine multis variolis observatur. Quocunque in casu hoc tempore manifesta suppurationis indicia in variolis, halonem rubrum et foveam amittentibus, figuram hemisphaericam induentibus, pure albo, denso repletis et specificum odorem exhalantibus, cernuntur. Decimo, saepissime vero undecimo morbi die, variolae, secundum ordinem, quo suppurare inceperant, punctum obscurum in apice exhibent. Disrupta hic epidermide, materia purulenta, mox ad superficiem in crustam convertenda, emanat. Ad crura et pedes, resorpto pure, plurimae variolae vacuae comparent. Interea febris et cutis tumor, si adfuerint, profligantur et crustae, amplioribus et densioribus exceptis, circa decimum quartum diem, ingruente convalescentia, decidunt;

2. *Variolae inflammatoriae* symptomata stadii V. inflammatoriae. invasionis, vehementi in gradu, cum frigore saepe conspicuo, magno subsequente aestu, sociisque pulsu pleno, duro, oculis rubentibus, fulgentibus, lacrymantibus, siti inexplebili, lingua arida, alvo obstructa, urina rubra, epistaxi, et, apud adultos, salivatione fauciumque doloribus, exhibent. Immo, nonnulli symptomatibus encephalitis et peripneumoniae laborant. Peracta ut supra eruptione, febris cum caeteris symptomatibus remittere, accedente vero stadio suppurationis iterum cum singulis aliis malis exasperari solet. Haud pauci hic soporosi aut suffocati pereunt. Apud nonnullos febris in longum trahitur ac sub puris ex pustulis resorptione, indolem typhodem induit. Feliciores, praevia abundanti suppuratione, stadium exsiccationis et convalescentiam attingunt.

3. *Variolae gastricae*, majore virium jactura, C. gastricae. vomitu multo, bilioso, diarrhoea faeculenta, secessu vermium, ingruunt; et quamvis debito tempore erumpant, attamen lente crescere, facile abnormes fieri, aegre ad maturitatem properare et frequenter cum peticulis societatem inire solent. Morbus indolem typhodem saepe induit, aut, nisi illico ad simplicitatem reducatur, difficulter convalescentiam, multis adhuc periculis circumdatam, attingit.

4. *Va-*

V. typho-
des.

4. *Variolae typhodes* ingenti virium prostratione et systematis nervosi labefactione annunciantur. Rigor molestus scenam aperit, sequiturque calor intensus, cum oculis turbidis, lacrymantibus, vertigine, pulsu contracto, celeri, quandoque inaequali et lento, cute sicca, urina pallida, carotidum vibratione, doloribus spinæ, epigastrii, lumborum, comate, delirio, anxietate, convulsionibus, tremoribus, lipothymis, hæmorrhagiis, fluxu dysenterico etc. Stadium invasionis, aliquando vitæ finem imponens, breve aut præter modum protractum esse solet, ita ut eruptio vel primo, secundo, plerumque tertio morbi die, vel sexto⁵¹), locum inveniat. Contingit ea confestim et tumultuarie, præsertim ad faciem. Variolæ adspectum pallidum aut violaceum referunt, nec rubro ad basin halone cinguntur. Cutis ac si arena injecta conspurcata esset, vel rubore erysipelaceo subfusa, vel peticulis, ecchymomatibus et miliaribus simul obsessa, cernitur. Facta eruptione, febris cum reliquis symptomatibus invalescit ac aeger, animo demisso et abjecto decumbens, ptyalismum, frigus extremitatum, aliæque agonis imminentiæ indicia, exhibet. Qui undecimum diem attingunt, tentamen magis ad suppurationem, quam stadium suppurationis offerunt. Pustulis sive sponte, sive scalpitu ruptis, ichor, intolerabilem foetorem spargens, indusia

51) DE MEZA l. c. p. 69.

et lintea, cuti, saepe decubitu laboranti, agglutinans, ac in crustas bruneas sive nigras desinens, effluit. Miser delirans ac stupidus aperto siccoque oris antro, aphthis saepe obducto, spiritum ducit, ac succensis quasi ignibus tostus, divaricatis crucibus decumbit, donec sub repetito saepe per urinam aut alvum cruoris fluxu, aut superaccidentibus viscerum inflammationibus, inter diem decimum sextum et vigesimum vel fatum supremum, vel secessum crustarum, relictâ cute erosa carnisque crudae instar cruenta, experiatur.

5. Variolas *internas*, a nobis nunquam com-
 pertas, cum aphthis facile confundendas, ac a HAL-
 LERO ⁵²⁾ aliisque ⁵³⁾ negatas, ad viscera non so-
 lum, sed vel ad ossa obvenire contendunt MEAD ⁵⁴⁾,
 FERNELIUS ⁵⁵⁾, HORSTIUS ⁵⁶⁾, BARTHOLINUS ⁵⁷⁾,
 BALLONIUS ⁵⁸⁾, ROD. A CASTRO ⁵⁹⁾, KERKRIN-
 GIUS ⁶⁰⁾ etc., quorum testimonia OTTO docte col-
 legit ⁶¹⁾. Intestina admodum lacerabilia esse HAL-

Autopsia
 cadave-
 rum.

S 2 LER

52) Opusc. patholog. p. 122.

53) COTUNNI l. c. p. 87. LENTILIUS Eteodrom. p. 153.

54) L. c. p. 323.

55) De abditis rerum causis. L. II. c. 12.

56) Obs. anatom. 9.

57) C. 5. obs 29.

58) Epid. et Ephem. L. 2. p. 207.

59) L. 3. c. 16.

60) Obs. anat. 62.

61) L. c. p. 28. 50.

LER asserit ⁶²⁾. Plerumque cadavera nil praeter pulmonis aut alterius visceris inflammationem et saepissime liquorem serosum in cavitate pectoris extravasatum offerunt.

§. LXVI.

C a u s a s a e.

C. praedis-
ponentes.

1. Quivis homo ad variolas praedispositus est: t pauci, de quorum immunitate citra vacci-
nam narratur, variolas vel in utero materno jam perpassi erant ⁶³⁾, vel eas tam parva copia, ut a parentibus non animadverterentur, passi sunt ⁶⁴⁾, vel illarum adventum morte praevenerunt. Quamvis enim aetas infantilis et juvenilis inprimis variolis faveat, exempla tamen non solum adultorum

62) Biblioth. chirurg. Vol. I. p. 408.

63) Exemplum foetus variolosi, a matre hoc morbo laborante enixi, Vindobonae conspexi. Casus similes a MEAD (l. c. cap. 3). LUDWIG (l. c. p. 496) et a HOFFMANN (Diss. de morbis foetuum in utero §. 2.) referuntur. Potest vero foetus in utero variolis laborare, quin mater inficiatur (FERNELIUS l. c.) et vice versa (MAURICEAU *sur les maladies des femmes grosses*. 2. — SMELLIE *Sammlung widernatürlicher Fälle und Bemerkungen in der Hebammenkunst*. 3. B. S. 5. 6. — DIMSDALE in *Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte* 7. B. 18 St. S. 34).

64) Constat, unam variolam, aequae ac decem millia pustularum, a nova infectione munire.

rum sed et senum ⁶⁵⁾, ab iis correptorum, haud desiderantur. Morbus tempore vernali caput attolit, aestivo ferocius saevit, autumnno mitescit, ac hyeme plerumque ⁶⁶⁾ extinguitur.

2. *Causa variolas excitans* contagium sistit, C. excitans.
 originis ignotae, favente annua sive epidemica constitutione ab una in alteram regionem omnibus infensum migrans ⁶⁷⁾, alias nonnullis pro tempore parcens ⁶⁸⁾, sese veluti contagium typhi, sed et in aperto puroque aëre ad nonnullorum passuum distantiam ⁶⁹⁾, aut per litterarum commercium ⁷⁰⁾, vel per insecta ⁷¹⁾, vel per lanceolam non satis deterrentem, qua sanguis variolis laboranti missus fuit

65) STALPARTUS VAN DER WIEL obs. rar. med. cent. poster.

obs. 42. p. 425. — NICOLAI *Pathologie* 2. B. S. 226. —

J. P. FRANK venatorem Bruchsalensem 78 annorum variolis laborantem curavit.

66) Contrarium aliquando contingere, observationes BUCHHOLZII docent l. c. p. 172.

67) Variolarum iter ab alpibus pedemontanis ad extremam usque Italiam pulchre a RICHIA descriptum est. (Morborum vulgarium historia, seu constitutio epidemica Taurinensis a. 1720. August. Taurin. 1721. p. 14).

68) Homines sub una epidemia contagio rebelles, sub altera ab eodem devictos ipse vidi.

69) HAYGARTH *a sketch of a plan to exterminate casual small-pox from Great-Britain.*

70) ROSENSTEIN l. c. p. 199.

71) UNZER *Arzt.* 2. Th. 33 St. S. 125.

fuit ⁷²⁾, propagans, nunc, praesertim adjuvante animi pathemate, fulminis instar effectum exrens ⁷³⁾, nunc ad septimum ⁷⁴⁾ et decimum quartum usque diem ⁷⁵⁾ latens.

C. proxima.

3. *Causa proxima* variolarum in retentionem sanguinis funiculi umbilicalis ⁷⁶⁾, in succum chyloso-lymphaticum corruptum et impurum, ex matre in alumnum derivatum ⁷⁷⁾, in evolutionem extremorum vasorum sanguiferorum ⁷⁸⁾, in glandulas, secretioni variolosi virus dicatas ⁷⁹⁾ aliasque in hypotheses plus minus absurdas, locata fuit.

solum

72) DE MEZA l. c. cap. XXI. §. 211. — HOME principia med. P. 4. Sect. 7.

73) Nobilissimam aequae ac formosissimam feminam, variolas necdum perpersam, ab earum inoculatione abhorrentem et vaccinae insitionem procrastinantem, cognovi, quae amicae pallium per jocos induens, ac in illius domo variolas regnare audiens, maxime inde et ad lipothymiam usque terrefacta, extemplo in stadium invasionis variolarum lethiferarum incidit.

74) BUCHHOLZ l. c. p. 174.

75) FORDYCE l. c. p. 3.

76) HORSTIUS opp. I. p. 263. — MARSCHALL *Unter-richt zur Pflege der Ledigen — und Kinder.* — MESMER in *ΔΕΚΑΗΗΕΙΟΝ*. 2. Jahrg. 1812. 9. Heft.

77) FR. HOFFMANN med. rat. syst. T. IV. p. 144.

78) HAHN l. c. Falsitatem hujus doctrinae LUDWIG demonstrat (l. c. p. 215).

79) COTUNNI l. c. — C. L. HOFFMANN l. c. — Eos folliculos mucosos a variolis inflammatos pro glandulis habuisse, recte HUFELANDIUS docuit.

Solum id constat, variolas sistere morbum specifi-
cum, nunc simplicem, nunc complicatum, in
quo, testante cutis tumore oedematoso, salivatio-
ne et diarrhoea, systema lymphaticum maxime
afficitur.

§. LXVII.

Diagnosis.

1. *Stadium invasionis* variolarum nullum. Sympto-
agnoscere signum gentilitium, absentia febris, nau- mata inva-
sea et vomitus ⁸⁰⁾, doloris epigastrii, convulsio- sionis.
num, nonnullis epidemiis communis, docet. Neo
raro in variolis prodroma, alias scarlatinae et
morbillis communia e. c. faucium dolor, coryza, a
salivatione hinc inde soluta ⁸¹⁾, sternutatio, la-
crymatio, minus tamen quam in morbillis ca-
lida ⁸²⁾ et sine lucis intolerantia, occurrunt.

2. *Copia* variolarum admodum diversa est. Eruptio cu-
tanea.
Hinc inde enim illarum solummodo tres, quatuor,
septem comparent, alias numerari nequeunt. Co-
piosissimae pustulae in facie, non exceptis palpe-
bris, observari solent ⁸³⁾. Oculorum albugineam

80) DE MEZA l. c. p. 68.

81) BUCHHOLZ l. c. p. 176.

82) ROSENSTEIN l. c. p. 109.

83) Animadvertente CAMPERO, si 10,000 variolarum ho-
minem obtegant, facies circiter 2000 exhibebit. (Diss. de
emolumentis et optima methodo insitionis variolarum.
Groening. 1774. p. 51).

a variolis interdum obsideri affirmatur⁸⁴⁾, at ab aliis⁸⁵⁾ jure in dubium vocatur. Paucis prurientibus variolis, pustulae inter se distinctae manent (*Variolae discretae*); — alias vel cohaerent (*V. cohaerentes*), vel confluunt (*V. confluentes*), vel in agmen colliguntur (*V. corymbosae*). Aliquando *morbis variolosus sine variolis* decurrit⁸⁶⁾ et in aegro nec variolas nec vaccinam perpesso ex occasione contagium variolarum suscipiendi, ex curriculo morbi, symptomatibus stadii invasionis variolarum praediti atque ex subsequente variolas vel vaccinam contrahendi immunitate, cognoscitur. Haud raro tandem variolae, febre sive gastrica graviori, sive typhode stipatae consuetam minime exhibent formam (*V. abnormes*). Huc pertinent: 1. *Variola serosa* sive *crystallina* in pustulis consistens lente crescentibus, superficialibus, pallidis, depressis, in medio fovea instructis⁸⁷⁾, ichore acri, *contagioso*, limpido repletis, nunquam maturationem attingentibus, aliquando in vesicas planas, latas, diaphanas, acerrima lymphata turgescentes⁸⁸⁾, coalescentibus; — 2. *Variola sanguinea, nigra, haematodes, scorbutica,*

84) NICOLAI *Pathologie* 3. B. p. 310.

85) SWIETEN I. c. §. 1396.

86) HENSLEY I. c. p. 42. — LENTIN obs. med. fasc. II. p. 25. — Comment. Lips. Vol. V. p. 692.

87) SARCONE I. c.

88) ELLER I. c. p. 146.

tytica, interdum nucis magnitudine ⁸⁹⁾, ac a SYDENHAMO ⁹⁰⁾, HUXHAMO ⁹¹⁾ et GESNERO optime descripta; — et 3. *variola verrucosa* sive *solidescens*, papulas referens, ex fibrillis densis intus conflatas, distinctas, quae disruptae parum saniei effundunt et in verrucas transeunt. Pulchre hanc exitialem morbi formam ELLERUS ⁹²⁾ et CAMERARIUS ⁹³⁾ descripserunt.

3. *Variolae cum peticulis*, cum *bullis*, cum *morbillis*, cum *varicella*, et cum *strophulo* confundi possent. Facilis confusio.

4. *Variolae* solummodo sub primo eruptionis momento similitudinem cum *peticulis* alunt, a quibus distinguuntur, ne dicamus de symptomatibus stadii invasionis, ex eo quod puncta variolosa non solum super cutim elevata sed et *nodulo in medio* instructa sint, ac potissime faciem, rarissimam peticularum sedem ⁹⁴⁾, occupent. Distinctio a peticulis.

5. *Variolae crystallinae* cum *bullis* ad spectu conveniunt, dignoscuntur vero habita ratione morborum epidemice regnantium et symptomatum Distinctio a bullis.

pro-

89) Sic accidit in lethali variolarum epidemia a. 1760. 1761 *Stokholmae* observata (*Götting. gelehrte Anzeigen* 1771. 87. St. S. 747).

90) *Variolae* a. 1674.

91) De aëre. p. 37.

92) L. c. p. 147.

93) Act. phys. med. N. C. Vol. II. obs. 154. p. 358.

94) Cap. II. §. VIII. 1.

prodromorum, illis variolarum normalium similia.

Distinctio a morbillis. 6. *Variolae* consuetis prodromis orbatae ac praesertim cum symptomatibus coryzae invadentes, tempore, quo primum efflorescunt, pro morbillis haberi possunt.

Morbilli.

a. Sub forma *punctorum* undique prominentium et *planorum* crumpunt.

b. Facta eruptione febris, vel in leviori morbo, haud multum remittit.

c. Lacrymatio ardens est.

d. Intolerantia lucis magna.

Variolae.

a. Sub forma *macularum*, in medio tantum prominentium ac *nodulo* instructarum comparent.

b. Facta eruptione febris in leviori saltem morbo evanescit.

c. Lacrymatio vix calida.

d. Intolerantia lucis non major, quam in reliquis morbis febrilibus.

Diversa v. indoles.

7 *Diversa variolarum indoles*, jam ex morbi descriptione elucens, non ex uno tantum signo determinanda est. Sic variolae *discretae* quamvis ut plurimum de simplici ac benigno morbo testentur, atamen interdum typhodem exhibent indolem

lem⁹⁵⁾ et vice versa variolae *confluentes* ⁹⁶⁾. Praecipue caveri debet, ne ex virium prostratione et convulsionibus aliisque symptomatibus nervosis, saepe apud puellas deformitatem corporis timentes, obviis ⁹⁷⁾, malignam morbi naturam arguamus. Cave quoque, ne pulsum debilem credas, ubi eum ob cutis tumorem non rite percipis. Gastrica symptomata in morbo, turbis ventriculi per se stipato, fallacissima esse, sponte elucet. Praesertim autem latens fomes verminosus medici attentionem exposcit.

8. Tandem variolas, citra exanthemata symptomata, cum aliis morbis, tum acutis, tum chronicis *complicari* posse, haud ignorandum est. Loquimur de *morbillis* cum variolis nunc simul vel retardando ⁹⁸⁾, vel haud immutando ⁹⁹⁾ harum curriculum florentibus ¹⁰⁰⁾, nunc invicem alter-
utrum

95) ELLER l. c. p. 138. — HELVETIUS l. c. — STÖRK an. med. II. p. 162. — HENSLEY l. c. p. 33.

96) ELLER l. c. p. 139. — Variolas etsi benignas, haud raro apud infantes robustos, succulentos *confluere* vidi.

97) SWIETEN l. c. — HUXHAM l. c. p. 123. — RAHN l. c. p. 375.

98) MANGET in *med. Commentarien von Edinburgh*. 1. B. S. 353.

99) RAINY ibid. 3. B. S. 479. Et: HUFELAND's *Journal*. 10. B. 2. St. S. 63.

100) KING ibid. S. 480. — BERGIUS *Schwedische Abh.* 1766. S. 71.

utrum corporis latus occupantibus ¹⁾, nunc sibi proxime succedentibus ²⁾. Idem de *scarlatina* ³⁾, de *psora* ⁴⁾, de *plica* ⁵⁾, de *tussi convulsiva* ⁶⁾, de *febris intermittentibus* ⁷⁾ et, ut fertur, de *pemphigo* ⁸⁾ valet.

§. LXVIII.

Prognosis.

Pericu-
lum.

1. Variolas strages majores quam pestem edidisse ex calculo a SÜSMILCHIO ⁹⁾, TRALLESIO ¹⁰⁾, DIMSDALIO ¹¹⁾, RAMAZZINIO ¹²⁾, BRUCIO ¹³⁾, TIS-

8000

S. 71. — MACBRIDE *methodical introduction to the theory and practice of physic.* p. 376.

1) ETTMÜLLER opp. II. P. I. c. 10.

2) Acta N. C. Vol. VI. obs. 109.

3) Plura scarlatinae cum variolis incedentis exempla in nosocomio Vindobonensi conspexi, aliaque refert DESSESSARZ (l. c. No. 25).

4) Saepius ipse vidi.

5) Ita.

6) DESSESSARZ. l. c. No. 24.

7) SARCONE l. c. T. I. p. 230. — RAHN l. c. p. 366.

8) GARN in HUFELAND's *Journal*. 4. B. S. 359.

9) *Göttliche Ordnung*. 2. Th. §. 528. 3. Th. S. 627.

10) L. c.

11) *Tracts of inoculation*. Lond. 1781.

12) *Constit. epidem. Mutinensis* a. 1691.

13) *Voyages aux sources du Nil*. T. 3. p. 625.

(SOTO ¹⁴), PERCIVALIO ¹⁵) etc. instituto, in quo ne comprehenduntur quidem ii, qui *ex reliquiis* variolarum perierunt, eruitur. Infantes, dummodo natiuitati non admodum proximi, variolas prae adultis felicius superant. Lactantes tamen gravius affliguntur, si variolae labia et fauces occupent. Pubertas, fluxus menstruus, graviditas ¹⁶) et puerperium morbum vehementiorem reddunt. Teste ROSENSTEINIO plures feminae quam mares interficiuntur ¹⁷). Sunt familiae, quae gravius, sunt aliae, quae lenius variolas patiantur, immo, referente CAMPERO, proles plerumque eadem ratione variolas pati solet, qua eas sive pater, sive mater, cui maxime habitu respondent, perpeffus est ¹⁸). Valetudinarii, praesertim scrophulosi, arthritici, scorbutici, venerei ad variolas feliciter superandas minus idonei sunt. Verum, non desiderantur exceptiones, ac nostrae aliorumque ¹⁹) observationes, variolas interdum *salutares* esse, docent.

2. Fortis

14) *Abhandlung von der Einpfropfung der Blattern.* §. 4. p. 6.

15) *Philosophical, medical and experimental essays* p. 87.

16) *TODE arzneykundige Annalen.* 13 Hest. p. 44.

17) *Kinderkrankheiten* S. 167.

18) *L. c.* p. 6. 7.

19) GREGORY *Anfangsgründe* §. 125. S. 75. — MURRAY *nova acta eruditorum* 1767. p. 496. DIMSDALE *L. c.* — CAMPER *L. c.* p. 30.

Semiotica.

2. Fortis lumborum dolor ac frigus magnum²⁰⁾ gravem designant morbum. Convulsiones paucae, brevi ante eruptionem apud infantes comparentes, sunt innocuae: secus autem si diuturnae, praemature erumpentes et violentae fuerint; hoc enim in casu apoplexia²¹⁾, paralysis²²⁾, loquelae defectus²³⁾, mors repentina²⁴⁾ sequi possunt. Summas tamen et diuturnas convulsiones innoxias descripsit ELLER²⁵⁾. Diarrhoea dummodo cum eruptione cesset aut circa decimum tantum diem oriatur, salutaris esse solet. Eam per totum morbi curriculum cum emolumento continuasse vidimus, idemque fatetur RICH²⁶⁾. Vermium secessus aliquando lethalis, interdum proficiuus animadvertitur²⁷⁾. Sudores fortes in omni variolarum stadio malum offerunt symptoma²⁸⁾. Idem de salivatione mature comparente et inopi-

20) TRILLER Diss. de horrore in febribus exanthematicis, praesertim variolis, signo plerumque letali. *Wittenb.* 1769.

21) *Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte.* 3. B. 2. St. S. 359.

22) SCHULZ l. c. p. 6. 7.

23) CAMPER l. c. p. 15.

24) SCHULZ l. c.

25) L. c. p. 147.

26) L. c. p. 15.

27) NICOLAI l. c. 2. Th. S. 289.

28) GRANT *neue Beobachtungen.* p. 28.

inopinatè suppressa, dicendum est. Sed et eadem bene procedente, aeger aliquando moritur ²⁹⁾. Delirium, nisi comparente exanthemate dissipetur, de encephalitide facile testatur. Malum est: si facta eruptione, facies instar pulveris a limatura acicularum undiquè adspersa cernatur aut detumescat ³⁰⁾; — si maturescentibus variolis novae adhuc succrescant; — si cessante salivatione pustulae, quasi vacuae, concidant; — si peracta eruptione, citra diathesin inflammatoriam et methodum nimis calefacientem, haemorrhagiae, imprimis viarum urinalium ³¹⁾ contingant; — si sangius corium album exhibeat ³²⁾; — si vox et respiratio nec non deglutitionis opus ³³⁾ multum laedantur; sique exanthemata secundaria, exceptis aliquando miliaribus, in conspectum veniant. *Octavus dies* in variolis inflammatoriis et *undecimus* in typhodibus, prae caeteris timendi sunt.

3. Variolae *maculas* cuprei coloris per mensem et ultra relinquunt. Sociae saepe fiunt *foveae* sive *cicatrices* plerumque cuti concolores, inaequales, saepe punctis nigris notatae, imprimis faciem et manus copiose occupantes, tractu temporis sub

Mala res-
dua.

cor.

29) SELLE *Handbuch*. p. 101.

30) SWIETEN l. c. T. V. §. 1398. p. 102.

31) SYDENHAM *schedula monitoria* de novae febris ingressu.

32) BAGLIVI *prax. med.* p. 6r.

33) WINTRICHAM l. c. p. 473.

corporis incremento haud raro evanescentes, quarumque descriptionem HEIM exacte tradidit ³⁴⁾. Et *desquamationem* amplam, sub qua compacta epidermis stigmata variolarum exhibebat, observavimus. Interdum sub convalescentia *variolae* sic dictae *secundariae*, species videlicet *varicellae*, praevio febris insultu, ingruunt ³⁵⁾. Saepe *abscessus* frontis, articulorum, faucium, glandularum salivalium, cervicalium, ad ulcera maligna et ad cariem proni, oriuntur. Et systema glandularum lymphaticarum pulmonis, mesenterii aliarumque partium internarum saepe suppurationes offert. Interdum variolae concretionem praeputii cum glande, vel destructionem sive frenuli sive hymenis inducunt. Saepissime vero *sensus*, inprimis *oculi*, testantibus tot *ophthalmiis chronicis*, tot *staphylomatibus*, tot *coecitatibus* ³⁶⁾, inde laeduntur. Ex *auribus* haud raro materia puriformis sive pus, inflammationis chronicae meatus auditorii sive abscessus cavitatis tympani erosae productum, non sine cariei suspicione, surditatis caussa, effluit. Observavimus a variolis cavitatem nasi concretam ac vocem per totum vitae curriculum

34) L. c. p. 220.

35) HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde*. 3. B. p. 754.

36) JOS. FRANKS *Reise nach Paris, London u. s. w.* 2. Thl. p. 306.

lum fere extinctam. Ita cum aliis ³⁷⁾ metastases ad nervos, paralyseos caussas.

4. Quamvis possibilitatem *secundae infectio*-*Secunda infectio*, *nis* variolarum, ut C. L. HOFFMANN fecerat ³⁸⁾, non omnino in dubium revocemus, attamen maximam copiam observationum de reditu variolarum ³⁹⁾, confusioni istarum cum *varicella* adscribendam esse, suspicamur.

§. LXIX.

P r o p h y l a c t i c a.

1. Ad *extirpandas* variolas, ante vaccinae in-*Extirpatio*.
ventum ob continuum inter cives commercium, inania plane dederunt consilia MEDICUS ⁴⁰⁾, PAULET ⁴¹⁾,
HAY.

37) J. P. FRANK Epitome l. c. p. 177.

38) Op. c.

39) HAEN l. c. — HENSLEY l. c. Tent. 8. p. 8t. — NICOLAI l. c. p. 285. — FOUQUET l. c. T. I. p. 30. — SARCONI *von den Krankheiten von Neapel*. P. I. — MOSCA *dell' aria* etc. Diss. 2. part. 2. p. 106. — CAMPER l. c. p. 10. — JUNKER l. c. 5. St. 8. 185.

40) *Von der Ausrottung der Blattern* 1762. in *Samml. von Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft*. 2. B. p. 713.

41) *Le seul préservatif de la petite vérole*. Amsterd. 1776.

HAYGARTH ⁴²⁾, SCUDERI ⁴³⁾, FAUST ⁴⁴⁾, SARCO-
NE ⁴⁵⁾, JUNKER ⁴⁶⁾ aliique.

Mitigatio. 2. Neque auxilia ad *mitigandam vim variola-*
rum sive ad praepediendam earum suppurationem ⁴⁷⁾ *proposita, scilicet aqua picea* ^{*}), *vesica-*
toria ⁴⁸⁾, *mercurius* ⁴⁹⁾, *cortex cinchonae officinalis*

42) *Untersuchungen, wie den Blättern zuvorzukommen sey.*
Berlin u. Stettin. 1786.

43) *De variolarum morborumque contagiosorum causa*
atque facili extinctione. Neapol. 1789.

44) *Versuch über die Pflicht der Menschen jeden Blatter-*
kranken von der Gemeinschaft der Gesunden abzusondern
und dadurch die Ausrottung des Blattergiftes zu bewir-
ken. Leipz. 1794.

45) Op. c.

46) *Gemeinnützliche Vorschläge wider die Pockenkrankheit.*
Dritter Versuch. Halle 1796. — *Archiv der Aerzte und*
Seelsorger wider die Pockennoth. Leipz. 1798. — *Mé-*
moire adressé au congrès de Rastatt concernant la petite
vérole. Halle 1798.

47) *Hunc scopum attingere sategerunt: BOERHAAVE*
(aphor. de cogn. et curand. morb. §. 1389. 1392). LO-
BIVS (l. c. §. 574), SCHREIBERUS (de peste
p. 47) etc.

^{*}) *Prior narrative of the success of Tar-water.* 1746.

48) Closs l. c.

49) *WOENSEL neue mit dem Mercur in den Blättern ge-*
machte Erfahrungen etc. Leipz. 1783.

nalis ⁵⁰⁾, aliaque a SCHULZENHEIM collecta ⁵¹⁾ satisfecerunt.

3. Rebus ita se habentibus, homines, ut hostem, quem vincere haud potuerant, saltem placarent, et per *emptionem* ⁵²⁾ et per *insitionem* variolarum illius sese manibus ultro tradiderunt. *Insitio* multis retro seculis, populis Sinae ⁵³⁾ et Indiae ⁵⁴⁾ et jam dudum iis Georgiae et Cereetiae ⁵⁵⁾, nec non Graeciae ⁵⁶⁾ nota, ac Byzantii versus finem seculi decimi septimi et initium octavi vulgatissima, opera matronae WORTHLY MONTAGUE ⁵⁷⁾, proprios filios illi subjicientis, a. 1721 in Anglia innotuit ac praemissis nonnullis felicissimis periculis in hominibus criminum capitalium reis, primum pro sex orphanis,

50) MEDICUS l. c. p. 325.

51) *Unterricht von der Einpfropfung der Pocken.*

52) A temporibus immemorabilibus varias apud gentes, adventante epidemia *benigna* variolarum, parentes infantes adhuc intactos, proposita mercede, contagio exponere solebant.

53) *Lettres édifiantes et curieuses.* T. 21. p. 5.

54) WOODWILLE *history of the inoculation of the small-pox.* Lond. 1795.

55) AUBRY DE LA MOTRAYE *Voyages en Europe, Asie et Afrique.* Vol. 2. p. 98. Haye 1727.

56) Teste CARBURI. Vid. DE LA CONDAMINE in *Mémoires de l'académie des sciences à Paris* 1758. p. 721.

57) *Lettres written during her travels in Europe, Asia and Africa.* Vol. 2. lett. 31. London 1763.

nis, et dein pro Regia prole in usum deducta fuit ⁵⁸⁾. Porro insitio in Galliam ⁵⁹⁾, Germaniam ⁶⁰⁾, Italiam ⁶¹⁾, Daniam et Sueciam ⁶²⁾, Hispaniam ⁶³⁾, Americam ⁶⁴⁾ perducta est, quin tamen in Anglia ante a. 1746 et Episcopi ISAACI MADDOXI conamina ⁶⁵⁾ floruerit. Hic enim sicuti in aliis regionibus nova methodus haud paucos obtretractores ⁶⁶⁾ variis argumentis eam vilipendentes in-

58) JURINE (*Philosophical Transact.* Vol. 32. p. 213.)
MAITLAND *Account of inoculat. the small-pox vindicated.* Lond. 1722.

59) Opera DE LA COSTE, ASTRUC, DODART, CHIRAC. —
Ab anno 1763 usque ad a. 1769 inoculatio jussu superioris regni curiae prohibita erat.

60) A. 1724. conaminibus MAITLANDI et ELLERI.

61) A. 1750, opera inprimis uxoris Marchionis BUSSALINI.

62) A. 1754. circiter. Vid. MURRAY historia insitionis variolarum in Suecia. Goett. 1767.

63) A. 1771. nisu GORMANI.] Vid. WOODVILLE op. c. p. 295.

64) A. 1764. opera TENNENTI (WOODWILLE l. c. p. 279) et FRANKLINI (SPRENGEL *Versuch einer pragm. Geschichte der Heilkunde* 5. B. p. 561).

65) Nosocomium exclusive inoculationi variolarum et variolis dicatum (*The Middlessex-County-hospital for small-pox*) condidit.

66) Huc pertinent inprimis: MASSEY (*Sermon against inoculating the small-pox.* Lond. 1722) HOWGRAVE (*Reasons against the inoculation of the small-pox.* Lond. 1724),

invenit, inter quae argumenta illud solum, quod insitio periculum variolas suscipiendi perpetuo foveat ⁶⁷⁾, magni ponderis erat. Reliquas enim objectiones plene diluerunt insitionis coryphaei DE LA CONDAMINE ⁶⁸⁾, TISSOT ⁶⁹⁾, GATTI ⁷⁰⁾, SUTTON ⁷¹⁾, DIMSDALE ⁷²⁾, TRALLES ⁷³⁾, CAMPER ⁷⁴⁾,

HENS-

1724), HAEN (Quaestiones saepius motae super metho-
do inoculandi variolas. Vindob. 1757. — *Refutation*
de l'inoculation. Vienne 1759).

67) Facile hinc explicatur RASTII assertio: inde ab a.
172, ubi inoculatio Londini introducta est, plures
quam antea ex variolis demortuos esse, (*Réflexions sur*
l'inoculation de la petite vérole. Lyon 1763). Lege de
hoc argumento et Salzbg. med. chirurg. Zeitung 1793.
p. 200.

68) *Lettres à M. MATY sur l'état présent de l'inoculation*
en France. Paris 1764. — *Histoire de l'inoculation de*
la petite vérole. Lyon 1772.

69) *Lettre à M. DE HAEN en réponse à ses questions*
1759.

70) *Lettre à M. ROUX*. Paris 1763. — *Réflexions sur les*
prejugés, qui s'opposent aux progrès et à la perfection
de l'inoculation. Bruxelles 1764. — *Nouvelles réflexions*
sur la pratique de l'inoculation. Paris 1767.

71) *Le secret des SUTTONS dévoilé*. Haye 1774.

72) *Schriften über die Einpfropfung der Blattern*. Leipz.
1782.

73) L. c.

74) L. c.

HENSLE⁷⁵⁾, MANETTI⁷⁶⁾, HUFELAND⁷⁷⁾ alique, ac revera inoculationis ope morbus levior fiebat⁷⁸⁾ ac anni tempore et aetate variolis minus adversantibus, produci poterat ad libitum. Eligebantur nempe inprimis ver, atque vel primi quatuor vitae menses⁷⁹⁾, vel tempus, quo dentitionis opus absolutum est⁸⁰⁾, ac evitabantur periodi pubertatis, menstruationis, graviditatis et puerperii. Ipsa insitio, laesa epidermide brachii, aut lanceolae⁸¹⁾, aut vesicatorii⁸²⁾ ope, ac introducto pure ex variola, si possibile benigna⁸³⁾, tempore, quo febris eruptiva adhuc aderat⁸⁴⁾, desumpto, sine

75) *Briefe über das Blatterbelzen*. Altona 1765.

76) *Dell' inoculazione del vajuolo*. Firenze 1761.

77) *Ueber die wesentlichen Vorzüge der Inokulation*. Leipz. 1792.

78) Ex decem millibus septingentis ac viginti hominum inoculatorum, viginti quinque mortui sunt. (HENSLE⁷⁵⁾ l. c. p. 174).

79) HUFELAND l. c.

80) FORDYCE. *Samml. auserles. Abhandl. f. prakt. Aerzte*. 11. B. S. 559.

81) CAMPER. DIMSDALE.

82) CALDANI — *Inesto felice del vajuolo* 1763. — BALZ Diss. de praestantia methodi, variolas ope vesicatorii inserendi. Stuttg. 1792.

83) Quamvis enim et pus ex variola maligna depromptum posse optimam excitare variolam, constet, attamen et contrarii habentur exempla (HUFELAND l. c. p. 73).

84) CAMPER l. c. p. 84.

sine praevia in sanis praeparatione, perficiebatur. Absoluto primi nychthemeri curriculo, locus insitionis microscopio examinatus, ceterum aliquantulum rugosam et colore ex flavo bruneo notatam exhibebat. Sic et secundo tertioque die: quarto rubedo et pruritus circa locum affectum prodibant. Quinto vesicula (*variola mater*), saepe caterva vesicularum circumdata, in conspectum veniebat. Sexto sive septimo, interdum nono vel decimo die symptomata stadii invasionis, praevio axillarum dolore ingruebant. Reliquum curriculum ut plurimum, sicuti in variolis simplicibus, observabatur. Novum autem ac immortale inventum, methodum variolas inserendi nostris temporibus plane supervacaneam ac omnino rejiciendam reddidit. Loquimur de *Vaccina*.

4. A remotissimis usque temporibus conductores in comitatu *Gloucester* et in *Holsatia* ⁸⁵⁾, ^{Inventio et historia.} inter vaccas morbum dari, anglice *cow-pox* (*variolae vaccarum*), *vaccinam* scilicet ⁸⁶⁾, mammas horum animalium sub forma pustularum aggredientem, manus et brachia hominum ea mulgentium, si necdum variolas perpassi essent, invadentem, illisque immunitatem adversus hocce exanthema conciliantem, compertum habuerunt.

Popu-

85) TODE *med. chirurg. Journal.* 5. B. 3s St. p. 1. 77.

86) GERM. *Die Kuhpocken.* GALL. *La vaccine.* ITAL. *Il vaccinio.* Ross. Корова оспа прадчохранимелъная оспа. POLON. *Krowia ospa.*

Popularis haec observatio a SUTTONIO et FAUSTERO confirmata ac societati medicae a. 1768 communicata fuit ⁸⁷⁾. Nihilominus res isthaec, ac si ea vel probabilitatis nota destitueretur, usque ad an. 1795, quo ADAMS illius per transennam meminit ⁸⁸⁾, derelicta jacere videbatur, donec Vir summus ad reparandum genus humanum bellis exhaustum coelitus missus, EDUARDUS JENNER, facultatem vaccinae inhaerentem contra variolas praemuniendi, quam privatis tentaminibus ab a. 1776 institutis detexerat, ac a. 1788 peculiaris medicorum societatis examini submiserat ⁸⁹⁾, utpote extra omnem dubitationis aleam positam a. 1798 publici juris reddiderit ⁹⁰⁾. JENNERI experimenta WOODVILLE die 21 Januarii 1799 in nosocomio Londinensi variolis dicato repetiit; verum, quoniam debitas neglexerat cautelas, factum est, ut variolarum contagium cum eo vaccinae connubium iniret, unde vaccina eruptione universali variolarum

87) SACCO *Trattato di vaccinazione*. Milano 1809.

88) *Observations on morbid poisons, phagedaena and cancer*, Lond. 1795.

89) JOSEPH FRANKS *Reise nach Paris, London*. 1. Th. S. 272.

90) *Inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae*. Lond. 1798. — *Further observations on the variolae vaccinae*. Lond. 1799. — *A continuation of facts and observations relative to the variolae vaccinae*. Lond. 1800.

rum stipata in conspectum venit⁹¹). Detecta erroris causa, ac novis institutis periculis, WOODVILLE ad opinionem JENNERI accessit⁹²). Idem GEORGIUS PEARSON fecerat, qui tandem, ob causas alibi expositas⁹³), obtrektor immortalis vaccinae inventoris redditus est. Jam vero die 2. Junii 1802 Parlamentum JENNERO publice remunerationem decrevit, ac mense Januarii 1803 sub tutela magnae Britanniae Regis, institutum vaccinationis, JENNERI nomen ferens, super ipsa rudera alterius ejusdem naturae instituti, quod pridem memoratus PEARSON inscio JENNERO fundaverat, conditum est. Vaccinae negotium tandem magis magisque in Anglia promoverunt SIMMONS⁹⁴), FERMOR⁹⁵), LOY⁹⁶), AIKING⁹⁷), THORNTON

91) *Reports of a series of inoculations for the variolae vaccinae, or cow-pox, with remarks and observations on this disease, considered as a substitute for small-pox.* Lond. 1799.

92) *Observations on cow-pox.* Lond. 1800.

93) JOSEPH FRANKS *Reise* l. c.

94) *Reflexions on the propriety of performing the Cesa-rean operation, to which are added observations [on cancer and experiments on the supposed origine of cow-pox.* Lond. 1798.

95) *Reflexions on the cow-pox.* Lond. 1801.

96) *Account of some experiments on the origine of cow-pox.* Witby 1801.

97) *A concise view of all the most important facts which have*

TON ⁹⁸), ADDINGTON ⁹⁹), RING ¹⁰⁰), LETTSOM ¹), FRAZER ²), J. COOPER ³) aliique multi. Verum nec adversarii, inter quos GOLDSON ⁴), ROWLEY ⁵), MOSELY ⁶) et SQUIREL ⁷) meminisse sufficiat, defuere. Eorum autem tentamina impedire haud poterant, quominus praevio severo et publice,

jussu

have hitherto appeared concerning the cow-pox. 2 edit.

Lond. 1801.

98) *Facts decisives in favour of the cow-pox.* London 1802.

99) *Practical observations on the inoculation of the cow-pox.* Birmingham 1802.

100) *Treatise on the cow-pox etc.* Lond. 1803. — *An answer to Dr. GOLDSON, proving that vaccination is a permanent security against the small-pox.* Lond. 1804. — *An answer to MOSELY containing a defence of vaccination.* Lond. 1805.

1) *Apology for differing in opinion from the authors of the monthly and critical reviews.* Lond. 1803.

2) *Observations on vaccine inoculation tending to confuse the opinion of ROWLEY.* Lond. 1805.

3) *Vaccination vindicated.*

4) *Cases of small-pox subsequent to vaccination.* Portsea. 1804.

5) *Cow pox inoculation no security against small-pox infection.* Lond. 1805.

6) *Treatise on the Lues bovilla or cow-pox.* London 1805.

7) *Observations on the cow-pox, with cases, to prove that it is no security against the small-pox.* London 1805.

jussu supremo, instituto vaccinationis examine ⁸⁾, dilutis inde omnibus dubiis, novis inventor, ut luculentissimum gentis Anglicanae grati animi extaret testimonium, auctus fuerit remunerationibus. Vaccina citissime Galliam attigit, ubi sub patrocinio DE LA ROCHEFAUCAULT-LIANCOURT, adjuvantibus THOURET ⁹⁾, AUBERT ¹⁰⁾, COLON ¹¹⁾, HUSSON ¹²⁾, HALLÉ ¹³⁾, VALENTIN ¹⁴⁾, et inprimis ODIER ¹⁵⁾, irritis tentaminibus adversariorum

VAU-

8) *The evidence at large as laid before the Committee of the house of Commons, respecting Dr. JENNERS discovery of vaccine inoculation.* Lond. 1805. — *Report of the R. Jennerian Society, in Monthly Magazine* 1806. — *Report of R. College of physicians of London on vaccination.* 1807.

9) *Salzburger med. chirurg. Zeitung.* 4. B. S. 236.

10) *Rapport sur la vaccine etc.* à Paris 1800.

11) *Essay sur l'inoculation de la vaccine.* Paris 1800. — *Recueil d'observations et de faits relatifs à la vaccine.* Paris 1801.

12) *Récherches historiques et médicales sur la vaccine.* Paris 1801.

13) *Mémoire de l'Institut national de France* 1807. JUILL. Et: *Bericht des Nationalinstituts über die Kuhpocken, vom 17. August 1812.* in HUFELAND'S und HIMLY'S *Journal der prakt. Heilkunde.* 1813. Januar. p. 108.

14) *Résultats de l'inoculation de la vaccine dans les départements de la Meurthe.* Paris 1802.

15) *Rapport sur la vaccine.* Genève. a. 8.

VAUME ¹⁶⁾, scilicet VERDIER ¹⁷⁾, CHAPPON ¹⁸⁾, MOULET ¹⁹⁾, tum Regiminis, tum Nationis suffragia obtinuit. — In Germania vaccina primum Vindobonam et Hannoveram mense maii 1799 pervenit, ac opera DE CARRO ²⁰⁾, FERRO ²¹⁾, CARENO ²²⁾, BREMSER ²³⁾, PORTENSCHLAG ²⁴⁾, BALLHORN et STROMEYER ²⁵⁾ inclaruit. Brevi post in reliqua Germania innotuit per WIDEMANN, HIMLY

16) *Réflexions sur la nouvelle méthode d'inoculer la petite vérole avec le virus des vaches.* Paris 1799. — *Les dangers de la vaccine démontrés par des faits authentiques.* Paris 1800.

17) *Tableaux analytiques et critiques de la vaccine.* Paris P. A. 9.

18) *Traité historique des dangers de la vaccine.* Paris 1803.

19) *Récherches sur les préjugés et les systèmes en médecine et doutes sur la vaccine.* Paris P. A. 9.

20) *Observations et expériences sur la vaccine.* 2 edit. Vienne 1802.

21) *Ueber den Nutzen der Kuhpocken-Einimpfung.* Wien 1802.

22) *Ueber die Kuhpocken.* Wien 1801.

23) *Die Kuhpocken als Staatsangelegenheit betrachtet.* Wien 1806.

24) *Beytrag zur Geschichte der Kuhpocken in Oesterreich.* Wien 1801.

25) *Traité de l'inoculation vaccine.* Leipz. 1801.

HIMLY et ROOSE ²⁶⁾, SOEMMERRING et LEHR ²⁷⁾,
 HESSERT et PILGER ²⁸⁾, HEIM ²⁹⁾, HUFELAND ³⁰⁾,
 JOERDENS ³¹⁾, STRUVE ³²⁾, OSIANDER ³³⁾, FRIE-
 SE ³⁴⁾, DOMEIER ³⁵⁾, FAUST ³⁶⁾, ECKER ³⁷⁾,
 SCHAEFFER ³⁸⁾, SACHSE ³⁹⁾, SCHÜTZ ⁴⁰⁾, aliosque
 quo-

26) *Ueber das Impfen der Kuhpoken.* Bremen 1801.

27) *Prüfung der Schutzblattern durch Einimpfung mit
 Kinderblattern.* Frankf. 1801.

28) *Einige Worte über die Kuhpoken und deren Im-
 pfung.* Giesen 1800.

29) HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde.* 19. B.
 1. St. S. 55.

30) *Ibid.* 10. B. 2. St. S. 163.

31) *Apologie der Schutzblattern.* Altenburg 1801.

32) *Anleitung zur Kenntniss und Impfung der Kuhpo-
 ken.* Breslau 1802.

33) *Abhandl. über die Kuhpoken.* Gött. 1. 01.

34) *Schlesisch - Südpreuussisches Archiv der die Ausrot-
 tungspoken betreffenden Erfahrungen und Verhandlun-
 gen.* Breslau 1802.

35) *Hebung einiger Besorgnisse, welche die Impfung der
 Kuhpoken etwa verursachen mögen.* Berlin. 1802.

36) *Ueber die Kuhpoken und deren Einimpfung.* Bücke-
 burg 1801.

37) *Ueber die Kuhpocken und deren Einimpfung.* Frei-
 burg 1801.

38) *Beytrag zur Theorie der englischen Pokenimpfung.*
 Regensb. 1802.

39) *Beobachtungen und Bemerkungen über die Kuhpoken.*
 Berlin 1802.

40) *Unterricht für das Publikum über das neulichst ent-*

quorum elenchus apud HUNOLDUM ⁴¹⁾, HECKERUM ⁴²⁾ et KÜHN ⁴³⁾ invenitur. Inter adversarios solummodo HERZ ⁴⁴⁾, MATTUSCHKA ⁴⁵⁾ et quodammodo GOELIS ⁴⁶⁾ numerantur. Etiam ad *Italiam* vaccinae notitia mox perlata est, testantibus BATT ⁴⁷⁾, BRERA ⁴⁸⁾, PALLONI ⁴⁹⁾, FANZAGO ⁵⁰⁾

Mo-

deckte sichere Mittel die Blattern zu verhüten. Bruchsal 1802.

41) *Annalen der Kuhpocken Impfung*. Eurth 1801.

42) KOPPE *Jahrbücher* 1. 2. B. — *Kritische Jahrbücher der Staatsarzneyk*. Berlin 1806.

43) *Collectaneorum de morbo vaccino-varioloso*. Continuat.-I. Lips. 1810.

44) *Ueber die Brutalimpfung und deren Vergleichung mit der humanen*. Berlin 1801.

45) *Ueber Blatterausrottung, Blattern-und Kuhpocken-Einimpfung*. Prag 1803.

46) *Gutachten der medicinischen Fakultät in Wien über die von Dr. GÖLIS gegen die Vaccine gemachte Einwürfe*. (*Medicinische Jahrbücher des k. k. Oesterreich. Staates*. 1. B. 3s St. S. 110).

47) *Giustificazione dell' inesto della vaccina*. Genova.

48) *Avviso al popolo sulla necessità di adottare la vaccina*. Crema 1801.

49) *Memoria sopra l' inoculazione della vaccina in Toscana*. Firenze 1801.

50) *Memoria storica e ragionata sopra l' inesto del vajuolo vaccino*. Padova 1801.

MORESCHI ⁵¹), PAGANI ⁵²), MARSHALL ⁵³), TANTINI ⁵⁴) et imprimis SACCO ⁵⁵). Praecipuus hic adversarius PENADA ⁵⁶) erat. Ad scriptores de vaccina porro pertinent: inter *Hispanos* — DIEGO DE BANCES ⁵⁷), PEDRO HERNANDEZ ⁵⁸); inter *Batavos* — DAVIDS ⁵⁹), VAN DEN BOSCH ⁶⁰), THOMASSEN A THUESSINK ⁶¹), alique, quorum ratio apud DÖRING invenitur ⁶²); inter *Polonos* — DE LA FONTAINE ⁶³), BECU ⁶⁴); inter *Danos et Suecos*

51) *Avviso al publico sul preservativo al vajuola.* Venezia 1801. — *Conferma della mirabile facoltà della vaccina.*

52) *Raguaglio della vaccina in Friule* 1801.

53) *Osservazioni sopra il vajuolo vaccino.* Palermo 1801.

54) *Replica al ragionamento del. Sign. Dre. Car. PUCCIARDI.* Pisa 1812.

55) *Op. c.*

56) *Riflessi sul inesto della vaccina.* Padova 1801.

57) *Tratado de la vaccina.* Madrit 1802.

58) *Origen, destabrimento y progressos de la inoculation de la vaccina.* Madrit: 1802.

59) *Staat der vaccine in ons Land.* Harlem 1801.

60) *Programma van het Harlemsch Institut van der vaccinatie.* Harlem 1801.

61) *Geneeskundige Magazin.*

62) *Journal für die neueste Holländische medicinisch- und naturhistorische Litteratur.* Herborn und Hadamar 1801.

63) *Dziennik zdrowia dla wszystkich stanow.* Warszaw. 1801.

64) *O wakcynie.* Wilnie 1803.

eds — VIBORG ⁶⁵), SCHEEL ⁶⁶). Ad *Rossiam* vaccina illico ex Anglia allata fuit et a diva *Imperatrice* MARIA FEODOROWNA, non solum jussu, sed opera etiam, in omnibus vastissimis imperii partibus divulgata. Inter medicos hic excelluere: BUTTAZ ⁶⁷), HUHNS ⁶⁸), REHMANN ⁶⁹). — Ad *Persiam* et *Indias* vaccina per D. DE CARRO conamina sibi viam stravit. In *America* eam praecipue WATERHAUS divulgavit ⁷⁰).

Argumenta
pro.

5. Omnes, qui de vaccina scripserunt, in hisce conveniunt: vaccinam nullam functionem laedere, — nil doloris excitare, — neque morbi nomen mereri, — omni igitur periculo orbari, — nulla eruptione universali stipari, — non aliter nisi per insitionem contagiosam esse, — quacunque aetate, quocunque anni tempore tuto inseri posse, — nullum peculiare regimen exposcere et certissime variolas antevertere,

6. Ob.

65) Beweis, dass die Blattern eine den Menschen und Thieren gemeine Krankheit sind. (Nord. Archiv von PFAFF, SCHEEL und RUDOLPHI. Kopenhagen 1801. 2. B. 23 St.)

66) Geschichte der Vaccination in Dänemark. (ibid. 3. B. 23 St.) Geschichte der Kuhpocken in Schweden (ibid.).

67) Увѣдомленіе о предохранительной Оспѣ.

68) Allg. Zeitung 1810. No. 175.

69) Salzbg. med. chirurg. Zeitung. 1807.

70) Prospect of exterminating the small-pox. Boston 1800.

6. Objiciunt adversarii: vaccinam hinc inde ^{Argumen-} convulsiones et morbum letalem excitare, — haud ^{ta contra.} raro eruptione universali stipari, — gravissimis ansam porrigere reliquiis, — morbos olim raros communes reddere, — incrementum corporis impedire, — vaccis sanis periculum morbi offerre, — variolas non semper, aut saltem pro tempore tantum, praepedire.

7. Argumentis pro et contra ad trutinam vocatis et cum nostra haud parva hac in re experientia comparatis, colligitur: convulsiones infantibus in genere familiares posse et sub vaccinae curriculo comparere, at non aliter a vaccina ipsa produci, quam a quocunque stimulo insonte, cutim in praedispositis ad mala nervosa nimis sensilem irritante, — nullum dari indubitatum hominis ex vaccina demortui exemplum, — vaccinam, nisi fortuito variolis junctam, nulla stipari *universali* eruptione, quamvis interdum accidat, praeter pustulam in loco insertionis ortam, alias nonnullas pustulas ad partes jam prius morbo quodam, e. c. crusta lactea, intertrigine, detentas, oriri, aut elapsa tertia circiter a vaccinatione hebdomade peculiare exanthema, alibi describendum ⁷¹), in conspectum venire, — vaccinam haud raro infantes valetudinarios perfectae sanitati restituere ⁷²

20

71) Cap. XXXI. §. CXX. No. 17.

72) *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte.* 23. B. p.

674. — STEVESON in DUNCANS *Annal. of med. Lust.* 2.

Vol. I.

ac morbos prius raros e. c. cynanchem trachealem, hydrocephalum acutum, non aliter frequentiores reddere, quam tot infantes ad aegritudines varias praedispositos inter vivos servando, quot variolae alias interfecissent, — vaccinam non solum incremento corporis non obviare, sed illius evolutionem promovere⁷³⁾, eamque, si impediatur hominum vaccinam habentium sive tractantium cum stabulis commercium, nequaquam vaccis periculum infectionis porrigere, — ac postremo tam secure variolas praepedire, quam ipsae variolae secundam praepediunt infectionem. Concessa etenim (quod ob facilem variolarum cum varicella confusionem nimis fidenter non assereremus) possibilitate infectionis variolosae post vaccinam⁷⁴⁾, hoc tamen non alia proportionem contingere posse, quam ipse variolarum pro secunda vice reditus, persuasum habemus. Vaccinam nequaquam pro tempore sed pro toto vitae curriculo contra variolas

Vol. I. — *Salzburg. medic. chirurg. Zeitung.* 1813. No. 20. p. 351.

73) Inter 300 infantes, 136, qui vaccinam experti sunt, ad aspectum magis floridum ac rarius scrophulosum, quam reliqui exhibuerunt (*Gutachten d. medic. Fakultät in Wien* l. c.).

74) WILLAN *Treatise on vaccine inoculation.* Lond. 1806. — MURPHY in HUFELAND's *Journal d. prakt. Heilkunde* 1810. Febr. — WENDELSTADT *Sammlung medic. u. chirurg. Aufsätze.* Hadamar 1807. p. 205. — *The London medical, surgical etc. Repository* 1814.

las munire, experimenta JENNERI, hominibus, qui vaccinam per vaccarum commercium jam ante quinquaginta tres annos perpessi erant, variolas sine effectu inserentis, demonstrant ⁷⁵⁾.

8. Utrum vaccina, spontaneum vaccarum ^{Origo vac-} ^{cinae,} certe non unius regionis ⁷⁶⁾ morbum sistat, — utrum pro degenerata variola humana ⁷⁷⁾ haberi, — aut opinantibus JENNER et LOX a morbo calcanei equorum ⁷⁸⁾ derivari debeat; arduum est determinare. Hoc tantum constat, morbum equorum, de quo agitur, directe hominibus insertum, genui-

U 2

⁷⁵⁾ Accuratissime haec singula exposita sunt in ratione, quam de vaccinae negotio coram instituto nationali Gallicano reddiderunt BERTHOLLET, POREY, et HALLE, die 17. Aug. 1812.

⁷⁶⁾ Vaccinam inter vaccas detexerunt in Lombardia SACCO; in aliis Italiae regionibus MORESCHI, DE' MARCHI, PICCINELLI; in Germania septentrionali BALLHORN et STROMAYER; in Helvetia NEFF (*Abhandl. d. physik. Gesellsch. in Erlangen.* 1. B. 1810); in America BALNIS, BUET. Vaccina autem ab alio vaccarum morbo, [neque contagioso, neque epidemico, cui actio caloris super mammas lacte turgidas ansam porrigit, distinguenda est. (KNÜTTLINGER in versione Germ. Op. Pearson).]

⁷⁷⁾ MAUNOIR in *Bibliothèque Britannique, Sciences et arts.* Vol. 18. p. 102.

⁷⁸⁾ ANGLICE. *Grease.* GERM. *Mauke.* GALL. *Javart.*

nam excitare vaccinam ⁷⁹⁾, quod et de cutanea pecorum affectione ⁸⁰⁾ contenditur ⁸¹⁾.

Curricu-
lum.

9. Curriculum vaccinae sequens in homine animadvertitur. Peracta cum successu insertione, plerumque *tertio* versus finem vergente *die*, vel *quarto* incipiente, *tuberculum* minimi capitis acus magnitudine, rubrum, rotundum, regulare, marginibus elevatis, centro depresso, tum visui, tum tactui sese offert. Apex hujus tuberculi circa *sex-tum diem* in *vesiculam* commutatur, ab initio pallide rubram, aliquando subcoeruleam, dein colorem margaritae gradatim assumentem. Vesicula haec, pro varia inserendi ratione, variam figuram exhibens, est renitens, compacta, exacte circumscripta, marginibus elevatis, ut plurimum rubris, centroque depresso, in quo punctum obscurius, quasi eschara, animadvertitur. Ex cellulis plurimis, nullum inter se commercium alentibus, ea componitur. Liquidum cellulis inclusum serum refert, ab initio viscosum, dein aquosum, constanter diaphanum. Ad *decimum* usque *diem* vesicula crescere solet, verum jam versus *octavum* sive *nonum diem*, rubor coccineus circum compareret, qui *decimo die* *aream* duorum circiter pollicum, tumore et duritie quadam insignitam, omnino doloris expertem, constituit. Hac areâ

la grande éruption de variolines se termine par une

omni-

79) Salz. medic. chirurg. Zeitung. 1812. No. 46.

80) LA CLAVELE'E.

81) ODIER l. c.

omnibus numeris absolutâ, liquidum, in vesica contentum, colorem bruneum ac majorem densitatem induere incipit, donec tota vesicula in *crustam* ex rubro fuscâ, sese a centro ad peripheriam extendentem, cutique tenaciter adhaerentem, desinat. Remota circa *vigesimum octavum diem* hac crusta, *cicatrix* relinquitur, quae microscopio subjecta, plurima foraminula, a radicibus crustae relicta, exhibet.

10. Accidit interdum vaccinam effectus suos jam *secundo*, aut quod saepius contingit, solum *decimo* vel *undecimo* ab insitione *die* exerere: imo, fatente Sacco, vaccinae eruptio aliquando post mensem et annum etiam ab inoculationis epocha observata est. Vaccinam quarto die eruptam, septimo fugatam et decimo tertio reversam unus ex commilitonibus nostris ⁸²⁾ conspexit. Si prima insitio haud succedat ac ideo serius alio in loco instituatur et eum successu, vaccina ambobus comparet locis. Sic, si experimenti gratia, peracta una insitione, altera post biduum instituatur, vaccina nihilominus in utrisque inoculationis locis simul erumpit. Homines, qui variolas aut vaccinam jam perpassi sunt, ab eadem vel plane non afficiuntur, vel eam irregulariter experiuntur.

Observationes.

II. Quoties ortus, incrementum, acme et terminus vaccinae a curriculo descripto aberrant, toties de successu insitionis dubitandum est. De *spuria* enim vaccina testantur: praematura ad locum

Vaccina spuria.

⁸²⁾ PETRUS SOLTHIEWICZ.

cum insitionis, vel circum, inflammatio, irritatio, imprimis accidentibus pustulis, — progressus vesiculae nimis rapidi, — color liquidi contenti sive flavus, sive opacus, — textura vesiculae haud firma ac ipsa vesicula non rite circumscripta, ac centro elevato marginibusque depressis instructa, — facilis secessus et ruptura crustae, subsequente exulceratione, novaque crusta serpente, coloris subbrunei, fere ambrae simili. Generatur autem vaccina spuria: ab insitione ope materiei a spuria aut antiqua vaccina sub eschara desumptae, — a materia, tempore, calore aliisque e caussis corrupta, — ab insitione ope lanceolae rubiginosae, vel rudi nimis manu operata, — a laceratione vel et simplici compressione vesiculae nequidum absolutae ac normalem amittentis formam.

Observationes.

12. Character gentilitius vaccinae solummodo in tuberculo et vesicula jacet, — area ad constituendam vaccinam genuinam haud absolute requiritur, — nec febricula, quae aliquando inter septimum et undecimum diem per nonnullarum horarum spatium in conspectum venit, essentialis est. Vaccina tunc solum securitatem adversus variolas impertit, dum jam exsiccare incipit.

Insitionis opus.

13. Nil interest, quo anni tempore insitio vaccinae suscipiatur. Ad vitae periodum quod attinet, finem secundi aut initium tertii mensis eligimus, sic enim recens nato tempus, ut impressionibus externis assuescat, concedimus et epocham den-

dentitionis evitamus. Nisi coacti, infantes morbo aliquo detentos non inoculamus. Quotiescunque autem variolarum suscipiendarum periculum praesto est, insitionem ne per horae quidem momentum procrastinamus et sub quavis deterrima licet rerum positione suscipimus. Si fieri potest, infans vaccina instructus et optima sanitate gaudens et inprimis neque psora, neque syphilide, neque crusta lactea, neque plica laborans, ad vaccinandos adducitur, ut vaccina ex illo desumta his illico inseri possit. Una tantum pustula pro centum insitionibus et ultra materiam largitur. Optimum tempus vaccinae virus desumendi, *septimus* sive *octavus* ab insitione *dies* est, quamvis materies et paullo tardius, *nunquam vero facta jam area*, depromi liceat. Desumitur ipsa apice lanceolae vel acus sulcatae unice vaccinationis scopo dicatis, quo scilicet superficies vesiculae vaccinae nonnullis in locis perforatur. Perforata vesicula, tempus, quo materies exire possit, conceditur, ad quod opus promovendum, vesiculam superficie plana instrumenti vaccinatorii comprimere licet. Suscepta materies sub epidermidem personae inoculandae, inflicto levi nec cruento vulnuscule ac compressa parumper super apicem instrumenti cuncte, introducit. Nunquam autem materies sub eschara latens desumi debet. Plerumque brachium, quo loco musculus deltoides inseritur, eligi solet, quem vero locum in puellis, ob foedam

vac-

vaccinae cicatricem reprobamus et insitionem vel altius, vel ad internam crurum superficiem instituimus. Utplurimum haec ipsa securitatis caussa ad duo loca simul suscipitur, ad ambo scilicet brachia sive crura. Morem duas puncturas in uno eodemque latere instituendi ob id, quod areae facile confluant ac interdum erysipelati ansam porrigant, reprobamus. Vulnusculum ab insitione relictum nec emplastris, nec fasciis cooperiendum est; caveri enim solum debet, ne abortum tuberculum sive facta vesicula scalpendo aut laceretur aut alio pacto male tractetur. Si materies recens pro insitione de brachio ad brachium desideraretur, tunc antiqua debito modo collecta ac servata in usum ducitur. Optima vaccinae colligendae et servandae methodus ea est, duas sumere lamellas vitreas magnitudine pollicis quadrati, crassitiei trium vel quatuor linearum atque superficiei unius guttas nonnullas vaccinae imponere, aliamque lamellam illico apprime superimponere ac utrasque frustulo vesicae involvere et filo adstringere. Potest materies et cochleari parvo committi, manubrium illius medio epistomii firmari, atque ope hujus cylindrum vitreum longitudine nonnullorum pollicum, diametri circiter pollicis unius, claudi, ac externam epistomii superficiem cera obducere. Cera signatoria ob calorem, sine quo adhiberi nequit, evitanda est. Priusquam materies exsiccata in usum ducatur, aquae tepidae gutta, sive halitu humectari debet.

debet. Sunt qui pulverem crustarum vaccinae pro insitione idoneum censeant ⁸³⁾. Quacunque autem ratione vaccina inseratur, nulla ea indiget corporis praeparatione nulloque sive peculiari regimine sive medicamento. Sufficiat hinc talem praescribere vitae rationem, ne ob extraneas causas secunda laedatur valetudo, ac observationes circa curriculum vaccinae sedulo tabulis committere. Si pustula temere tractata in exulcerationem desideret aut erysipelas brachii super accederet, fomentum frigidum ex aqua et acetate plumbi adhibendum foret. Desideriis parentum satisfactori, nec non ut eruptiones cutis secundariae impediatur, infantibus absoluto vaccinae curriculo, lene praescribere solemus *purgans* ⁸⁴⁾. Quo pacto vaccinae beneficium propagandum sit, ut variolae tandem extirpentur, id ad *politiae medicae* pertinet forum. Collectio legum huc spectantium habetur apud Kopp ⁸⁵⁾. Donec usque vero leges huiusmodi generaliter recipiantur, infelix variolas curandi occasio saepius adhuc obveniet.

83) KOPPE Op. c. Jahrgang S. 275. — CLESIVS über die Vortheile der Schutzpocken, wenn man dieselbe im Schorfe einimpft. Hadamar 1812.

84) Ex calomel, rheo sive jalappa.

85) Op. c. 1. Jahrgang S. 326. — 2. Jahrg. S. 356. — 3. Jahrg. S. 273. — 4. Jahrg. S. 241.

§. LXX.

C u r a.

Regulae generales.

1. In omni variola puritati aëris et aegroti maxime studeri debet. Praeterea diu noctuque curandum est, ne aeger, inprimis sub stadio supurationis, pustulas scalpendo laceret atque ita cicatricibus nunquam delendis ansam porrigat. Ad hunc scopum consequendum manus invicem leniter ligari, aut saltem linteis circumdari solent. Tempore aestivo muscae ab aegrorum lecto linteo subtili, quod vulgo *gaze* vocatur, avertuntur. Maxime porro refert, feminis potissimum animum addere ac venustatis conservationem promittere.

C. v. simplicium.

2. *Variolae simplices* quidem secundum regulas generales curantur, at magis quam in aliis exanthematibus, praesertim sub invasionis stadio, aura frigidiuscula, inter 12 et 14 gradum thermometri R. admittenda. Donec igitur variolae prorumpant, aegrotus a lecto diu arcendus est, ludisque aetati propriis, libero sub coelo, si anni tempus faveat, alias in amplo sanoque cubili, recreandus. Quo vero tempore variolae efflorescunt, rite monente HUFELANDIO ⁸⁶⁾, methodo refrigeratariae, evolutioni variolarum apud debiliores obstanti, limites ponendae sunt, unde aeger vespertino inprimis tempore lectulo maturius committendus,

86) L. c. S. 67. 68.

duſ, nec tamen ſtragulis obruendus eſt. Abſolute ſuppurationis ſtadio, imprimis ſi plures vario-
lae cutim deſoedaverint, lene exhibetur purgans,
quod vel peracta exſiccatione a nonnullis re-
petitur.

3. Si viſ morbi aegrotum, *variolis inflamma-* C.v.inflam-
toriis detentum, extra lectum verſari non concedat, matoria-
rur.
tunc idem erecto corpore, capite nudato, mini-
meque tegumentis obruto, ſedeat. *Venae ſectio*
teſtantibus FREIND ⁸⁷⁾, ELLER ⁸⁸⁾, TRALLES ⁸⁹⁾,
CULLEN ⁹⁰⁾, J. P. FRANK ⁹¹⁾, FERRO ⁹²⁾ et noſtra
experientia potiffime indicatur: ſi fuerint pulſus
pleni, celeres, ac duri, reſpiratio cita, laborioſa,
facies rubra ac valde tumescens, oculi turgescen-
tes, rubicundi, calor ardens, aut viſcera inflam-
mata. Tantum hic abeſt, ut eruptionis opus a
venae ſectione impediatur, quod nullum iſtâ tu-
tius ad evolvendas variolas ac ad moderandum pu-
ſtularum numerum habeatur remedium. Infanti-
bus, loco venae ſectionis, *hirudines* in viciniis
organorum praecipue affectorum ponuntur. Ubi
erumpentes circa quartum diem variolae caput
affi-

87) Hist. med.

88) L. c. p. 141.

89) *Das Aderlaſſen, als ein oftmal unentbehrliches Mittel
zu einer Blatterkur.* Breslau 1736.

90) L. c. p. 618.

91) L. c. p. 197.

92) Ephemer. med. p. 210.

afficiebant, praesentibus simul calore magno, anxietate ac subsultibus tendinum, cum summo levamine scapulas *scarificari* jussit BAGLIVIVS ⁹³). Nec stadium suppurationis, ubi inquietudo et febris magna adsint, ac suffocatio timeatur, sanguinis missionem excludit ⁹⁴). *Lenia purgantia* sub ipso invasionis stadio commendata, inprimis incipiente in facie exsiccatione suppressaque salivatione, subsedente simul sub augmento febris faciei manuumque tumore, conducunt. Magni vero momenti observatio FR. HOFFMANNI ⁹⁵) est, *nitratem potassae* variolarum stadio suppurationis haud quadrare, ac diuresin cum detrimento movere. *Opii* in variolis inflammatoriis usus multis controversiis locum dedit, ex quibus duce propria experientia colligimus; hoc remedium neque in mitiori morbo ⁹⁶), neque ab initio morbi ⁹⁷) adhiberi posse; inprimis autem indicari a summo dolore ex cute admodum sensili, undique pustulis obsita, ac tensa, — ab irritatione totius systematis nervosi cum summa inquietudine, — a diarrhoea evidenter vires exhauriente et a pulsu magis magisque concidente. Dosis, aetati, constitutioni

ni

93) Prax. med. p. 61.

94) SYDENHAM de febre putrida variolis confluentibus superveniente.

95) Opusc. med. pract.

96) SWIETEN l. c. p. 110.

97) STÖRK an. med. T. II. p. 153.

ni aegri accommodata, optime cum *ipecacuanha* ad vespervas porrigitur. Si febris et sudores inde augeantur, aut salivatio et alvus cohibeantur, mox *clysteribus* et *sero lactis* cum *pulpā amycae indicæ* occurrendum est. Quid *mercurius* hic valeat, nunquam experti sumus. Devicto plane impetu inflammatorio *vesicatoria* ab HUXHAM⁹⁸⁾, MACBRIDE⁹⁹⁾, POTT¹⁰⁰⁾, CULLEN¹⁾, PERCIVAL²⁾ aliisque, imprimis si faciei tumor et ptyalismus evanescent, quin manus et pedes intumescere incipiant, commendantur; at raro cutim jam nimis ulcusculis obsessam novis irritamentis excruciare licet.

4. Curam *variolarum gastricarum* secundum C.v.gastricarum, praecepta generalia absolventes, CULLENIO, vomitorium indiscriminatum suadenti³⁾ non adstupulamur, ac potius consilia QUARINII⁴⁾ et SELLI⁵⁾ monentium, absentibus certis indiciis saburrarum emeticum non convenire, licet nausea et

98) *Philosoph. Transact.* No. 390.

99) *L. c.* p. 369.

100) *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte.* 2. B. 28 St. S. 119.

1) *L. c.* §. 626.

2) *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte.* 3. B. 28 St. S. 119. 143.

3) *L. c.* §. 619.

4) *L. c.* p. 120.

5) *L. c.* p. 105.

et vomitus aegrotum vexent, sequenda esse censemus. Verminosa complicatio, *anthelminthica* ⁶⁾ absolute requirit, inter quae absente diarrhoea, praeter *calomel*, *tartritidem stibii* et *potassae*, experientia freti, locamus.

C. v. typhodum.

5. *Variolae* jam sub stadio invasionis *typhodes*, teporem lecti, *infusum croci sativi* ⁷⁾, vinum calidum, atque sub fortiori extremitatum frigore, tum frictiones tum fomentationes sive siccas aromaticas, sive cum vino calido exposcunt. Cunctante eruptione variolarum post quartum diem, *balneo tepido* locus est ⁸⁾. Quodsi variolae vix prodeant, colorem lividum, cinereum assumant et vix in pustulam assurgant, ad *camphoram* per os, per anum, ac extus ⁹⁾ adhibendam, consilio L. C. HOFFMANN ¹⁰⁾, FERRO ¹¹⁾ et HUFELAND ¹²⁾ confugiendum est. Sub tremoribus cum pulsu

6) HUFELAND *Neueste Annalen der franz. Heilkunde*. 3. B. S. 139. — SCHLEGEL in HUFELAND's *Journal der prakt. Heilk.* 9. B. 18 St. S. 96.

7) SWIETEN op. c. Vol. V. p. 70. — HUXHAM l. c. T. II. p. 133. — AEPLI *von den böartigen Fiebern*.

8) DE MEZA l. c. p. 74.

9) Solvitur uncia semis camphorae in duobus vitellis ovorum, vel in mucilagine gummi arabici, atque hac solutione imbuitur pannus, quo corpus aegri involvi debet.

10) *Vermischte Schriften*. 1. Th. No. 4.

11) L. c. S. 213.

12) L. c. p. 111.

pulsu exili sed duro, inaequali *moschus* indicatur. Sub stadio suppurationis *cortex cinchonae officinalis* sub forma tum *decocti saturati*, tum *extra-cti* ¹³⁾, suffragia SYDENHAMI ¹⁴⁾, HUXHAMI ¹⁵⁾, HILLARY ¹⁶⁾, WINTRINGHAM ¹⁷⁾, RAHNII ¹⁸⁾, WALLII ¹⁹⁾, jure collegit. Quae ad stadium exsiccationis perducuntur variolae malignae, hae febris typhodis jam deposuerunt indolem.

6. *Convulsiones*, in variolis simplicibus et in-^{C Sympto-}
^{matum.}flammatoriis, exposito aegrotulo aurae frigidae, —
 in typhodibus, exhibito, consilio HUFELANDI ²⁰⁾ et
 WENDTII ²¹⁾, *oxydo zinci* ²²⁾, vel *opio*, vel *succi-*
nate

13) Pro adulto: R. Extracto corticis peruviani drachmas duas. Aquae florum sambuci uncias decem. Syrupi Croci unciam unam. M.

14) Op. c. p. 167. 359.

15) L. c. T. II. p. 59.

16) L. c. c. 9.

17) Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte. 8. B. 13 St. S. 366.

18) L. c. p. 376.

19) Philosoph. Transact. Vol. 44. p. 533.

20) L. c. S. 122.

21) PLINTA Diss. histor. epidem. variol. Erlangae a. 1790. Jun. 1792. Erlangae.

22) FLORES ZINCI pro puero unius triumque annorum — ad grana duo — a tertio aetatis anno usque ad decimum — ad grana quatuor — secunda quaque hora exhibentur.

nate ammoniae empyreumatico²³⁾ debellantur. — Deleteriam diarrhoeam lac vaccinum²⁴⁾, vesicatorium regioni hepatis impositum²⁵⁾ ac opium, vel ad sedandum vomitum usurpatum²⁶⁾, compescunt. — Haemorrhagiae nisi effraenae, in variolis simplicibus et inflammatoriis haud cohibendae sunt; econtra in typhodibus tum auxilia topica alibi tradenda, tum interna e. c. aqua lauri cinamomi, tinctura acidi sulphurici aromatica, sulphas aluminis et potassae²⁷⁾, non neglecta cinchona, sine mora praescribi debent. — Ad impediendam palpebrarum concretioem lotio quotidiana oculorum ope lintei, aqua tepida et lacte madidi²⁸⁾, fomenta mollissima palpebrarum, ac injectio aquae tepidae inter palpebrarum commissu-

23) Pro infante quatuor annorum. R. Aquae florum sambuci uncias tres. Spiritus cornu cervi succinati scrupulum semis. Syrupi croci unciam unam. M.

24) LASSONE l. c. p. 84. 96. Lac cum infuso petroselinii miscetur.

25) TRILLER Comment. de pleuritide. §. 5.

26) DRUMMOND apud DUNCAN (med. comment. Dec. 2. Vol. 4. p. 47) et HENNIG de tempestivo opii usu in variolis curandis. Lips. 1791.

27) MEAD Op. de variolis p. 37. — WALL l. c. p. 683. R. Infusi rosarum rubrarum libram unam. Aluminis scrupulos duos. Syrupi Alkermes unciam unam. M.

28) ROSENSTEIN l. c.

missuras siphone tenuissimo peracta ²⁹⁾, fatus ex lacte et pauxillo mucilaginis seminum cydoniorum ³⁰⁾, aliaque ³¹⁾ commendata fuere; verum rite monentibus LUDWIG ³²⁾ et NICOLAI ³³⁾ optime res naturae committitur. Urgente ex suppressa salivatione, vel ex muco spisso fauces opplente, *suffocationis periculo*, sub morbo inflammatorio, *venae sectio* et *hirudines* circa collum, alias *vesicatorium* sub mento ³⁴⁾, *injectiones ex infuso salviae sive sambuci cum melle* ³⁵⁾, *vomitorium* ³⁶⁾, parvae *antimonialium* doses ³⁷⁾ et situs aegri pro effluxu salivae idoneus, juvant. Maligna *faucium ulcera*, *acido muriatico* et *melle* curantur. Ad variolas a facie avertendas multa plus minusve inania auxilia proposita fuere, *emplastrum* scilicet tum *Vigonis* ³⁸⁾, tum *mercuriale* ³⁹⁾ ad faciem ob-

tegen-

29) SWIETEN l. c.

30) STÖRK l. c. p. 160.

31) BEER *kurze Anweisung der zweckmässigen Behandlung der Augen während der Blatter-Krankheit*. Wien 1800.

32) L. c.

33) *Pathologie*. 2. B. S. 299.

34) CULLEN l. c. §. 626. — PERCIVAL l. c. p. 119.

35) TISSOT *Avis au peuple* §. 214.

36) ACKENSIDE *Abhandlung. d. Lond. Aerzte*. 1. B. S. 30.

37) QUARIN l. c. p. 125.

38) ZIMMERMANN *von der Erfahrung*. 2. Th. p. 44.

39) ROSENSTEIN l. c. p. 45.

tegendam, unctio abdominis cum *balsamo embryonis* ⁴⁰⁾, punctura pedum acu ⁴¹⁾, lotio frigida faciei et *pediluvia* ⁴²⁾, — *vesicatorium* ⁴³⁾, sive radix *allii* ⁴⁴⁾ ad pedum plantas etc. — Dum variolae praeter modum turgent, ut resorptio puris et erosio cutis praepediantur, eae tuto et sine periculo majorum cicatricum, ut nonnulli crediderunt ⁴⁵⁾, ope lanceolae, ad apicem aperiri queunt, cui methodo inprimis SWIETEN ⁴⁶⁾, TISSOT ⁴⁷⁾, ROSENSTEIN ⁴⁸⁾, STOLL ⁴⁹⁾, J. P. FRANK ⁵⁰⁾ jure favent. *Crustarum* rebellium secessus per *fomenta emollientia* ⁵¹⁾ et *balnea tepida* optime promovetur. *Exulcerationes cutis* vix unguentis ⁵²⁾, sed

40) Praelectiones in dispensatorium Brandenburg. p. 53.

41) SCHULZER l. c.

42) HUXHAM. MACBRIDE.

43) CLOSSIUS l. c.

44) SYDENHAM in epistola ad GUGLIELMUM CELE p. 459.

45) MEZÄ l. c. p. 75. — LUDWIG l. c.

46) L. c.

47) L. c. §. 216.

48) L. c. p. 157.

49) L. c. p. 233.

50) L. c. p. 203.

51) STÖRK l. c. p. 189. — QUARIN l. c. p. 127. —
RAHN l. c. p. 379. — ROSENSTEIN l. c. p. 155.

52) BATTIE commendavit: R. Olei amygdalarum uncias duas. Spermatidis ceti drachmas tres. Olei destillati Rhodii guttas quatuor. M.

sed natura, illinito hinc inde lactis cremore ⁵³⁾ sanantur.

7. In *convalescentia* variolarum non solum C. convalescentiae et reliquiarum. transpirationi sed et urinae excretioni, uti in scarlatina, studendum est. Subintrante hoc tempore febre inflammatoria, regimen antiphlogisticum et si opus fuerit, ipsa venae sectio ⁵⁴⁾ indicantur. Catharticorum usum quidem hic BROCKLESBY vituperat ⁵⁵⁾, at cum SWIETENIO ⁵⁶⁾ fate-mur, horum remediorum ope hebetudines cortici rebelles auferri. Solum purgatis primis viis huic remedio, nec non *decocto glandium quercus roboris tostorum*, aliisque tonicis cum diaeta lactea, locus est. Nisui ad *metastases decoctum radices smilacis sarsaparillae, ligni quajaci officinalis, balnea tepida, ulcera artificialia* opponuntur. Morbi ex variolis orti, de quibus pulchre BALDINGER ⁵⁷⁾, BÜCHNER ⁵⁸⁾, LUDWIG ⁵⁹⁾ et NICOLAI ⁶⁰⁾ scripserunt, secundum variam eorum se-

X 2 dem

53) VOGEL l. c.

54) HAEN rat. med. T. 3. cap. 2. §. XI. N. 5. p. 87.

55) L. c. p. 241.

56) L. c. §. 1402. p. 127.

57) In praefatione ad TISSOTI et ROSENSTEINII tract. cit. p. 35.

58) De reliquiis variolarum tam praepediendis, quam curandis.

59) De crisis variolarum accessoriis.

60) L. c. p. 317.

dem et indolem, praeceptis debitis locis tradendis
curantur.

CAP. XV.

De Varicella.

§. LXXI.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. *Exanthema* primum, diversis variolarum
formis simillimum, in genere vero levius ac bre-
vius curriculum suum absolvens, *varicella* ⁶¹⁾ di-
citur.

Historia. 2. Varicellae, forte veteribus notae ⁶²⁾, do-
ctrina potissime SWIETENIO ⁶³⁾, HEBERDENIO ⁶⁴⁾,
VOGE-

⁶¹⁾ *Synonyma.* Variolae spuriae, pemphigus variolodes.
GERMAN. Windpocken. Hünerpocken. GALL. La peti-
te vérole volante, vérolette. ANGL. The chicken-pox,
the swin-pox. ITAL. Ravaglio. Morbiglione. Vajuolo
selvatico. ROSS. Вѣпренная оспа. POLON. Wietrz-
na ospo.

⁶²⁾ WERLHOFF op. c.

⁶³⁾ Comment. T. IV. p. 10.

⁶⁴⁾ Abhandl. der Lond. Aerzte. 1. B.

VOGELIO ⁶⁵), WILLANO ⁶⁶), ODIERIO ⁶⁷) et HEIMIO ⁶⁸) debetur.

§. LXXII.

Symptomata. Caussae.

1. Infantes ante morbi ingressum morosi et Sympto-
 irrequieti fiunt; sunt tamen, qui extemplo corri-
 manta.
 piantur. Aegritudo cum levi horrore, cui calor,
 rubor oculorum, dolores ventriculi et lumborum,
 interdum nausea ipseque vomitus subsequuntur,
 incipit. Secunda a febre die, exanthema erumpit
 nunc primum in dorso, nunc in facie, nunc utris-
 que in locis simul. Brevi post illud universum
 plus minus corpus, nec parte capillata capitis, nec
 genitalibus semper exceptis, occupat. Vel ad
 ipsum oris cavum varicellam HEIM vidit. Per-
 acta eruptione, saepe pruritu stipata, febris vel
 illico cessat, vel sensim sensimque, nunquam re-
 ditura, declinat. Neque exempla, ubi eruptio si-
 ne praevia febre locum invenit, desiderantur. *Var-*
icella normalis pustulam refert pisi magnitudi-
 ne, halone rubro jam ab initio circumdatam, se-
 ro sive limpido sive subalbido repletum ac fovea
 in medio instructam. Haec pustula citissime ad
 duplex volumen crescere, maturitatem adipisci ac
 in

65) De cognosc. corpor. human. affect.

66) Op. c. (cap. nostro praecedent).

67) Op. c. p. 102.

68) HORN's *Archiv für medic. Erfahrung.*

in crustam desinere solet, ita ut totus morbus spatium unius hebdomadis, aut citius terminetur, quamvis vel longioris curriculum non desint exempla. In genere haec exanthematis forma irregulariter decurrit, ac saepe uno eodemque tempore pustulae nonnullae in conspectum veniunt, aliae jam suppurantur, exulcerantur, aliaeque crustis obteguntur, relictis tandem foveis candidis, mollibus, levibus, plerumque regularibus, nec pilos, nec puncta exhibentibus ⁶⁹⁾. Praeterea duae dantur varicellae abnormitates, *varicella* scilicet *solidescens* et *V. emphysematica*. Illa sub forma papularum sive tuberculorum ovalium, durorum, obscure rubentium, comparet ac desquamatione, hinc inde crustula, terminatur. Haec pustulam exhibet, seri loco, aërem continentem, qua disrupta, cutis secedit, relicta excoriatione, crusta squamosa, obtegenda.

Caussae. 2. Causa varicellae contagium est, variolosi forte digressio ⁷⁰⁾, saepe saltem cum eo societatem iniens, facillime invadens ⁷¹⁾, cui vaccina non obstat.

69) Alias gentilitias proprietates, a me necdum confirmatas, in medium affert HEIM l. c. p. 200.

70) NIEDL Diss. variolarum spuriarum ex verarum pure ortus. Halae 1792.

71) HEIM l. c. p. 203.

§. LXXIII.

D i a g n o s i s.

1. *Varicella* cum bullis, cum variolis et cum psydracia confundi potest. Facilis confusio.

2. *Bullae.*

- a. Februm plerumque typhodum sistunt symptoma.
- b. Absque certis prodromis nulla determinata die erumpunt.
- c. Dolor urens in parte, eruptionem praecedit.
- d. Etiam si ab initio pisi sint magnitudine, attamen cito amygdalarum volumen adipiscuntur.
- e. Saepissime sola crura occupant.

Varicella.

Distinctio a bullis.

- a. Levissima febre stipari solent.
- b. Eruptio propriis prodromis plerumque nuntiatur, ac secunda morbi die contingit.
- c. Nullus ante eruptionem dolor.
- d. Volumen rarissime pisi duplex acquirunt.
- e. Plerumque univsum corpus detinent.

3. Distinctio *variolae* a *varicella* non adeo ardua est ac vulgo creditur, cum illa solum in casu malignitatis ad *varicellae* sive curriculum sive figuram accedat, haec autem constanter morbum benignum referat. Distinctio a variolis.

Variola

Variola benigna.

- a. Circa quartum diem efflorescit.
- b. Stadia sua regulariter per universum corpus decurrit.
- c. Halo ruber circa pustulas tantummodo versus stadium suppurationis comparet.
- d. Odore specifico instruitur.
- e. Febris suppuratoria committatur.
- f. Nulla ante nonum diem exsiccatio obvenit.
- g. Foveae plerumque cuti concolores, inaequales, saepe punctis nigris notatae sunt.

Varicella.

- a. Secundo die erumpit.
- b. Quo tempore novae pustulae adhuc erumpunt, aliae jam suppurant, aliaeque crusta obteguntur.
- c. Halo ruber mox facta eruptione occurrit.
- d. Odor specificus non animadvertitur.
- e. Febris suppuratoria nulla.
- f. Jam quinto sive septimo die exsiccatur.
- g. Foveae candidae, plerumque regulares, sine punctis.

§. LXXIV.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Varicella omni periculo destituitur. Rarissime

sime ea, vel facta insertione ⁷²⁾, plus vice simplici recurrit ⁷³⁾.

2. Curatur varicella instar exanthematum simplicium ⁷⁴⁾. Cura.

CAP. XVI.

De Vitiligine.

§. LXXV.

Definitio. Formae. Causae.

1. *Vitiligo* ⁷⁵⁾ est macula sive alba sive nigra ple- Definitio.
rumque cum cutis in parte depressione laesaque
plus minus illius functione.

2. *Vitiligo alba* ⁷⁶⁾ maculam, sive potius con- V. alba.
geriem macularum, hinc inde planarum aut pa-
rumper elevatarum, ut plurimum plus minus depres-
sarum, coloris nivei sive lactei, exhibet. Macu-
lae

⁷²⁾ HEBERDEN l. c. p. 333.

⁷³⁾ Ter perpressae varicellae exemplum HEIM refert l. c.
p. 202.

⁷⁴⁾ Cap. I. §. VI. 8.

⁷⁵⁾ Nomen vitiliginis a *vitio* derivatum videtur. (RU-
DOLPH VOGEL diss. de vitiligine. Goetting. 1764).

⁷⁶⁾ Ἀλφὸς λευκὸς GRAEC. — Vitiligo alba mitior. Mor-
phaea. Morphaea alba. Altesa alba ARAB. — GERM.
Mehlstellen.

lae hujusmodi magnitudinis nunc pollicis et ultra, nunc nonnullarum linearum, vel instar guttularum in cute dispersarum, cernuntur. Superficies earum plerumque levis, rarius aspera, aliquando pilis vel normalibus vel lanuginosis obsessa est.

V. nigra. 3. *Vitiligo nigra* ⁷⁷⁾ maculas nigrescentes, ejusdem ac vitiligo alba magnitudinis, nunc levigatas, nunc subasperas, interdum serpentes refert.

Caussac. 4. Quidquid cellulosa[m] telam sub cute delere, destruere ac pellem arctius cum carne aut ossibus connectere, aut naturalem hujus involucri contextum in se ipsum contrahere et sanguinis nervorumque influxu plus minus privare potest; hoc vitiliginis ad causas pertinet. Hujusmodi sunt: vitium haereditarium, congenitum, leprosum, — suppurationes ex praeviis inflammationibus, exanthematibus, impetiginibus, — et distensiones validae cutis e. c. ad abdomen a graviditate, ab ascite, a pinguedine dispulsis.

Mehlflecken. Ross. Вѣшреница. Polon. *Ostuda*, *Osutka*.

77) Ἰαλφός μελας. GRAEC. — Vitiligo nigra. Melmas *Celsi*. Morphaea nigra *Ebn Sina*. — GERM. Das dunkle Mal.

§. LXXVI.

D i a g n o s i s.

1. Vitiligo utpote *macula*, tum ab *universali* Facilis confusio.
cutis candore albinis proprio, tum a nigredine
aethiopum, tum a palloribus ex animi pathemati-
bus, ex lipothymiis, ex chlorosi, et ex jactura
sanguinis distinguì debet.

2. Vitiligo habita ratione originis dividitur in Divisio.
V. naevum, in *V. leprosam*, in *V. cicatricem* et
in *V. matrum*, *hydropicorum* et *obesorum*.

3. *Vitiligo naevus* sub forma nunc alba, nunc *V. naevus*.
nigra comparet, quo ultimo in casu *macula* sae-
pe elevata ac pilis obsessa cernitur ⁷⁸⁾. Vitiligo
naevus alba in vetula obveniens et acu perfossa
nec sanguinem fundens nec dolens, tempore, quo
fides sagis tribuebatur, pro certissimo maleficii in-
dicio haberi solebat.

4. Memorata autem ultimo loco duo signa, si- *V. leprosa*.
mul cum squamulis partem affectam saepe obsiden-
tibus, characteres gentilitios *vitiliginis leprosa*,
nunc congenitae, nunc acquisitae, constituunt.

5. *Vitiligo cicatrix*, uti relate ad variolas et *V. cicatrix*.
varicellam docuimus et relate ad ulcera scrophulo-
sa, cancrrosa et venerea adhuc docebimus, pro va-
ria sua origine varias exhibet qualitates necdum sa-
tis a medicis enucleatas.

6. *Vi-*

78) Naevus tuberculosus. GERMAN. *Mäusemal*, *Rau-
penmal*.

V.matrum

6. *Vitiligo matrum, hydropicorum et obeso-
rum* solummodo cutis formositatem laedit, atque
ob id memorabilis est, quod primo in casu inter
indicia plus minus secura praegressi ac forte occul-
tati partus pertineat.

§. LXXVII.

Prognosis. Cura.

Prognosis.

1. *Vitiligo naevus* curam neque exposcit, ne-
que facile admittit. *V. leprosa* vicissim evanescit
reditque, donec tandem in absolutam, quam prae-
sagit, lepram transeat. Reliquae vitiliginis species
omni quidem periculo destituuntur, at ob defoe-
dationem cutis, cuncta auxilia fere respuentem,
admodum molestae evadunt.

Cura.

2. Ipsa haec artis impotentia necessitatem in
morbis ad cicatrices proclivibus, omnem curam ad
eas praepediendas adhibendi, patefacit, cujus rei
vel in ipsa vesicatoriorum applicatione, praecipue
in feminis, nos memores esse oportet. Contra jam
praesentem vitiliginem experiri possunt: nunc
oleum, balneum animale, fots emolliens, vapo-
res ex aceto et aqua, — nunc blanda et frequens
cutis collapsae agitatio, sublevatio, dilatatio, —
nunc aliqua in parte sana, circa maculam com-
pressio, — nunc sicca huic ipsi hinc inde ap-
posita cucurbitula, aut frictio et quae va-

Adhibenda sunt etiam vesicatoria et caustica.

orum nervorumque hoc in loco vitam exci-
tent 79).

CAP. XVII.

De Lentigine.

§. LXXVIII.

Definitio. Causae.

Maculae diuturnae, forma, colore et magni-
tudine plus minus lentibus similes, *lentiginis* nomen
obtinuerunt. Definitio.

2. Lentigo nunc sistit vitium congenitum, le- Causae.
prosum, nunc effectum ignis et solis, inprimis
vernalis. Cutis tenera candidaque praecipue hac
ultima a causa afficitur, ac lentigines hic nil
aliud, quam cruoris guttulae e vasis capillaribus
per morbosam secretionem elicited, muco et adipe
dilutae, et in rete malpighianum depositae esse
videntur. Actio solis in cutem, vel a praevia la-
vatione, vel a sudore madidam, major est, atque
lentigines hoc in casu cum maculis foliorum et
fructuum ex actione radiorum solarium imbri im-
mediate succedentium ac in focum inde collecto-
rum, convenire videntur. Ignis actio cum ea so-
lis convenit.

§. LXXIX.

§. LXXIX.

D i a g n o s i s.

Divisio. 1. Lentigo in *L. naevum*, in *L. leprosam*, in *L. aestivam* et in *L. ab igne* dividitur.

L. naevus. 2. *Lentigo naevus* sive *naevus lenticularis* maculam refert solitariam, ad faciem, potissime circa labia, ad collum, mammas, ventrem, coxas, inprimis prope genitalia nec non ad extremitates sedem figentem, saepe nigri potius quam fuscii coloris.

L. leprosa. 3. *Lentigo leprosa* ⁸⁰⁾ profunde in cute sedem habet, sensu orbata est et futuram lepram saepe diu annuntiat.

L. aestiva. 4. *Lentigo aestiva* sive *ephelis* ⁸¹⁾ maculas sistit parvas, perfecte lenticulares, flavescentes vel rufescentes, potissime obvias in facie (inprimis ad latera nasi), in pectore, in manibus, aliisque in partibus non tectis.

L. ab igne. 5. *Lentigo ab igne* ⁸²⁾ ad tibias et femora praecipue in adultis prope nimis camino sedentibus, vel in feminis, carbone accensos sub forma macularum saepe prominentium, coloris e fusco flavescentis, obvenit.

6. *Pe-*

80) *Bahak* MOSIS. — *Barash* ARAB.

81) A GRAEC. Ἐφελίς. *Synon.* *Ephelis* lentigo, lenticulae solares. GERMAN. *Sommerflecken*, *Sommersprossen*. GALL. *Lentilles*, *taches de rousseur*. ANGL. *Freckles*. ROSS. *Bechyshka*, POLON. *Piegi*. ALBERT op. c. Tab. XXVI.

82) GALL. *Taches de brûlure*.

6. *Peticulas cum lentigine aestiva confundi* ^{Distinctio a peticulis,} posse, jam monuimus ⁸³⁾. Differunt sequentibus notis:

Peticulae.

- a. Omni anni tempore obveniunt.
- b. Nulli cutis conditioni parcent.
- c. Raro in facie animadvertuntur.
- d. Aeque modo partes tectas et non tectas detinent.

Lentigo aestiva.

- a. Vere et aestate potissime occurrit.
- b. Cutim teneram et candidam eligit.
- c. Praecipue faciem occupat.
- d. Inprimis partes non tectas afficit.

Notandum autem est, *peticulas societatem cum lentigine aestiva inire posse.*

§. LXXX.

Prognosis. Cura.

1. *Lentigo naevus*, quodammodo formositati ^{Prognosis.} quid addens, nullam auxilium admittit. *L. leprodes*, utpote terribilis morbi praesagium, in servorum emptione maximi olim fiebat momenti. *L. aestiva* adventante hyeme sponte evanescit aut multum saltem imminuitur. *L. ab igne* foedam, vix delendam sistit maculam.

2. *Lentigo aestiva* praepeditur: partes soli ^{Cura.} expositas velo tenuissimo et cribriformi (gaze) albo sive viridi involvendo, actionemque solis vix per-

83) Cap. II. §. X. 1.

peracta faciei sive brachiorum lotura evitando. Praesentes lentigines, prout cutis peculiaris sensibilitas melius id fert, variis remediis curantur. Huc pertinent: *succus fructus citri medicae*, *acetum destillatum*, *infusio radicis raphani rustici in aceto*, *acidum muriaticum superoxygenatum* ⁸⁴⁾, *solutio sulphatis zinci* ⁸⁵⁾, lac, ut dicunt, *virginum* ⁸⁶⁾ sive *sulphuris* ⁸⁷⁾, *subcarbonas potassae liquidus* ⁸⁸⁾, *fel bovis domestici* sive purum, sive *subcarbonate potassae liquidae junctum* ⁸⁹⁾ aliaque ⁹⁰⁾.

84) R. Aquae rosarum rubrarum uncias sex. Acidi muriatici oxygenati guttas duodecim. M. Augeatur sensim sensimque dosis acidi.

85) R. Aquae fragariae vescae uncias sex. Vitrioli zinci grana quindecim. M.

86) Cap. I. §. VI. 4. (1).

87) R. Aquae rosarum uncias sex; lactis sulphuris unciam semis. M. D. S. usui externo.

88) Oleum tartari per deliquium.

89) Unguentum inde emergens vespere applicatur ac altero mane ope aquae tepidae et saponis abluitur.

90) QUINTUS SERENUS sequentia proposuit (de medicina c. de cutis faciei vitiis propellendis).

„Invida si maculet faciem *lentigo* decoram,

„Nec prodesse valent naturae dona benignae,

„*Erucam*, atque acidum laticem simul illine malis,

„Proderit et bulbus mellis dulcedine victus,

„*Crudave dulcacido* miscebis rapa liquori.“

CAP. XVIII.

De Chloasmate.

§. LXXXI.

Definitio. Causae.

1. *Chloasma* ⁹¹⁾ in maculis, palmae circiter magnitudinis, ex flavo viridescentibus, saepissime planis, interdum subasperis, pruritu fere semper destitutis, consistit. Definitio.

2. *Causae* chloasmatis sunt: graviditas, Causae. retentio menstruorum, hysteria, suppressio haemorrhoidum, vitia hepatis, lienis, hypochondriasis, labes scorbutica, carcinematica, haemorrhagiae repetitae, imprimis pneumonorrhagiae, lues venerea et abusus fuci, praesertim metallici. *Causa* proxima tum in bile, tum in sanguine sub epidermide effusis ac mucro et adipe mixtis, quaerenda est.

91) A GRAEC. Χλόαζω, χλόασμα, vireo, viridis sum. Ephelis CELSI, macula hepatica SENNERTI. Vitiligo hepatica SAUVAGES. Kelis fulvescens SWEDIAUER. GERM. Leberflecken. GALL. Taches hépatiques. ANGL. Tawny blotches. Ross. Желтое пашно. POLON. Podlice.

est. Cruoris effusioni nunc plethora cutanea, nunc vasorum capillarium atonia saepe scorbutica, nunc secretio morbosa, peculiaris forte systematis nervosi effectus, ansam porrigere videtur.

§. LXXXII.

Diagnosis.

Divisio. 1. Dividitur *chloasma* (cum alio morbo haud facile confundendum) in *ch. gravidarum*, in *ch. ex cachexia* et in *ch. ex fuco*.

Ch. gravidarum.

2. *Chloasma gravidarum*, certissimum saepe conceptionis, quin immo delitescens in nonnullis masculi, in aliis feminei foetus signum sistit⁹²⁾. Planum ac pruritu destitutum frontem inprimis occupare solet. Et recens nati, praecipue sub zona torrida⁹³⁾, speciei *chloasmatis* subjiciuntur.

Ch. ex cachexia.

3. *Chloasma ex cachexia*, aut rectius, ex vitio totius corporis, pro varia rerum positione, varia exhibet phaenomena. Latente *amenorrhoea*, maculae planae haud prurientes, inprimis frontem, genas, mammas, nucham et dorsum detinere solent. In *hystericis*, eae ad faciem, potissime post graves cephalagias, anis advertuntur. *Haemorrhoides suppressae* *chloasma* plerumque pruriens, variis in partibus largiuntur. *Vitia chronica hepatis*, *scirrhus ventriculi*, maculis amplissimis, sub-

92) HIPPOC. opp. p. 677. — RIEDLIN lin. med. 1695. p. 393. — J. P. FRANK, Epit. l. c. p. 87.

93) SWEDIAUER op. c. Vol. II. p. 759.

subasperis, prurientibus, ex flavo viridescentibus, herpeti affinibus, pectus, inguina, et crura occupantibus, ansam porrigunt. Item *morbi lienis* et *hypochondriasis*. *Chloasma scorbuticum*, foetens, colorem ex atro viridescentem refert⁹⁴) atque ex praevis ecchymomatibus saepe originem ducit. Sat simile est chloasma post *haemorrhagias*. Ex *lue venerea* eadem impetigo, maculas plerumque reticulares, ex flavo viridescentes, saepe cupreas, ad frontem, pectus, praecipue vero ad internam brachiorum sive crurum superficiem, sub umbra et post lotionem magis obvias, vix prurientes, exhibet. Maculae hae interdum per solum attactum contagiosae sunt⁹⁵). *Chloasma ex fuco* ad genas et frontem sub forma macularum obscure flavescentium sive viridescantium, minime prurientium, comparet.

§. LXXIII.

Prognosis. Cura.

1. *Chloasma gravidarum*, per repetitas con-*Prognosis.*
ceptiones aliquando perpetuum evadens, in genere excluso foetu et interdum sub media graviditate sponte secedit. Quod *ex vitio totius corporis* pul-
lulat

Y 2

94) ALIBERT. op. c. Tab. XXVII.

95) Nosco virum chloasmate, luis residuo, laborantem, qui sanae uxori, sine alio venereo indicio, eandem impetiginem communicavit.

lulat chloasma, hoc morbi primarii, cujus cum augmento nonnunquam evanescit ⁹⁶⁾, sequitur prognosin. *Ch. ex fuco* indelebile saepe sistit praepostere quaesitae elegantiae praemium.

Cura.

2 *Gravidarum chloasmati* nullum opponimus auxilium. Hac impetigine *e vitio totius corporis* emergente, pro re nata ac habita semper ratione transpirationis et urinarum, ad usum internum *aquarum ferruginosarum*, ad *nervina*, ad *hirudines* ano applicandas, ad *resolventia* inprimis ad *aquas minerales* aut *saponaceas*, aut *salinas*, ad *amara*, ad *antiscorbutica*, ad *tonica* et ad *antisymphilitica* confugiendum est. Auxilia hujusmodi sensim sensimque remediis topicis, in *chl. ex fuco* solis adhibendis, sustentur. Huc pertinent: remedia adversus lentigines commendata, porro *balnea marina*, *fluviatilia*, *linimentum* sive *camphoratum* ⁹⁷⁾, sive *baccarum lauri* ⁹⁸⁾, sive *seminum sinapis nigrae* ⁹⁹⁾, sive *mercurii rubri* ¹⁰⁰⁾, nec non

96) J. P. FRANK l. c. p. 89.

97) Camphorae drachmam unam. Nitri drachmas duas. Mellis. q. s. ut f. linimentum.

98) Pulveris baccarum lauri uncias duas. Mellis q. s. ut f. linimentum.

99) Pulveris sinapis uncias tres. Olei amygdalarum unciam semis. Succu citri q. s. ut f. unguentum,

100) Butyri recentis uncias duas. Cerae albae liquefactae drachmas tres. Mercurii praecipitati rubri, camphorae aa. drachmam unam et semis. M.

non solutio muriatis hydrargyri oxydati ¹⁾, praemis-
 missa massa detergente.

CAP. XIX.

De Ecchymomate.

§. LXXXIV.

Definitio. Formae. Causae.

1. **M**acula ex effusione sanguinis in textum cutis *Definitio.*
 originem ducens, *ecchymoma* ²⁾ dicitur.

2. Ecchymoma sub forma comparere solet *Formae.*
 nunc *stigmatum* coccineorum sive violaceorum:
 ad frontem, genas, mentum, collum et brachio-
 rum superficiem internam, — nunc *macularum*
lenticularium fuscarum, bruneorum, lividarum ad
 universum corpus, facie non excepta, — nunc
macularum lentibus decuplo majorum, nigrarum,
 fuscarum, cutim marmoris instar variegantium,
 prae-

¹⁾ R. Aquae destillatae uncias sex. Mercurii sublimati
 corrosivi grana duodecim. M.

²⁾ A GRAEC. Εκ, extra et χυμός, humor seu succus,
Synonyma. Sugillatio, effusio, extravasatio, suffusio.
 GERM. Blutunterlauf, Blutfleck. GALL. Ecchymose, su-
 gillation, effusion. — ANGL. Ecchymosis, livid spot
 from extravasated blood. — ROSS. Синеба. — PO-
 LON. Siniak.

praecipue ad extremitates, — nunc *plagarum*, pal-
mam excedentium, nigrarum, subviridescentium,
ad pectus, abdomen, manus pedesque ³⁾; nunc-
que *striarum* sive *linearum* rubrarum, lividarum,
nigrarum, aequae acsi cutis flagellis caesa esset (*vi-
bices*) ad extremitates aliaque loca. In genere ec-
chymoma minime circumscriptum est, sensim
sensimque diffluit, variosque plerumque exhibet
coloris gradus, vel ad interstitia inter unam alte-
ramve maculam protractos.

Caussae.

3. Cutis candida, sensilis et laxa, praecipue
ad loca, cellulosa minus compacta instructa (e. c.
ad palpebram inferiorem, scrotum etc.), interdum
vero et ad firmissima (e. c. ad plantas pedum; al-
bugineam oculi etc.), nec non ad orificia oris, va-
ginae, ani, immo ad ipsas membranas internas
viscerum superficiem ambientes, ecchymomati
subjicitur. Ansam illi porrigunt: contusio, con-
cussio, compressio ⁴⁾, suctus ⁵⁾, distensio, vul-
nera sanguini extravasato exitum denegantia, ery-
sipelas ⁶⁾, tussis impetiosa, vomitus effrenus ⁷⁾, con-

³⁾ Manus nigerrimas in typho vidit J. P. FRANK, ac-
cius aethiopis instar nigrum in scorbuto observavit
PLENK (l. c. p. 45).

⁴⁾ Sic capita recens natorum post partum difficilem, ob-
liquum, aut vectibus absolutum, frequenter ecchymo-
mata exhibent.

⁵⁾ Ab hirudine, a cucurbitula, a labiis etc.

⁶⁾ Cap. VI. §. XXIX. 8.

⁷⁾ Ex hac causa pluries ecchymoma albugineae observa-
vi,

contractio vehemens musculorum e. c. sub epilepsia ⁸⁾, porro: labes hepatis, lienis, excretiones cruentae sive imminentes ⁹⁾, sive suppressae ¹⁰⁾, animi pathemata ¹¹⁾, praecipue ira ¹²⁾, dolores ¹³⁾, debilitas senilis ¹⁴⁾ et inprimis varii diatheseos scorbuticae gradus. Causam proximam ecchymomatis in vasorum sanguiferorum sive laesione mechanica, sive atonia, sive spasmo (transitum scilicet sanguinis impediante) sive secretionem morbosa, locari posse credimus.

vi, similesque casus a BLAVIO describuntur (Ephem. N. C. Dec. III. an. 7. 8. ob. 29).

8) Futurae epilepsiae paroxysmum ab ecchymomatibus annuntiatum fuisse, observavi.

9) Stigmata coccinea ad faciem adventum menstruorum annuntiabant in femina curae meae commissa. Puellae sexdecim annorum exemplum ter quater de die ad faciem aethiopis instar nigrescentis YONG refert. (*Philosoph. Transact.* Vol. 26. No. 323. p. 425).

10) RICHTERS *chirurgische Bibliothek.* II. B. p. 235.

11) Virgo ex quovis fortiori animi pathemate labium inferius et mentum suggillatione correpta exhibebat. (*Act. physic. med. Nat. Cur.* Vol. II. p. 33).

12) TISSOT *Oeuvres quatrième Volume.* p. 359.

13) Post cephalalgias ecchymoma sub forma stigmatum ad palpebras vidi.

14) Melasma senile *Auctorum.*

§. LXXXV.

D i a g n o s i s.

Facilis confusio, 1. *Ecchymoma* confundi potest cum *gangraena*, cum *peticulis* aliisque cum *maculis*.

Distinctio a gangraena, 2. Cum *gangraena*, *ecchymoma* facile ab iis, qui ex solo nigro partis colore ad sphacelum concludunt, confunditur. Differunt sequentibus notis:

Gangraena.

- a. Solutionem continui exhibet.
- b. Pars affecta friget.
- c. Sensus in parte deletur.
- d. Summo vitae periculo stipatur.
- e. Foetorem specificum spargit.

Ecchymoma.

- a. Nulla solutio continui observatur.
- b. Temperiei nulla occurrit mutatio.
- c. Sensus perstat.
- d. Periculo plerumque vacat.
- e. Vix foetet.

Distinctio a peticulis.

3. *Peticulae.*

- a. Exclusive in morbis febrilibus obveniunt.
- b. Contagiosi quid fere semper offerunt.
- c. Aegros lecto affligunt.

Ecchymoma.

- a. In morbis febrilibus tum aliis occurrit.
- b. Contagii suspicionem haud movet.
- c. Aegri saepe deambulare possunt.

d. Macu-

- | | |
|--|--|
| <p>d. Maculae sunt regulares, circumscriptae, lentibus vel minores, vel similes, vel parum majores.</p> <p>e. Diversitatem coloris modicam offerunt.</p> <p>f. Cutis, maculis intermedia, normalis est.</p> <p>g. Rarissime faciem occupant.</p> | <p>d. Maculae vix regulares, plerumque diffuentes, lentibus saepe decuplo majores sunt.</p> <p>e. Color adeo diversus, ut cutis marmoris instar variegata evadat.</p> <p>f. Cutis, maculis intermedia, saepe ex flavo viridescit.</p> <p>g. Saepe in facie animadvertitur.</p> |
|--|--|

Datur autem *complicatio* peticularum cum ecchymomate nunc traumatico, nunc alio.

4. Quemadmodum interruptio processus oxygenationis sanguinis livorem *universalem* cutis e. c. in morbo sic dicto coeruleo producit, ita ex eadem causa et *partiales* livores, maculas scilicet a genuino ecchymomate probe distinguendas oriri arbitramur. Huc pertinere videntur maculae coeruleae in mortis articulo ¹⁵⁾, in hydrothorace, in suspensis et suffocatis obvenientes. In asphyxia ex carbonum fumo ejusmodi maculas ea ipsa ratione, qua evoluta vita respiratio liberior evadebat ex coeruleis rubras fieri ac dein plane evanescere vidimus. Postremo cavendum est, ne striae, quas

vas

Distinctio
ab aliis maculis.

15) De maculis morientium vide SIM. SCHULZ in Ephem. N. C. a. 4. et 5. obs. 121.

vas lymphaticum inflammatum exhibet, pro *vibicibus* habeantur ¹⁶⁾.

§. LXXXVI.

Prognosis. Cura.

Prognosis.

1. *Ecchymomatis resolutio* obtinetur, si copia sanguinis major non sit, quam a vasis lymphaticis absorberi queat, si vires vitales in universo corpore et in parte affectā ita vigeant, ut absorptionis opus locum inveniat, sique fons cruoris extravasati novum non largiatur sanguinem. *Induratio* ontigit, dum modica sanguinis copia in textum cellulosum effusa est, dum vis vitalis non quidem ad resolutionem obtinendam, sed saltem ad corruptelam avertendam satis viget, dumque cruor tractu temporis cum cellulis, quibus continetur, coalescit. Indurationes hujusmodi frequenter in senectute ad extremitates inferiores, praecipue lateris sinistri locum inveniunt ac nisi resolvantur tum erysipelati, tum ulceribus chronicis ansam porrigunt. Nunquam ex sanguine stagnante pus verum generatur. *Gangraena* hic expectanda, concesso ad cruorem extravasatum aëris aditu delectoque influxu nervorum in partem affectam. Sanguis sub aponeurosi effusus febres violentas, inflammationes, deliria, convulsiones ac mortem

hinc

16) PLENK hunc errorum ibi commisisse videtur, ubi de *vibicibus* a *pararitio* loquitur (Op. c. p. 46).

hinc inde producit. Ut *signum* ecchymoma in morbis acutis, in haemorrhagiis, in senio etc. mali ominis censetur.

2. Si partis cujusdam extensio, distractio, Cura. contusio, ecchymomatis periculum minatur, tunc citata illius in aquam frigidam immersio, vel fomentatio cum nive aut glacie contusa, ac interdum compressio, sugillationem saepe avertunt. Praesente ecchymomate locali cum orgasmo, in robustis et plethoricis hominibus *venae sectio* praemitenda, ac nisi inflammatio et partis laesae jam tumor ac durities, nec non summus dolor impediunt, *fomentatio* cum posca, *muriate ammoniae* et *nitrate potassae*, vel *acetas plumbi liquidus* cum aqua frigida et parva *alcohol* portione, conducent. Si fortior contusio aut ictus sclopeti, aut alia demum caussa, praecipue mali diuturnitas, vitalitatem imminuerint, tunc fomentatio ex herbis aromaticis vino decoctis, vel *radicis bryoniae albae* recentis rasura¹⁷⁾, cum aequali *alcoholis* portione, vel spirituosa fomentatio cum *muriate ammoniae et aceto*, requirentur. Si major forte sanguinis copia, quam quae commode resolvi speretur, aut cruor in grumos coactus, sub cute integra vel parvo tantum, aut jam collapsio vulnuscule perfossa, vel sub tensa aponeurosi stagnaverit: tunc pellis, aponeurosis sine mora incidenda, aut vulnus dilatandum, vel profundae satis scarificationes,

ut

17) HELMONT. Ignotus hydrops §. 40.

ut liquidum cruentum exstillet ac tandem externa, quae diximus auxilia, pro re nata temperantia, excitantia, nec non fasciae comprimentes, in auxilium trahenda sunt. In *sugillatione capitis recens natorum* sectio plerumque mortem properat, unde vel *alcohol camphoratum*, infusum aliquod *aromaticum vinosum* et calor aequalis, perimpositum tumori gossypium obtinendus, supplebunt ¹⁸⁾. In *ecchymomate typhode* remedia contra haemorrhagias in typho commendata¹⁹⁾, in *gastrico evacuantia* indicantur. *Scorbuticam labem* specificis aggredimur auxiliis. Nil potentius hic ecchymoma debellat, saltem aestivo tempore, quam *balnea fluviatilia* ²⁰⁾. Si major in parte vasorum *inertia* ecchymoma inducat, praeter motum corporis in aëre libero ac lavationem frigidam, remedia adversus lentiginem et chloasma commendata, usurpanda sunt. Cura ecchymomatis ex *retentione menstruorum* et *haemorrhoidum* remediis alibi tradendis ²¹⁾ absolvitur. Praeter caetera hic potissime conducunt *aquae minerales* tum *saponaceae*, tum *salinae*, tum *martiales*. Quae ex *spasmo* oriuntur *ecchymomata* sat cito sponte evanesce-

re

18) FRANKII Epit. l. c. p. 104.

19) P. I. Vol. I. §. LV. 15. 16.

20) Usitatissimum inter aegros in nosocomio militari Vindobonensi decumbentes sibi remedium, testante egregio hujus instituti moderatore WÄHRING.

21) P. IV.

re solent; nisi hoc fieret, *pulvis radiceis caephe-
dis ipecacuanhae cum opio*, infuso aromatico e. c.
salviae officinalis suffultus, intus propinari potest
et adhibita extus leni frictione cum vino sive al-
cohol. *Indurationem* minitans ecchymoma, nec
non ipsa ex ecchymomate induratio, optimum au-
xilium in *vaporibus*, ex aqua et aceto floribusque
sambuci nigrae elicitis, agnoscit; quorum vapo-
rum ope et rebelle ecchymoma traumaticum albu-
gineae debellavimus. In chronico et pertinaci
ecchymomate tum *flores arnicae montanae* ²²⁾,
tum *stipites solani dulcamarae* ²³⁾, sub forma in-
fusi intus et extus adhibiti, conducunt. *Cal-
gulae* ab Hispanis hic commendatae effectus,
nos latent. *Ulcera* ex ecchymomatibus ad chi-
rurgiae pertinent forum. Ita *gangraena* ex eadem
caussa orta.

22) FERRIUS in Eph. N. C. an. 9. et 10. p. 23. obs. II.

23) *Mémoires de l'Académie des Scienc. de Paris* 1761.

CAP. XX.

De Erythemate.

§. LXXXVII.

Definitio. Caussae.

Definitio. 1. **R**ubor partialis cutis plerumque chronicus aut saltem apyrecticus, a compressione evanescens, hac cessante revertens, saepe papulis, phlyctaenis, pustulis aut furfuribus junctus, *Erythema* dicitur.

Caussae. 2. *Caussae* erythematis sunt: vitia haereditaria, congenita, diathesis scrophulosa, leprosa ²⁴⁾, plicosa, abusus liquorum fermentatorum, actio irae, invidiae, moeroris diu protracta, mala hepatis, usus arsenici ²⁵⁾, graviditas, suppressio haemorrhoidum, menstruorum, lochiorum, lactis, fluoris albi, sudoris pedum et axillarum, pigmenta, frigus, radii solares, impuritas inter plicas cutis, et serum acre partes distendens. Sedes mali nunc in vasis sanguineis varicosis, liquorem rodentem, aliquando pollinem terreum secern-

24) FALCONER *memoirs of the medical society of London*. Vol. 3. p. 381.

25) Sic una aegrarum mearum de se ipsa fatebatur.

mentibus, nunc in glandulis sebaceis et lymphaticis, nunc in ipsis vasis lymphaticis, nunc in texture cutis quaerenda videtur.

§. LXXXVIII.

D i a g n o s i s.

1. *Erythema* cum *erysipelate*, *strophulo* et *herpete* confundi potest. Facilis confusio

2. Ab *erysipelate* distinguitur *erythema*, quoniam illud morbum acutum sedemque saepe mutantem, hoc autem vitium chronicum vel saltem pyrecticum et stabile constituit. Distinctio ab *erysipelate*.

3. *Erythema* dividitur: in *E. naevum*, — in *E. guttam roseam*, — in *E. pernionem*, — in *E. solare*, — in *E. intertriginem*, — in *E. recens maturationum*, — et in *E. oedematodes*. Divisio.

4. *Erythema naevus* ²⁶⁾ maculam sistit congenitam (a terrefacta ob incendium matre plerumque ortam), nunc latam, nunc longitudinalem, irregularem, coloris ignei aut vini rubri, faciem, collum et scapulas obsidentem, interdum super cutem, fructuum rubi idaei instar elevatam. *E. naevus*.

5. *Erythema gutta rosea* ²⁷⁾ macula est neque pruriens neque dolens, neque serpens, profunde rubra, *E. gutta rosea*.

26) *Synon.* Naevus flammeus, morphaea flammea, — GERMAN. *Feuermal*, — GALL. *Tache de feu*, — ROSS. Водимое красное пашно. POLON. *Znamie rodzime*.

27) *Synon.* Vari, Bacchia, LAT. — *Albed samen* ARAB. — *Gutta rosacea*, *phoenigmus* PLOUCQ. — *Jonthos* SWE.

rubra, fere livida, splendens, inprimis ad nasum et genas, aliquando ad frontem, rarissime ad mentum obvia, saepe aut *papulis* corymbosis, exiguis, duris, rubris, e rubro livescentibus, in apice desquamatis, aut *phlyctaenis* sive *pustulis* albescens, puriformi materia repletis, instructa, praecipue crapulae, irae, ac labi internae originem debens.

E. pernio. 6. *Erythema pernio* ²⁸⁾ rubedo dicitur a frigore orta, tumore saepe juncta, praecipue ad manus et pedes, sed et ad genas, aures nasumque obvia, quavis hyeme rediens, et si accedat calor lecti aut ignis, pruritu ardente stipata.

E. solare. 7. *Erythema solare* ²⁹⁾ maculam rubram, asperam, subduram, plerumque latam, ad manus aliasve partes a sole adustas comparentem, refert.

E. intertrigo. 8. *Erythema intertrigo* ³⁰⁾ rubedo est, inter ^{50.} plicas cutis praesertim in infantibus et obesis ad col-

SWEDIAUERI. — GERM. *Kupferhandel, Kupfergesicht.* — GALL. *Bourgeons.* — ANGL. *A pimpled face, red pimples on the face or nose.* — ROSS. Вечна на носу, кли, брусничной носѣ. — POLON. *Trąd na twarzy.*

28) GERM. *Frostbeule.* — GALL. *Angélure.* — ROSS. ошморозѣ. — POLON. *Odmorożenie.*

29) Ephelis CELSI. Adustio a sole auct. Kelis solare SWEDIAUR.

30) Synon. Paratrimma, attritus, abrasio, aposyrma.

GERMAN. *Frattwerden.* — GALL. *Excoriation.* — ANGL.

collum, axillas, aures, inguina, nates, vulvâ, poplitem, saepe cum exulceratione, obveniens ac ab impuritate et reciproca vasorum lymphaticorum in appositâ cutis superficies actione, orta.

9. *Erythema recens natorum*, morbus hucusque, ni fallimur, haud descriptus, plerumque circa quartum sextumve mensem obvenit. Incipit malum circa anum, extenditur ad nates et partes genitales, et proserpit tandem ad extremitates inferiores. Partes affectae carnis crudae ad instar rubent, cutim tumidulam atque epidermidem plurimis in locis secedentem exhibent. Malum hoc per mensem et ultro perstat, ac, ut semel vidimus, omni mense periodice redit. Infantes robusti non multum inde laeduntur, reliqui marcescunt et sub prava medendi ratione, praeviis impetiginis fuga et diarrhoea, moriuntur. Saepe quidem vitium venerereum huic erythemati ansam porrigit, at, vidimus illud pluries sine ulla syphilidis suspitione, ex ignota hucusque caussa originem ducens.

10. *Erythema oedematodes* ³¹⁾ rubedo nobis edicitur, quae ad partes ab oedemate distentas, imprimis ad scrotum, ad extremitates inferiores et ad abdomen, occurrit.

ANGL. *Excoriation*. — ROSS. Опрѣлошѣ. — POLON. *Wyprzanie, Odparzenie*.

31) *Erysipelas dedermatosum* auctor.

§. LXXXIX.

Z

§. LXXXIX.

P r o g n o s i s . C u r a .

Prognosis.

1. *Erythema naevus* vitium plerumque indolibile, ac interdum in ulcus cancrorum transiens sistit. *E. gutta rosea* formosas aliquando personas in monstra transformare ac, praepostere sanatum, ophthalmiis chronicis, vitiis aurium, morbis nervosis originem praebere solet. Quod sub graviditate oritur, hoc interdum largo lochio-rum fluxu debellatur. *E. pernio* tum ob reditum, tum ob deformationem, tum ob ulcera chronica quibus ansam porrigit, malum tediosum, hinc inde gangraenae periculum minitans, constituit. *E. solare* aliquando desquamationem epidermidis et rhagades relinquit. *E. intertrigo* neglectum, infantes nonnunquam in marcorem conjicit, in venereis et scrophulosis indolem syphiliticam aut scrophulosam induit, et incaute remediis externis curatum, vel in adultis, gravia post se trahit mala. *E. recens natorum* prognosis, ex descriptione morbi satis elucet. *E. oedematodes* interdum in gangraenam transit.

Cura.

2. Caustica, imprimis *acidum sulphuricum* parum dilutum et *solutio saturata muriatis hydrargyri superoxygenati*, *erythema naevum* interdum, at non sine cicatricis periculo, auferunt ³²⁾.

In

32) MURSIKNA Abhandl. von den Krankheit. der Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Säuglinge. 2 Thl.

in *erythemate gutta rosea*, usus remediorum, tum externorum, tum internorum, secundum regulas generales ³³⁾ determinatur. Ad prima pertinent: i. malum in simplici *varicositate* vasorum sanguiferorum consistat, — *acetum destillatum* quinque circiter aquae communis partibus dilutum, *acetas plumbi* tum liquidus, tum sub *unguenti* forma ³⁴⁾ adhibitus; — si *papulae* praesto sint, — *unguentum mercuriale* sive *album* ³⁵⁾, sive *rurum* ³⁶⁾, si *phlyctenae* aut *pustulae*, — *cremor lactis* donec irritationis periodus evanuerit, dein eundem, ut supra *unguentum mercuriale*. Remedia interna caussis mali adaptanda sunt. Saepissime hic *remedia resolventia* et inprimis *aquae minerales*, tum *saponaceae*, tum *salinae*, locum inveniunt ³⁷⁾. Praeterea ad regimen et ad evacuationes suppressas, quam maxime respiciendum est. *Hirudines* ad anum et vulvam, ac praecipue *fonticuli*, vel ad brachia, vel ad crura, potissima hic sistunt auxilia.

Z 2

Ery-

33) Cap. I. §. VI. 6.

34) R. Sacchari Saturni drachmam unam. Butyri recentis insulsi unciam unam. M. D. Sr. Usui externo.

35) R. Mercurii praecipitati albi drachmam unam. Spermatidis ceti unciam. Olei amygdalarum q. s. ut fiat sub leni igne unguentum, cum quo pars affecta noctu obducitur.

36) Vid. cap. XVIII. §. LXXXIII. 2. (6).

37) Et graphytes, de quo lege cap. XXXII. §. CXXVI. (6), profuit (HUFELAND's Journal. 1814. Febr. p. 21).

Erythema pernio recens, repetita membri in frigidam immersione, frictione cum nive, fomentatione solutionis acetatis plumbi curatur. Si dolor et tumor cutis valde urgeant, *hirudines* prope locum affectum, unctio ope olei olivarum, addito *spermate ceti*, et in genere emollientia indicantur. Profecto in morbo, fomentum ex *herbis aromaticis* in vino decoctis, conducit. Nisi id auxilium afferret, connubium olei *therebinthinae* cum *alcohol camphorato* ³⁸⁾, quo et adventus habitualis pernionis impeditur, valde commendamus. Praesente jam suppuratione, emollientia seponenda sunt, ac ulcus fungosum cum unguento digestivo et oxido hydrargyri rubro curari debet. *E. solari* optimum remedium est, *lac coagulatum acidum*. *E. intertrigo* munditiem, lotionem frigidiusculam, filamenta carpta pulvere farinae vel *lycopodii* inspersa, ac cutis plicis interposita, exposcit. *E. recens natorum* vel citra indolem syphiliticam, ope *oxidi hydrargyri et antimonii sulphurati* ³⁹⁾, infusi *herbae violae tricoloris* et *bal-*
neo-

38) R. Olei therebinthinae. Spiritus vini camphorati aa. drachmam unam et semis. Aquae rosarum uncias quatuor. M. D. — Vespere linteam hoc menstruo imbutum et dein expressum, locis affectis circum imponitur ac per noctis relinquitur curriculum. Egregia haec formula mihi ab amico ac praeclaro Vindobonense medico-chirurgo HÜRTEL communicata fuit.

39) R. Aethiopsis antimonialis grana tria. Sacchari albi drachmam

neorum tepidorum, profligatur. E. oedematodes,
 linteo aqua saturnina madido ac frigide applicito,
 curatur.

CAP. XXI.

De Porrigine.

§. XC.

Definitio. Formae. Causae.

1. Desquamatio epidermidis, nulli praevio Definitio.
 aut praesenti evidenti cutis vitio originem debens,
 relicta abnormi pellis subjacentis conditione, por-
 rigo 40) dicitur.

2. *Porrigo* nunc *universalis*, nunc *partialis* Formae.
 observatur. Primo in casu a CLAUDERO 41), SE-

GERO

drachmam unam. M. Divid. in duodecim partes aequa-
 les. D. Sr. Bis de die pulverem capiat lacte nutricis
 subactum.

40) *Synonyma*. Pityriasis a GRAEC. Πιτυρ. furfures. Sca-
 bies sicca. Impetigo. Lichen siccus. LOARY sub voca-
 bulo porriginis solummodo desquamationem epidermi-
 dis in parte capillata capitis intellexit (l. c. p. 458).
 Jure latiore significationem illi dederunt ALEX. TRAL-
 LIANUS (De arte medica Lib. I. c. 4) et J. P. FRANK
 (Epit. Vol. IV. p. 128).

41) Eph, N. C. Dec. II. an. V. obs. 199.

GERO ⁴²⁾, BARTHOLINO ⁴³⁾, PETRO A CASTRO ⁴⁴⁾, MARCELLO DONATO ⁴⁵⁾, WELSCHIO ⁴⁶⁾, LEDELIO ⁴⁷⁾, ALBRECHTO ⁴⁸⁾, SCHARFIO ⁴⁹⁾, GROCHIO ⁵⁰⁾ et BRISBANIO ⁵¹⁾ nobisque pluries viso epidermis totius corporis, interdum cum pilis et unguibus, sub forma furfurum aut squamarum, nunc cum, nunc sine pruritu et ardore, secedit, relictæ cute sicca, madida, pallida et luteo rubescente, plana, subtumida. *Porrigo partialis* eadem symptomata nunc ad partem capillatam capitatis, nunc ad supercilia, frontem, mentum, nunc ad volas manuum ⁵²⁾, nunc ad inguina, scrotum ⁵³⁾, labia vulvæ, nunc ad femora, genua et tibias offert. Praeterea forma hujus impetiginis (interdum

stabilis

42) Ibid. Dec. I. an. IV. obs. 88.

43) Act. med. Hafn. Vol. I. obs. 37.

44) De febre punct. malign. sect. 9. aph. 58.

45) De med. histor. mirabili. L. I. cap. 3. p. 12.

46) Curat. propr. Dec. IX. cas. 7. p. 595.

47) Eph. N. C. Dec. III. cas. 7. p. 595.

48) Ibid. an. III. obs. 124.

49) Ibid. an. II. obs. 83.

50) *Medical and chirurg. observat.* 118. — *Philosoph. Transactions for the year 1769.* Vol. 59. p. 218.

51) *Select cases in the practice of medecine.* Lond. 1772. *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte.* 1. B. 18 St. p. 149.

52) *Psoriasis palmaria* WILLAN. op. c. p. 123. Tab. 15.

53) *Psoriasis scrotalis* W. l. c. p. 125.

stabilis, saepe volaticae) admodum varia est. Compareret enim sub forma macularum squamosarum nunc solitiarum, circumscriptarum ⁵⁴⁾, — nunc diffusarum, latarum ⁵⁵⁾ — nunc vario pacto serpentium ⁵⁶⁾.

3. *Caussae* porriginis sunt: vitium haereditarium ⁵⁷⁾, congenitum, recondita labes scrophulosa, herpetica, leprosa, syphilitica, aura rigida vernalis, solis actio ⁵⁸⁾, maceratio partis in aqua calida ⁵⁹⁾, tinea imminens, pulvis cyprii calce mixtus aut aromaticus ⁶⁰⁾, ipsa farina ⁶¹⁾, adustio ⁶²⁾, ebrietas ⁶³⁾, cephalea ⁶⁴⁾, menstruatio ⁶⁵⁾, puer-

54) *Psoriasis guttata*. WILLAN l. c. p. 112. Tab. II. fig. 1.

55) *Psoriasis diffusa* W. l. c. p. 116. Tab. II. fig. 2.

56) *Psoriasis gyrata* W. l. c. p. 121. Tab. 14.

57) J. P. FRANK l. c. p. 132.

58) WASSERBERG apud PLENK l. c. p. 121. in nota.

59) E. c. apud anatomicos, apud lotrices (WILLAN op. c. Tab. 12. f. 2).

60) LORRY l. c. p. 460.

61) E. c. apud pectores (WILLAN l. c. Tab. 13).

62) Brachium Principis K... nonnullis retro annis P. adustum, porriginē coopertum vidi.

63) SWEDIAUER Op. c. Vol. II. p. 226.

64) Hanc LORRYI observationem (l. c. p. 461) saepe confirmatam habeo.

65) Nonnullas feminas, tempore menstruorum porriginē capitis laborantes, cognovi.

puerperium, convalescentia ex morbis acutis ⁶⁶⁾ et plethora cutanea ⁶⁷⁾. Causae hujusmodi nexum inter epidermidem et cutem auferre, reticulum mucosum inflammare, ac gluten sive adipem pervertere videntur.

§. XCI.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

Diagnosis. 1. Duce definitione, ad porriginem neque desquamationem, quam miliaria, erysipelas, scarlatina, morbilli, rubeola, erythema, herpes, tineae capitis, lepra Graecorum, et pellagra offerre solent, neque secessum epidermidis cutisque in gangraena, in bullis, in zostere, in pemphigo, in raphania, revocamus. Nisi enim principium ali- quod stabiliatur, plane impossibile est, hanc in ordinem componere doctrinam, nullibi enim major apud scriptores de morbis cutaneis confusio occurrit, quam relate ad morbos cum desquamatione. Fregii WILLANI perscrutationes, utpote subtiles nimis, eam difficiliorem ac magis intricatam reddidisse videntur. Enim vero si divisio porriginis in *siccam* et *humidam* jam pro superflua habeatur ⁶⁸⁾, quid de illius sextupla subdivisione dicen-
dum

66) P. I. Vol. I. §. XLIX. 9.

67) A porrigine rebeli liberata fuit nobilis virgo C. dum fonticulus, profunde nimis operatus, largae haemorrhagiae locum dederat.

68) J. P. FRANK l. c. p. 128.

dum erit? Et huic addi posset porrigo *interna*, uti testatur sedimentum furfuraceum in urinis ⁶⁹⁾ et secessus membranae internae oris et intestinorum in aphthis et dysenteriis ⁷⁰⁾.

2. Si porrigo, reconditae diatheseos herpeti-^{Prognosis.}
caae, scrophulosae, leprosae, syphiliticae, effectus, excipiat, malum de quo agitur non solum levioris momenti, sed interdum et salutare est. Com-
pertum enim habetur, adventante porrigine, do-
lores rebelles columnae vertebralis ⁷¹⁾, graves ce-
phalalgias ⁷²⁾, rebelles surditates ⁷³⁾ et mala nervo-
sa ⁷⁴⁾ debellata fuisse.

3. Pro varia cutis in porrigine conditione, ^{Cura.}
nunc *emollientia*, *balnea* scilicet *tepidia* cum lacte,
fotus ope decocti radice althaeae officinalis, sive
herbae malvae rotundifoliae, *unctio* cum adipe
suillo

69) HIPPOCRATES Aph. lib. IV. aph. 77. de natur. hum.
sect. 26 in fine. — Epidem. lib. V. c. 8. No. 17.

70) J. P. FRANK l. c. p. 130.

71) HIPPOCRATES Prorrh. et 2. c. 36.

72) WELSCH in hecatost. obs. physic. med. — hecatost.
2. obs. 65. p. 38.

73) RIEDLIN lin. med. an. 6. Novembr. mensis die 6.
p. 1253.

74) Pluries in hysteria et hypochondriasi eruptionem
porriginis, pro tempore saltem, terminum malorum
stitisse, observavi.

suillo recenti ⁷⁵⁾, aut cum oleo olivarum; — nunc lenia irritantia, uti saliva ⁷⁶⁾, urina ⁷⁷⁾, aqua marina, — nunc narcotica e. c. decoctum humuli lupuli ⁷⁸⁾, oleum hyosciami nigri cum opio ⁷⁹⁾, — nunc acria, e. g. tinctura meloes cantharidum ⁸⁰⁾, sulphas zinci ⁸¹⁾, — nunc antiphlogistica, hirudines videlicet; cucurbitulae scarificatae praescribendae sunt.

75) LORRY l. c. p. 248.

76) Porrigo, inprimis faciei, saepe hoc populari remedio mane jeuno ventriculo deprompto, sanatur.

77) AETIUS tetrab. I. serm. 2. p. 108.

78) ALEX. TRALLIANUS l. c.

79) J. P. FRANK l. c. p. 137.

80) Idem l. c.

81) BOENNECKEN in Nov. act. phys. med. Nat. Cur. T. I. obs. 50. p. 200.

CAP. XXII.

*De Rhagadibus, Callis, Cornuis
Cutaneis, Ichthyosi et Hy-
striciasi.*

§. XCII.

R h a g a d e s.

r. Cutis externae fissura abnormis et sicca, *rha-* Definitio.
gos dicitur ⁸²⁾.

2. Rhagades, labia oris ⁸³⁾, papillas mam- Sedes.
marum, labia vulvae, praeputium, anum, pal-
mas manuum, plantasque pedum occupare so-
lent.

3. Causae rhagadum sunt: ad os — frigus, Causae.
inprimis siccum; ad papillas mammarum — suctio
prolis valida et nimis repetita; ad genitalia — sy-
phi-

82) *Synon.* Fissura, rima, scissura, Vid. HAMPE Diss.
de rhagadibus. Argent. 1678. — GERM. Schrunken,
Hautspalten, Ritze. GALL. Rhagade, gercure, fente
en crevasse de la peau. ANGL. Chaps, clefts, or fis-
sures in the skin. ROSS. Трещины. POLON. Roz-
padling.

83) Non agitur de labio leporino.

philis; ad reliquas partes — vitium leprosum, depositio caussae arthriticae⁸⁴), ariditas cutis a transpiratione deficiente, uti in senio, diabete et aliquando in mania.

Divisio. 4. Sunt qui *rhagades* in *simplices* et *complicatas*, hasque iterum in *rhagades* cum phlogosi et dolore et in *rhagades* cum callositate dividunt⁸⁵). Majoris momenti divisio in *primarias* et *symptomaticas* est.

Prognosis. 5. *Rhagades oris* et *papillarum mammae*, facile evanescent; nec PLENKIO, contrarium de *rhagadibus venereis* contendenti⁸⁶), assentimur. *R. leprosa*e fere insanabiles sunt; *arthriticae* haud raro cum emolumento prorumpunt.

Cura. 6. *Rhagades a causa externa*, butyro cacao aut linimento demulcente illiniuntur. *R. venerea*e curam potius generalem quam localem expectant. *R. leprosa*e vel aliae rebelles, praecipue ad manus, lixivio cinerum communium lavari, aqua destillata ablui et unguento ex partibus aequalibus axungiae vervecinae, cerae albae, succo pomorum et oleo, composito, illiniri queunt, non neglecto chirotecarum usu⁸⁷). *R. arthriticae* vel naturae committuntur, vel decocto herbae *scandicis cerefolii*

84) Huc pertinere videntur *rhagades anonymae* PLENKII (l. c. p. 156).

85) SWEDIAUER op. c. Vol. II. p. 645.

86) L. c. p. 155.

87) THEDEN *Bemerkungen*. 2. Thl. p. 262.

folii tum intus sumto, tum extus applicito ⁸⁸⁾ curantur. *Rhagadibus ex deficiente transpiratione* balneis et antimonialibus occurritur.

§. XCIII.

C a l l i.

1. Mutatio epidermidis et membranae mucosae in substantiam albescentem, duram, crassam, sensuque orbatam, *callus* dicitur. Definitio.

2. Callositates ad aures, ad cristam ilii, ad Sedes. palmas manuum, ad plantas digitosque pedum occurrere solent. Hic *clavi* obtinent nomen ⁸⁹⁾.

3. Ansam porrigunt *callis aurium* — annuli Canssae. auriculares, decubitus diuturnus in unum latus ⁹⁰⁾; *cristae ilii* — strophia ⁹¹⁾; *manuum* — labores

88) ANDRY Orthopédie T. I. p. 202. — Intus succus expressus ad unciam unam cum seri lactis libra una, quotidie exhibetur.

89) TYLOSIS a GRAEC. Τυλος, clavus. SWEDIAUER Op. c. Vol. II. p. 595. — GERM. *Hühnerauge*, *Leichdorn*. GALL. *Glous*, *le cor*, *cors aux pieds*. ROSS. МОЗОЛ. POLON. *Nagniotki*. — Legi merentur: WEDEL Diss. de clavo pedis. Jen. 1675. — LION *Treatise upon spinæ pedum (corns)*, with plates. London 1802. — *Medical facts and observations*. Lond. Vol. 3. No. 3. — *Auserlesene Abhandlungen von LESKE* 2. B. 18 St. — 4. B. p. 175.

90) HIPPOCRATES de morbis mulierum L. II. c. 20. edit. Chart. T. VII. p. 308.

91) PLENK l. c. p. 136.

labores graves, tractatio instrumentorum rudiorum; *pedum* — gressus denudatis pedibus inprimis super arenam calidam ⁹²⁾, calcei angusti; in *genere* — repetita applicatio sive acidi sulphurici ⁹³⁾, sive sulphatis aluminis et potassae ⁹⁴⁾, nec non depositio caussae arthriticae.

Divisio. 4. *Clavi in superficiales et profundos* dividi solent. Illi, in epidermide et externa cutis superficie plerumque mobiles resident; hi, ipsam cutis substantiam, tendines et periostium, immobiles, occupant, ac nucleo duro in medio instruuntur. Diutius continuata pressione, cutis vicina in orbem inflammatur, tractis non nunquam in consensum glandulis lymphaticis nervisque ⁹⁵⁾ vicinis. Ad clavos profundos et ille qui *sub ungue* latet, eamque cum maximo dolore sublevat, pertinet.

Prognosis. 5. Callositates manuum et inprimis apicum digitorum, tactui, ac clavi pedum, gressui obstant. Utraque vel sponte, interdum accedente suppuratione ⁹⁶⁾, evanescent, vel extirpatione auferri queunt, quam operationem, incaute susceptam, aliquando tetanus, cancer fungosus ⁹⁷⁾, gan-

92) HALLER element. Physiolog. T. V. p. 53.

93) DESLANDES (*Bremisches Magazin*. I. B. p. 665).

94) Solutione aluminis ab igne se defendisse fertur *vir* sic dictus *inconflagrabilis*. (*l'homme incombustible*).

95) MURALT *chirurgische Geschichten*. No. 103.

96) Act. Nat. Cur. Vol. IX. obs. 89.

97) PLENK l. c. p. 135.

angraena ⁹⁸), ipsa denique mors ⁹⁹), secuta sunt. Callis pedum facile rhagades, maximos dolores excitantes, super accedunt.

6. *Calli manuum*, praevia maceratione in aqua Cura.
epida, *unguento camphorato* ¹⁰⁰) illiniuntur, aut
succo *chelidonii majoris* vel *vesicatorio*, vel *cau-*
tico ¹⁾, vel ipsa ustione ²⁾ destruuntur. *Clavi*
unguento demulcente et balneo pedum emolliri,
dein caute et lente vel cultro, vel unguibus ex-
cirpari debent. Locus denudatus, cera, vel em-
plastro custodiente, cooperitur. Sunt qui clavo,
emplastrum vel ex *cera*, *gummi resina heraclei gum-*
niferi et *viridi aeris* ³⁾, vel ex *mercurio* ⁴⁾, aut
folia sedi sive *semper vivi tectorum* in aceto ma-
cerata ⁵⁾ imponunt. Callus pedum rhagadibus
stipa-

98) Duo hujusmodi exempla J. P. FRANK obtulerunt.

99) BORELLI observ. cent. I. No. 82. — HEISTER
epist. de morte Silli Italici, celebris poetae et orato-
ris, ex clavo insanabili. Helmstädt. 1734.

100) Cap. XVIII. §. LXXXIII. 2. (3).

1) CARLISLE in *medical facts and observations*. Vol. 7.
No. 3.

2) PAUL AEGINETA Lib. VI. c. 87. — SEVERINUS de
efficaci medicina. p. 266.

3) MARESCHAL DE ROUGERES in *Journal de médecine*
T. 40. p. 449.

4) CAMPER *von der besten Forme der Schuhe*. Berlin
1783.

5) PLENK l. c. p. 136.

stipatus, partibus aequalibus *unguenti suboxyd hydrargyri* ⁶⁾ et *camphorati*, curatur. Inflammatio clavum ambiens, primum *acetatem plumbi li quidam*, ac dein, si dolores valde urgeant, aut suppuratio immineat, *cataplasma emolliens*, in gravissimo malo *hirudines* et *opium* exposcit. Latente *clavo sub ungue*, praemisso balneo, unguis mollis redditur, et dein forfice ad utraque clavi latera scinditur, quo facto, elevata ungue, extirpatur clavus, quae singula exactissime a CAMPER ⁷⁾, ROUSSELOT ⁸⁾, TARDIEU ⁹⁾, LAFOREST ¹⁰⁾ et RICHTER ¹¹⁾ describuntur.

§. XCIV.

Cornea cutanea. Ichthyosis. Hystriciasis.

Definitio-
nes.

I. Excrementiae callosae, sive verrucosae, unguum structuram aemulantes, valde protuberantes, mobiles, *cornua cutanea* vocantur ¹²⁾. *Ichthyosis* ¹³⁾ dicitur textura integumentorum corporis squamosa, dura, interdum fere cornea. *Hystriciasis*

6) Unguentum mercuriale sive Neapolitanum.

7) L. c.

8) *Méthode certaine sur le traitement des cors.* Haye. 1762.

9) *Toilette des pieds.* Paris 1769.

10) *Von der Wartung der Fusse,* Leipz. 1783.

11) Op. c. I. B. p. 428.

12) *Keratiasis* a GRAEC. Κέρατ, cornu.

13) GERM. *Fischschuppenausschlag.* ANGL. *Fish-skin.* —
Describitur

iasis ¹⁴⁾ est status sub quo cutis humana hystricis instar setes sive aculeos exhibet.

2. *Cornua cutanea* ad caput ¹⁵⁾, ad mentum ¹⁶⁾, ad lumbos ¹⁷⁾, ad crura ¹⁸⁾ et ad reliquas

sedes.

Describitur a PANAULO, Pentecost. 5. obs. 9. — a STALPARTO VAN DER WIEL obs. 35. cent. 2. — a WILLANIO l. c. p. 143. a BRAMBILLA in *Abhandlungen der Josephinischen medicinischen Akademie*. 1. B. p. 371; — ab ALIBERTO op. c. Tab. XXXVII. sub nomine: *ichtyose nacrée*. Vidi simile prorsus exemplum Vilnae a. 1814. Tria alia describuntur a cl. SPANGENBERG in HORN's *Archiv für medic. Erfahrung*. 1812. März. April. p. 278.

14) GALL. *hommes porcsepics*. Describitur hystriciasis in *Journal encyclop.* 1756. T. 2. Part. 3. p. 119. — in *Philosoph. Transactions* 1731. No. 424. 1755. Vol. 49. p. 21. — a BUFFON *allg. Naturgesch.* Berlin 1774. 4. B. p. 223. — a SCHREBER: *Säugethiere*. Erlang. 1775. Th. 1. p. 11. — a TILESIO *ausführliche Beschreibung und Abbildung d. beiden Stachelschweinmenschen*. 1802. — a BLUMENBACH et ab AUTHENRIETH in VOIGT's *Magazin der Naturkunde*. 3. B. 4s St. p. 687. et 4. B. 3s St. p. 287. — Ipse a. 1803 fratres, JOANNEM et RICHARDUM LAMBERT, stupenda hystriciasis exempla referentes, Parisiis vidi. Habetur delineatio apud ALIBERT op. c. Tab. XXXVIII. sub nomine: *Ichtyose cornée*.

15) BARTHOLIN hist. anat. rara. Cent. I. hist. 78. p. 128. f. e.

16) FAB. HILDANUS obs. med. chirurg. Cent. 2. obs. 25.

17) DUMONERAU, *Journal de médec.* T. 14. février 1761.

18) Idem l. c. — CORRADORI *osservazioni fisiologiche sopra due corni umani*. Prat. 1799.

Frank Prax. I. 2. A a

superficieï partes ¹⁹⁾ visa sunt. *Squamae* piscium vel serpentium more, nunc solas extremitates, nunc universam cutim, excepta superficie interna articulationum, manuum, cubiti, crurum, occipare solent. *Setae* sive *aculei* plus minus ubique prominent.

Caussac.

3. Cornua cutanea ²⁰⁾, ichthyosis et hystriasis ²¹⁾ plerumque vitia sistunt haereditaria, congenita, vel primis a nativitate mensibus evoluta. Ichthyosis apud populos PARAGUAY endemica dicitur ²²⁾. Praeterea cornua ab ictu sagittae ²³⁾, a vulnere

¹⁹⁾ SCHENK obs. 22. 23. — MANGANETTA in Misc. N. C. dec. I. a. 1. obs. 30. — *Journal de médecine*. T. 10. p. 216. — LOKE in LESKES auserl. *Abhandl.* 1. B. p. 341. — *Repertorium medic. und chirurgischer Abhandlungen f. prakt. Aerzte und Wundärzte*. 2. B. p. 259. — *Medical facts and observations* 1792. Vol. 3. No. 12. — SANDIFORT museum anatomicum. Vol. I. sect. 3. No. 203. sect. 5. No. 99. — *Gazette salutarie de Bouillon* 1788. — HUFELAND's *Annalen der franz. Arzneykunde* 1. B. p. 447.

²⁰⁾ AMAT. LUSITANI Curat. medicin. Venet. 1566. cent. I. curat. 51. — PARACI op. chirurg. Lib. 24. cap. 2. — RIVERII obs. med., obs. 18. SCHENK l. c. obs. 20.

²¹⁾ WILLAN l. c.

²²⁾ BUFFON l. c.

²³⁾ ZACUT. LUSITANUS de medicorum princip. histor. Lib. II. hist. 4.

vulnere per novaculam inflicto ²⁴⁾, ab arthritide ²⁵⁾, originem duxisse compertum est.

4. Mobilitas, cornua cutanea, ab excrescentia Diagnosis. tiis osseis (exostosis, hyperostosis) immobilibus, abunde distinguit.

5. Cornua cutanea aliquando critica ²⁶⁾ inter-Prognosis. dum sponte decidunt ²⁷⁾ ac saepe rescindi queunt ²⁸⁾. Squamae et aculei dum decidunt de novo generantur.

6. Cornua vel acido nitrico, vel solutione Cura. sive nitratis argenti, sive muriatis antimonii, quibus basis eorum saepe illinitur, auferuntur. Squamae et aculei curam, praeter balnea tepida, quorum ope pro tempore decidunt ²⁹⁾, haud admittunt.

24) VICQ D'AZYR *histoire de l'Academie de medec. à Paris* 1780 et 1781. Vol. 6.

25) RICHTER in LODERS *Journal f. die Chirurg.* 1. B. p. 441.

26) *Gazette salulaire* l. c.

27) DUMONERAU l. c.

28) Idem l. c.

29) ALIBERT op. c. p. 169.

CAP. XXIII.

De Verruca et Condylomate.

§. XCV.

Verruca.

Definitio. 1. **E**xcrementia cutis, dura, inaequalis, diversae figurae et magnitudinis, *verruca* dicitur ³⁰).

Sedes. 2. *Sedes* communis verrucarum manus et facies est; at occurrunt, vel ad mammas ³¹), ad dorsum ³²), ad praeputium ³³), ad glandem ³⁴), nec non universum super corpus ³⁵).

Formae. 3. Species verrucarum ex ipsarum forma desumptae sunt: 1. *V. vulgaris* seu *topica*, tuberculum scilicet basi et apice aequali, varias corporis partes

³⁰) Acrochordon a GRAEC. Ἀκροχορδών. GERM. Die Warze. GALL. Des verrues, tannes, poirceaux. ANGL. Warts. Ross. Бородавки. POLON. Brodawka.

³¹) WASSERBERG in nota ad PLENKII op. cit. p. 137.

³²) Salzburg. med. chirurg. Zeitung 1794. 3. B. p. III.

³³) Neue Samml. medic. Wahrnehmungen. 3. B. p. 192.

³⁴) FABR. HILDANUS obs. cent. 3. obs. 88.

³⁵) Morbus verrucosus. PECHLIN Lib. II. obs. 42. — RHEINHARD historia singularis cutis turpitudinis. Lips. 1793.

partes occupans et sponte abiens, — 2. *V. pensilis* apice nodosa et caule subtili cuti adhaerens, — 3. *V. filiformis*, nodulo ad apicem orbata, instar fili longitudine nonnullarum linearum, collo, aliisque partibus alligata, — 4. *V. sessilis* seu *porrum*, cuti profunde insidens, parum elevata, — 5. *V. rhagadoidea*, id est *porrum*, saepe voluminosum, fissuras sive stigmata setarum evulsarum exhibens, — 6. *V. carnea sive mollusca* prominentia tenuis, mollis, sensibilis, cuti concolor, rubicunda, interdum pilis obsessa, nonnunquam thymi corymbos referens ³⁶⁾, — 7. *V. madida* seu *myrmecium* glabra, humida, parum dura et 8. *V. gregalis* catervatim faciem et manus obsidens, sponteque evanescens.

4. *Caussae* verrucarum, magna ex parte *Caussae*. liginie circumdatae sunt: vitium haereditarium ³⁷⁾, congenitum, commercium cum vaccis ³⁸⁾, cum gallinis ³⁹⁾, attactus partium genitalium, inprimis feminearum ⁴⁰⁾, suppressio menstruorum, syphilis etc.

5. Ver-

36) GRAEC. Thymion.

37) Verrucam molluscam in eodem brachii loco apud filiolum, quo apud matrem erat, conspexi.

38) Observatio est JENNERI, mihi a. 1803 Londini tradita.

39) KRETSCHMAR in HORNS *Archiv f. medic. Erfahrung*, 1. B. p. 228.

40) HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde*. 9. B. 3^e St. p. 183.

Diagnosis.

5. Verrucae ex vitio totius corporis pullulantes imprimis attentionem nostram ad se trahunt. Plerumque eae faciem, nasum et palpebras occupant, colorem ab initio bruneum, subnigrum dein plumbeum aut rubicundum referunt, atque tractu temporis, adventante dolore, in ulcera, mali quidem moris, at vix cancrrosis, pro quibus declarari ea solent ⁴¹⁾, transeunt. Enim vero cum LEURS ⁴²⁾, verrucas dari carcinomaticas, dubitamus, ac excrescentias pro cancrrosis habitas, potius pro *glandulis cutis scirrhis* ⁴³⁾, a verrucis ob maiorem duritiem, ob situm profundiolem et in partibus glandulosis, ob basin superficie ampliolem, ob lentum tandem incrementum, distinctis, habemus. *Verrucae venereae*, basi apice minores, cuti concolores, superficialiter ad faciem, mentum et genitalia, adhaerere solent ⁴⁴⁾.

Prognosis.

6. Verrucae vel sponte evanescent, vel sat facile auferuntur, at, utroque in casu, haud raro recrudescunt.

7. Cu

41) DEVENS Diss. de fungo cancrroso ex verruca orto.

42) Vom Krebs. (Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte. 18. B. p. 195).

43) Huc tubercula subcutanea revocarem, de quibus WOOD scripsit: On painful subcutaneous tubercles (Edinburgh medical and surgical Journal. Vol. 8). De memorabili hoc morbo lege et Götting. gelehrte. Anzeigen. 30s St. den 20. Febr. 1813. p. 299.

44) PEARSON on cancerous diseases. (Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte 16. B. p. 645).

7. *Cura localis* verrucarum consistit: 1. in *Cura. ligatura*, ope fili sive setae equinae, inprimis adversus V. pensilem adhibenda, — 2. in *rescissione*, — 3. in *causticis* e. c. acido muriatico ⁴⁵⁾, nitrico ⁴⁶⁾, sulphurico ⁴⁷⁾, nitrate argenti fuso ⁴⁸⁾, potassa pura ⁴⁹⁾ et sulphate cupri ⁵⁰⁾, quibus verrucae vel illiniuntur, vel tanguntur; — 4. in *rebus acribus* eodem pacto adhibendis e. gr. succus foliorum chelidonii majoris ⁵¹⁾, Euphorbiae ⁵²⁾, folia juniperi sabinae ⁵³⁾, fici ⁵⁴⁾, cepae ⁵⁵⁾, saponiger ⁵⁶⁾, murias ammoniae ⁵⁷⁾, fel, praecipue piscis cyprini ⁵⁸⁾, cerumen aurium ⁵⁹⁾, tinctura meloes cantharidum ⁶⁰⁾, gummi heraclei gummi-

45) HEISTERS *Wahrnehmung*. 1. B. No. 663.

46) PLENK l. c.

47) RIVERIUS obs. communior. p. 674.

48) HEISTER l. c. No. 274.

49) FABRIC. HILDANUS cent. 6. obs. obs. 79.

50) HEISTER l. c.

51) ZACUT. LUSITAN. prax. admir. L. I. obs. 73.

52) WEDEL Diss. de verrucis. Jenae 1696.

53) MURRAY med. prakt. Biblioth. 3. B. p. 244.

54) RIVERIUS l. c.

55) MONCONYS *Voyages*. 3. Vol. p. 89.

56) BALDINGERS *neues Magazin für Aerzte* 10. B. p. 157.

57) *Gazette salulaire de Bouillon*. 1791. No. 26.

58) REUSNER obs. 129.

59) PLENK l. c.

60) VAN DER HAAR (*Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte* 1. B. 13 St. p. 33).

miferi in aceto solutum ⁶¹), ne dicamus 5. *remedia sympathetica* e. c. sanguinem sive anguillae ⁶²), sive menstrua ⁶³), splendorem lunae ⁶⁴), attactum cadaveris ⁶⁵), aliaque plane absurda. *Verrucae* et *vitio universali* pullulantes pro re nata alvum purgantibus, regimine antiphlogistico ⁶⁶), aquis ferruginosis, mercurio, curantur. Ulcera, verrucarum reliquiae, unguentum vel carbonum, vel magnesii exposcunt.

§. XCVI.

C o n d y l o m a.

Definitio. 1. Excrescentia carnea, subdura sive mollis, humidaque, *condyloma* dicitur ⁶⁷).

Sedes. 2. Condylomata maxime in partibus genitalibus, ad balanum scilicet, ad labia vulvae, aut circa anum, sed et ad partem capillatam capitis, ad

61) HEISTER l. c. No. 663.

62) *Berliner Sammlung*. 1. B. p. 90.

63) WEICKARD Thesaur. Pharmaceuticus. Lib. IV. p. 613.

64) JUNKERS *Chirurgie* p. 232.

65) Eph. N. C. Dec. II. an. I. obs. 2.

66) SCHMALZ in LODERS *Journal für die Chirurgie* 2. B. p. 701.

67) *Sycosis* a GRAEC. Σύνον, ficus. GERM. Feigwarzen. — GALL. *Condylomes*, *chou-fleurs*. — ITAL. *Porri-fichi*. — ANGLICE. *Condyloma*. — ROSS. Чиж. — POLON. *Szyszki*.

ad marginem capillitii ⁶⁸⁾, ad barbam aliaque ad loca obveniunt.

3. *Condylomata figuram* nunc fici, nunc cri- Formae.
tae gallinae, nunc brassicae oleraceae etc. re-
ferunt.

4. *Caussae* condylomatum plerumque in vi- Caussae.
tio syphilitico, aut locali, aut universali, in hae-
morrhoidibus et in impuritate quaerendae sunt.
Nec labes *cancrosa*, rite docente ALIBERTO ⁶⁹⁾,
hic excludenda est.

5. *Condyloma venereum* sensu destitutum est, Diagnosis.
ac, si subdurum, humorem paucum, viscosum, —
si molle, copiosum foetidumque, manat. *C. hae-*
morrhoidale, symptomata haemorrhoidalia socia
habere, ac originem ex processu inflammatorio
trahere solet. *Condylomata cancrosa* ⁷⁰⁾, nunc
ovalia, nunc cylindrica, rubra sunt, calentia, pru-
rientia, dolentia, marginibus elevatis centro de-
presso.

6. *Condylomata* haud difficulter abiguntur, at Prognosis.
facile recrudescunt. Sub prava medela ac cache-
xia nonnunquam ulceribus mali moris ansam
porrigunt.

7. *Condyloma venereum* vitium sistens locale Cura.
ac satis prominens, optime cultro aufertur, alias
metho-

68) *Samml. medic. Wahrnehm.* 4. B. p. 579.

69) *Op. c.* 113.

70) *Les cancroïdes* ALIB. vid. tab. XXVIII. Bis.

methodum antisymphiliticam universalem et caustica exposcit. *C. haemorrhoidale* forficibus securissime abigitur, nimis enim caustica, e. g. ut suadent, unguentum ex alumine usto, opio et oleo seminum lini, partes vicinas irritare solent. Quocumque in casu munditiei studendum est. *Condylomata canerosa* extus, opio, sulphure, camphora, conio maculato, acetate plumbi, embrocatione, et interne, muriate oxygenato hydrargyrii, conio maculato, et aquis mineralibus, pertractata fuerent *), at incassum. Maximum levamen balnea maritima attulerunt.

CAP. XXIV.

De Vitiis Unguium.

§. XCVII.

Historia. Variarum Species.

Historia. 1. *Vitia unguium* ⁷¹⁾ plurimis scriptis occasionem dederunt, uti videre est apud AETIUM ⁷²⁾,

Dios-

*) ALIBERT. l. c. p. 115.

71) *Caconychiae* a GRAEC. Κακός, vitiose, et ὄνυξ, unguis.

72) Tetrab. IV. Serm. 2. c. 79.

DIOSCORIDEM ⁷³⁾, BARTHOLINUM ⁷⁴⁾, MERCURIA-
LEM ⁷⁵⁾, FRANKENAUM ⁷⁶⁾, WERNERUM ⁷⁷⁾, LA
FORESTUM ⁷⁸⁾, CAMPERUM ⁷⁹⁾, PLENKIUM ⁸⁰⁾ alios-
que praesertim inter chirurgos.

2. Ad ungues vitiosos spectant, eorum *macu-* Species va-
lae, curvaturae, fissurae, tinea, mollities, lapsus riae.
et *pterygium*.

3. *Maculae unguium* sunt vel *albae (seline)*, Maculae.
vel *coeruleae (ecchymoma unguis)*.

4. *Curvatura unguis* ⁸¹⁾, vel antèrius, vel Curvatura.
lateraliter contingit. Primo in casu unguis abnor-
mem aliquando adipiscitur longitudinem ⁸²⁾, in
altero

73) Facile parab. Lib. c. 131.

74) Epist. IV. p. 258.

75) De decoratione. c. 26.

76) Diss. de unguibus monstruosis. Hafn. 1776.

77) Diss. de unguibus humanis varioque modo quo pos-
sunt corrumpi. Lips. 1773.

78) *Ueber die Kunst die Füße zu besorgen*, a. d. Franz.
Leipz. 1788.

79) Op. c.

80) Op. c. p. 177.

81) *Onychogryposis* a Gr. Γρυπός, incurvus, et čvůž,
unguis.

82) BARTHOLINUS Act. Hafniens. 1671 et 1672. Vol. I.
obs. 16. p. 43. Tab. I. f. 2. — HILLING Misc. Nat.
Cur. Dec. II. an. 1. obs. 160. Tab. VI. f. 8—11. —
SCHELHASSEN ibid. an. 3. obs. 162. Tab. V. f. 5. —
MORGAGNI op. c. epist. 68. 6. — LINDANI med. phy-
siol.

altero digitum arctat (*arctura unguium*) accedente saepe exulceratione cutis cum *hypersarcosi* ⁸³⁾

Fissurae. 5. *Fissurae unguium*, longitudinales sistunt unguium fissiones, nunc *cruentas*, nunc *siccas*.

Tinea. 6. *Tinea unguium*, erosio, saepe cum corruptela ulcerosa contingens, dicitur. Dividitur ipsa, in *siccam* (*scabrities unguium*) et in *humidam*. Ibi, unguis speciem cariei siccae, qua superficies illius aspera, friabilis, inaequalis, et substantia crassior evadit, patitur. Hic, unguis mollis, rugosus, hinc inde corruptus fit et saniem cruentam largitur.

Mollities. 7. *Mollities unguium* praeter quam quod utpote symptoma tineaе humidae unguium in conspectum venit et per se locum habere potest. Tanta hoc in casu observatur unguium flexibilitas, ut, quin rumpantur, prout libet, curvari possint.

Lapsus. 8. *Lapsus unguium*, dicitur secessus spontaneus unguis ab uno alterove digito.

Pterygium. 9. *Pterygium unguium* est prolongatio sive ex-crescentia epidermidis super radicem unguis.

§. XCVIII.

siol. cap. XVI. §. 51. — *Breslauer Sammlung von Natur und Medicinengeschichten*. 1725. p. 104. — *Commerc. Litterar. Norimb.* 1734. p. 173. — AND. BONN descriptio thesauri ossium morbosorum Hoviani. Amsterd. 1783. p. 145. — SAILLANT *mémoire sur la femme dite aux ongles*. Paris 1776. *Journal de médecine*. T. 51. p. 284.

83) Caro luxurians, fungosa.

§. XCVIII.

Caussae. Diagnosis. Prognosis. Cura.

1. *Seline* nunc ex carie sicca, nunc ex ab-*Caussae.*
cessulo sub ungue, — *ecchymoma* a pressura super
unguem vel à contusione, vel a corporibus extra-
neis sub ungue introductis, oritur. *Onychogry-*
posi, neglectus munditiei sive abscissionis un-
guium, — et *arcturae*, resectio nimis profunda
unguium calceique angusti, ansam porrigunt. *Fis-*
sura unguium cruenta, ab instrumentis acutis, *sic-*
ca, a lue leprosa sive venerea oritur. Hisce caus-
sis ac praeterea laesioni radice unguis sub labori-
bus gravibus, nec non *pulici penetranti* sese sub
unguibus insinuant, *tinea u.* originem debet.
Idem de *mollitie unguium* aliquando in chlorosi
observata dicendum est: *Lapsus unguium* inter-
dum veneni effectum sistit,

2. Consideratio unguium in morbis praeser-*Diagnosis.*
tim in paralyti⁸⁴⁾, sub frigore febrili, in hydro-
thorace, in chlorosi, in lepra et in plica, haud ne-
gligi debet. Vitia unguium caeterum satis ex
dictis elucet.

3. Unguium morbi, debito concessio tempore, *Prognosis.*
plerumque medelam non excludunt. Saepius un-
guis lapsa, quamvis haud semper debita forma⁸⁵⁾
rege-

84) LODER *medic. chirurg. Beobacht.* Jena 1794.

85) PLENK l. c. p. 185. in not.

regeneratur, quod et de resecta digiti phalange fertur ⁸⁶⁾).

Cura.

4. Ad *seline* et ad *cariam siccam* unguis curandam, pars affecta; donec macula evanescat, ope vitri raditur. Latente sub ungue obscessulo, facta cum cultro rasura, puri exitus procuratur. *Ecchymomati* fomenta ex oxycrata sive vino, non neglecta interdum extractione corporis peregrini, prospiciunt. *Curvatura* aut abnormis *unguis longitudo*, forfices vel serram exposcit. Praesente *arctura* dimidia unguis pars, donec margo illius lateralis promineat, vitro raditur, positus dein sub ungue filamentis carptis. Ulcus, si purum, aqua saturnina exsiccatur, aliàs detergens illi imponitur ⁸⁷⁾. *Hypersarcosis* nitrate argenti fuso ⁸⁸⁾ auferitur. Destituta debito effectu hac methodo, unguis a margine usque ad radicem scinditur ac illius in carnem intrusa pars, extrahitur ⁸⁹⁾. *Fissurae u. cruentae*, conjunctio partium separatarum, — *siccae*, cura, caussae accommodata, mederi valet.

86) TULPII obs. med. Lib. 4. cap. 56. p. 370.

87) E. c. R. Vini albi libram unam. Viridis aeris, aluminis, mellis aa. drachmas sex. Ebulliant paullo invicem et d. usui externo. (BALDINGERS neues Magazin für Aerzte. 3. B. 18 St. p. 26).

88) Lapis infernalis.

89) BICHAT in DESSAULT auserl. chirurg. Wahrnehmung. 3. B. No. 242. — DESSAULT chirurgischer Nachlass. 2. B. 4. Th. p. 252.

valet. *Tineae siccae* u., frustulum lardi, per nonnullarum hebdomadarum curriculum, superimponitur. *Tinea humida* et *mollities* u. saepe remediis universalibus e. c. vigente chlorosi, ferro ⁹⁰⁾, curandae sunt. Parti a *lapsa unguium* denudatae, pulvis finissimus thuris sive masticis inspergitur, ac cera alba, unguis formam referente, cooperitur. In *pterygio unguis*, epidermis cultro obtuso ab ungue separatur, removeturque.

CAP. XXV.

De Vitiis Pilorum.

§. XCIX.

Generatim.

1. Crines humani, pili quadrupedum, plumae ^{Introductio.} avium, tum physiologo, tum pathologo amplum investigationis offerunt campum.

2. In eo excolendo praecipue PLEMPIUS ⁹¹⁾, Scriptores, GLISSONIUS ⁹²⁾, MEIBOMIUS ⁹³⁾, RONDELET ⁹⁴⁾,

WIT-

90) NIEMANN Diss. epistolica de foeda unguium mollitie puellae chloroticae, martialium usu feliciter curata. Magdeb. 1774.

91) De affectibus capillorum et unguium. Lovan. 1662.

92) App. med. anatom. Lugd. Bat. 1691. T. III. p. 47.

93) Diss. de pilis eorumque morbis. Helmstädt 1704.

94) Opp. — Cap. de alopecia ex morbo gallico,

WITHOFIUS⁹⁵), SALWIKIUS⁹⁶) et KNEITROFFIUS⁹⁷)
insudarunt.

Varia vitia 3. Vitia pilorum sive colorem, sive copiam,
sive figuram respiciunt.

Color ab- 4. Crines cerulei, virides⁹⁸), vere flavi⁹⁹)
normis. aut ante senectutem albi, abnormes declarantur.

Copia ab- 5. Abnormes declarantur et pili vel *inconsuetas*
normis. loca occupantes, e. c. universum corpus¹⁰⁰), fa-
ciem¹⁾, dorsum²⁾, abdomen³⁾, membranas ce-
rebri

95) De pilo humano. Duisb. 1750.

96) Diss. de morbis pilorum. Frid. 1777.

97) Von den Haaren. Roth. 1777.

98) Tales apud homines cuprum pertractantes pluries con-
spexi. Vide et BARTHOLINUM (Histor. anat. cent. I.
obs. 40. T. I. p. 65) et PAULLINI (misc. nat. Cur.
Dec. II. an. 4. app. obs. 33).

99) RIEDLIN lineae medicae a. 1697. Feb. obs. 7. p. 88.

100) BARTHOLIN. l. c. cent. V. hist. 24. T. III. p. 41. —
PLATER obs. med. Lib. III. p. 590. — VALISNIERI
opp. Venet. 1733. Vol. II. p. 278. — BANG de mon-
stro Hafniae nato 1767 in collect. Hafn. Vol. I. p. 92.
Tab. 4. — BOSE de praeternaturali pilorum proventu.
Lips. 1776.

1) Breslauer Sammlung. 1720. p. 672. Misc. N. Cur.
Dec. II. an. 4. obs. 163. p. 348.

2) GILIBERT Samml. prakt. Beobacht. übersetzt von HE-
BENSTREIT p. 56.

3) OSIANDER Denkwürdigkeiten aus der Geburtshilfe. 2.
B. 2s St. p. 407. Journal général de médecine, chirur-
gie et Pharmacie 1813. Janvier. Observante MARTIN:
ex intestino recto crines pendebant.

rebre 4), testiculos 5), tumores 6), ovaria 7) — vel copia et pondere incommoda producentes 8), vel longitudine formam laedentes 9), vel deficientes.

6. Ad crines *figura* peccantes pertinent capilli, Figura abnormes. vel praeter modum tenues 10), vel sub forma setarum comparentes 11), vel adipe sive oleo obliti 12), vel apice fissi, bifurcati aut trifurcati 13), vel inter se implicati ac intorti 14).

7. *Canitiem* et *lapsum capillorum* peculiari Peculiaris consideratio. examini subjiciemus.

4) MOROAGNY l. c. Epist. 24. 4.

5) SCHAARSCHMIDT *medic. und chirurg. Nachrichten* Jahrg. 3. p. 88.

6) PACONIS et PYTHAGORAE exercitat. anat. 83. — SANDIFORT museum acad. Lugd. Vol. I. sect. 3. p. 124.

7) BLANCARDI anat. pract. national. cent. II. obs. 27. — DE LA FONTAINE *chirurg. medic. Abhandl.* — *Acta mea Clinica*. Vol. I.

8) Cephalea a nimia capillorum copia mihi pluries obvenit.

9) Collect. academ. T. III. p. 168.

10) *Leptotrichia* a GRAEC. λεπτός, tenuis, et ῥιζή, pilus.

11) *Chaitosis* a GRAEC. Χαίτη seta. (Obvenit apud infantes atrophicis ad dorsum, ad brachia etc.).

12) *Liparotrichia* a GRAEC. Λίπος et ῥιζή, pilus.

13) *Schizotrichia* a GRAEC. Σχιζω, fido, et ῥιζή, pilus.

14) *Trichoma* a GRAEC. Τριχάς, pili.

J. C.

§. C.

C a n i t i e s.

Definitio. 1. *Canities* ¹⁵⁾ mutatio capillorum in colorem album ante legitimam aetatem, dicitur.

Symptomata. 2. Vitium de quo agitur, sane haud rarum ¹⁶⁾, vel ad extremitates, vel ad basin capillorum originem ducit. Citissime dein totus pilus, nunc in universum, nunc in parte tantum, canescit. Vel post mortem id contigisse fertur ¹⁷⁾.

Caussae. 3. *Canities* vitium sistit nunc haereditarium ¹⁸⁾, nunc congenitum ¹⁹⁾, nunc a morbis praegressis e. c. a cephalalgia, a terrore ²⁰⁾, ab animi curis ²¹⁾, nunc a vitio leproso ²²⁾, cancro-

SO

15) *Poliosis* a GRAEC. Πολωσις, *canities*. GERM. *graue Haare*. GALL. *Cheveux blancs*. ANGL. *Greyhair*. ROSS. СЪДИНА: POLON. *Siwizna*.

16) HANNEMANN Misc. nat. Cur. Dec. II. an. I. obs. 69. — VOIGTEL op. c. 1. B. p. 89. — ZEILER Epist. cent. I. p. 17. — PLENK l. c. p. 242.

17) GRÜNDEL Eph. N. C. Dec. II. an. 3. obs. 103.

18) ZWINGER Theatrum prax. medic. p. 369.

19) E. c. apud *albinos*.

20) SCHENK obs. med. rarior. lib. I. de capite. Obs. 1. HANNEMANN l. c. an. 4. obs. 60. — BONET medic. septentrional. collect. T. I. p. 10. — DOUTE, ergo *canities* a timore. Paris 1657. — *Fränkische Samml.* 4. B. p. 464. — MARC. DONATUS de medica histor. mirabili p. 1.

21) *Judaei poloni*, continuis negotiis et curis obruti, citissime canescunt.

22) Cap.

60²³⁾, nunc a nulla evidenti causa²⁴⁾ pendens. Quamvis crines cani radices minimas exhibeant²⁵⁾, attamen canitiem a defectu nutritionis sive ab exsiccatione medullae capillorum, ob id quod, imprimis ad barbam, aliorum crinium instar crescant, repetere nequimus.

4. Canities nequaquam in longaevitatem in-Prognosis. fluit. Pili cani subinde iterum subflavescent.

5. Ad retardandam canitiem nimia capitisamenta, capillorum frequens evulsio²⁶⁾, lotio in aqua dulci, aëque crassus, calidus, vinum forte, repetitae indigestiones evitari, ac alvus rite aperta teneri debet²⁷⁾. Et caro viperina, et frequens masticatio *myrobalanorum chebulorum*²⁸⁾, hic laudantur.

Bb 2

dantur.

23) WITHOFF l. c. p. 387.

24) *Memoirs of the medical society of London* 1792. Vol. 3.

25) WITHOFF l. c.

26) Hippiatri stellas albas in equis per frequentem evulsionem crinium faciunt. (MERCURIALIS l. c. cap. 6).

27) MERCURIALIS l. c.

28) R. Miobalanorum nigrorum absque nucleis drachmas quadraginta. Gingiberis, amios aa drachmas decem. Irrorentur cum butyro et deinde distemperentur cum penidiis ad quantitatem mediae partis totius medicaminis. Deglutatur saepe drachma una hujus confectionis.

dantur. *Modus canitiem occultandi* apud MERCURIALEM ²⁹⁾ et FORESTUM ³⁰⁾ addisci potest.

§. CI.

Lapsus. Pilorum.

Scriptores
et divisio.

1. *Lapsus pilorum*, de quo HEILAND ³¹⁾, AMPFING ³²⁾, SAND ³³⁾, PEEIFFER ³⁴⁾, HEISTER ³⁵⁾, GENSEL ³⁶⁾, DELIUS ³⁷⁾, HORSTIUS ³⁸⁾ scripserunt, varias in species dividi solet ³⁹⁾.

Madesis.

2. *Madesis* ⁴⁰⁾ pilorum vel capillorum dicitur lapsus transitorius, paulatim et sparsim ita factus, ut pili, nulla in totum denudata parte, tantum rariores evadant.

3. Alo-

29) L. c.

30) Lib. VIII. c. X. obs. 10.

31) Diss. de calvitie. Francf. 1602. Ejusdem Diss. de alopecia et omphiasi. ibid. 1612.

32) Diss. de alopecia et omphiasi. Rostock. 1676.

33) De areae generibus, alopecia et omphiasi. Regiom. 1683.

34) Diss. de calvitie. Budae 1723.

35) *Chirurgische Wahrnehmungen* p. 159.

36) Eph. N. C. Cent. I. 3. an. 1715. obs. 137.

37) Nov. Acta physc. med. N. C. T. I. obs. 25.

38) Obs. singular. Lib. II. obs. 28. et annot. medic. physc. Wratilaw. tentam. XI. p. 210. et XIII. p. 335.

39) SWEDIAUER l. c. p. 764.

40) A GRAEC. *Μάδης*, pilorum defluvium transitorium.

3. *Alopecia* ⁴¹⁾ pilorum capitis, vel barbae aut Alopecia. superciliorum defluvium sistit, relicta area instar vitii, cui vulpes annosiores saepe subjectae sunt.

4. *Ophiasis* ⁴²⁾ capillorum est defluvium, for- Ophiasis.
ma serpentina. Vitium quandoque ab occipite utrinque ad aures usque extensum serpit, latitudi-
ne duorum fere digitorum transversorum, ali-
quando etiam ultra aures ad ipsam frontem usque
ascendens.

5. *Phalacro-sis* ⁴³⁾ defluvium nuncupatur ca- Phalacro-
pillorum, potissimum a sincipite, permanens; seu sis.
glabrities capitis ex lapsu capillorum non rena-
scentium.

6. Lapsus capillorum, ne de artificiali ⁴⁴⁾, vel Causae,
fortuita crinium evulsione loquamur, sequentes
agnoscit causas: vitium haereditarium ⁴⁵⁾, conge-
nitum

41) A GRÆC. Ἀλωπηξ, vulpes.

42) A GR. Ὀφίς, serpens.

43) A GR. Φαλακρότης, calvities, — GERMAN. Kahl-
kopf, — GALL. Chauveté, — ANGL. Bald head, —
ROSS. лысина, — POLON. Łysina.

44) ARETAEUS in morbis soporosis evulsionem capillo-
rum ad excitandos aegros commendat; cujus operatio-
nis discrimina comprobatur STALPARTUS VAN DER WIEL
(Obs. rar. T. II. obs. 8. p. 59).

45) HIPPOCRAT. lib. de aëre, locis et aquis. — PRO-
COPIUS de morbis haereditariis. Erlangae 1758. §. 55. —
ROUGEMONT über die erblichen Krankheiten, aus dem
Franz. Frankf. 1794. p. 80. — TOURNEFORT Voyage
en Levant. T. I. p. 333.

nitum ⁴⁶⁾, epidemicum ⁴⁷⁾, febres, cepheas, erysipelas capitis, puerperium, phthisin, atrophiam, diarrhoeam, venerem nimiam ⁴⁸⁾, sturdia ⁴⁹⁾, curas, syphiliden ⁵⁰⁾, lepram, tineam capitis, plicam, pediculos, ferrum ad crispandos capillos calide nimis admotum, acuum comatoriorum abusus ⁵¹⁾, neglectum mitellae nocturnae, pulverem cyprinum calce mixtum, venena ⁵²⁾, mercurium ⁵³⁾ et ignotam demum corporis dispositionem

46) DANZ in STARKS *Archiv für die Geburtshilfe*. 4. B. p. 684. AUGUSTIN in ΑΣΚΑΠΙΕΙΟΝ *Jahrgang* 1812. 38. *Heft*.

47) SEB. EGBERTI apud SWEDIAUER l. c. p. 765. in nota.

48) Auctor libri HIPPOCRATIS: de natura pueri. ARISTOTELES, *problematum* sect. 4.

49) SYNESIUS prudentiam et pilos inimicitiam habere asserit (*Libro de calvitie*). *Lege et Gazette de France* 23. *Feb.* 1763.

50) MORGAGNI op. c. *Epist.* 46. 2.

51) Plurimae Insubriae Rusticae ophiassi laborant, quod maxime ex usu capillos ope acuum majorum comatoriorum connectendi repeti posse arbitror.

52) „Defluit expulsus morbo latitante capillus,
„Si vero lavetur, seu vis epota veneni,
„Seu salamandra potens nullisque obnoxia flammis
„Eximium capitis tactu dejecit honorem.“

53) FORESTUS l. c. obs. 5.

nem ⁵⁴⁾, feminis ⁵⁵⁾, spadonibus ⁵⁶⁾, et coecis natis ⁵⁷⁾, vix unquam propriam.

7. In diagnosi lapsus pilorum, inprimis determi- Diagnosis.
nari debet, utrum malum ex vitio locali aut universali
pullulet? Hoc ultimo in casu signa variarum dia-
thesium, inprimis leprosaе et venereaе, perpen-
denda sunt. Latens adhuc lepra, interdum per
peculiarem aegri physiognomiam cognoscitur. De-
fluvium pilorum syphiliticum (*Pilarella*, *Pela-*
da) potissime barbam et supercilia afficere solet.
Tandem sciendum est, lapsum capillorum, in ju-
venibus robustis, succi plenius nonnunquam ple-
thorae originem debere ⁵⁸⁾.

8. Defluvium pilorum sub morborum curriculo Prognosis.
signum lethale constituit ⁵⁹⁾. Madesis convale-
scentium tertio circiter a lapsu capillorum mense
reparari solet ⁶⁰⁾. Lentius supercilia crescunt ⁶¹⁾.

Vari-

54) HEISTER in Misc. N. C. Dec. I. an. 2. obs. 103.

55) GALENUS 6. Aphor. 27. — ARISTOTELES 5. de ge-
neratione animalium. c. 3. — Feminam tamen formo-
sam ac sanam absoluta phalacroxi laborantem vidi.

56) ARISTOTELES l. c. sect. X. probl. 56. — SLEVOGT
Diss. de spadonibus. Jenae 1690. — WITHOFF Diss. de
castratis. Lausan. 1762.

57) ARISTOTELES l. c. sect. XXXI. probl. 5.

58) FORESTUS l. c. obs. 3.

59) HIPPOCRAT. 5. Aphor. 11. et 12.

60) HALLER Elem. Physiol. Vol. V. lib. XII. sect. 1.
p. 38.

61) HALLER l. c.

Varices calvitiei obstare ⁶²⁾, falsum est. Ophiasis facilius quam alopecia curatur. Lapsus crinium senilis, leprosus, et ex destructione bulborum oriens, insanabilis est; ille ex caussa venerea aut ex tineâ, devicto morbo primario, sanationis spem relinquit. Detracta licet cute capillus renasci potest, quem vero cicatrix locum defoedat, hunc pilus nec unquam ornabit ⁶³⁾. Idem si pallida aut insensibilis fuerit area, accidit ⁶⁴⁾.

Cura.

9. Veteres medici hypothesibus scholae Galenicae addicti, defluvium pilorum, tum regimine diaetetico, tum remediis localibus, curare satage-
runt, ac revera, syphilide excepta, vix auxiliis universalibus locus conceditur. Abstinencia a cibis flatulentis, a caseo, a baccho et venere, atque diaeta demulcens facilis digestionis e. c. cerebella animalium, jura gallinarum et caponam, maxime commendabantur ⁶⁵⁾. Cura localis ab evulsione crinium forte corruptorum orditur ⁶⁶⁾. Pars dein, nisi agatur de convalescente aut de aegro plicoso, raditur, ac ita linteo aspero perfricatur

62) HIPPOCRAT. 6. aphor.

63) HALLER l. c.

64) ZACUT. LUSITAN. op. c. lib. VII. c. i. p. 5.

65) FORESTUS l. c. obs. 8.

66) „Sicuti agricolae prius radices putridas et inutiles auferunt, antequam semina terrae committant.“ Mercurialis l. c.

tur, ut cruor in conspectum veniat ⁶⁷⁾. Sunt qui cum *cepa* ⁶⁸⁾, aut cum *pulvere apum* ⁶⁹⁾ frictionem instituunt. Latente plethora, vel cutis siccitate, potius lotio ex decocto herbae malvae ac deinunctio ope olei seminum lini, amygdalarum et olivarum conducit ⁷⁰⁾. Permulta alia ad pilos revocandos commendata fuere, e. c. *oleum anethi*, *myrtillorum*, *therebinthinae*; *adeps viperæ*, *ranarum*, *ursi*; *axungia* vetus sed præcipue derasa axibus rotarum; fex ampullae lucernariae, *pix* liquida aut sicca, oleo liquefacta; *sulphur*, *cinis tithymelorum*, *muscarum*, *murium*, *ranarum*, *scorabeorum*, *ostreorum*, salsorum piscium, amygdalarum amararum, cum oleo, aqua prima mellis, urina, cataplasma ex stercore animalium, ex muscis tritis, inter quae remedia communi consensu *gummi ladanum* primum occupat locum. Si pars radi nequeat, aqua ex connubio limacarum rubrarum et sale emergens ⁷¹⁾, aut oleum in quo ladanum, absynthium, baccae juniperi contusae linteoligatae, per quinque dies infusa et dein expressa fuere ⁷²⁾ madesi obstant. — Ad pilos abnormes
eradi-

67) HALLERUS l. c.

68) FORESTUS l. c. obs. 6.

69) Ibid. obs. 1.

70) Ibid. obs. 8.

71) Ibid.

72) HALLERUS l. c.

eradicandos, unguentum ex auripigmento, calce viva et melle, adhiberi solet. Nisi locus hirsutus amplius fuerit, applicatio *succi herbae cheidonii majoris* conducit.

CAP. XXVI.

De Strophulo.

§. CII.

*Definitio. Historia. Formae.
Causae.*

Definitio. 1. *Strophulus* eruptio cutanea est, curriculo primi vitae anni, praecipue ad faciem extremitatesque superiores, sub forma papularum, nunc rubrarum, nunc albarum, obveniens.

Historia. 2. Arabes, strophulum sub nomine *Bothor infantum* descripsere ⁷³⁾. Dein a singulis, morbos infantiles perlustrantibus auctoribus ⁷⁴⁾, descriptus est. Graphice, at, ni fallimur, subtiliter nimis illius doctrinam WILLAN ⁷⁵⁾ exposuit.

3. Stro-

⁷³⁾ AVICENNA Lib. I. Fen. 2. Doctr. 3. cap. 3.

⁷⁴⁾ P. I. Vol. I. Prolegom. §.

⁷⁵⁾ Op. c. p. 14. Tab. 2. 3. 4.

3. *Strophulus, primis a nativitate mensibus*, Formae. sub forma *papularum* discretarum, rubrarum ⁷⁶⁾, sive albarum ⁷⁷⁾ ad genas, antibrachia, dorsum manuum, raro ad universum corpus, comparere solet. Papulae subinde punctis maculisque rubris intermixtae cernuntur, et ad manuum dorsum aliquando *pustulae*, sero flavo repletae, mox evanescentes in conspectum veniunt. *Strophulus*, inter *quartum* et *quintum aetatis mensem* prorumpens, ex *papulis* circularibus, magis confertis ⁷⁸⁾, profunde rubris, eadem loca occupantibus, constat. *Octavo mense* *strophulus* praeterea extremitates inferiores occupat et hinc inde a capite per universum corpus migrat ⁷⁹⁾. Eadem eruptio cutanea, *primo vitae anno versus finem vergente*, interdum formam *papularum* maximarum, albarum, discretarum, lumbos, scapulas et antibrachia obsidentium, induit ⁸⁰⁾. In genere, sub curriculo *strophuli* infantes sereni sunt et caeterum

76) *Strophulus intertinctus* WILLANII. GERM. Schälblattern, Hitzblüthen, das rothe Ausfahren, Gesänte, Hautblattern; Ausgesprenge, Schälliesen. GALL. Efflorescence benigne. ANGL. Red-gum. ROSS. ЦѢВѢВЪ РАЗСЫННОЙ.

77) *Strophulus albus* W. — ANGL. White-gum.

78) *Strophulus confertus* W. — GERM. Zahnausschlag, unächte Krätze. ANGL. Tooth rash, the rank. ROSS. ЦѢВѢВЪ СИЛОШНОЙ.

79) *Strophulus volaticus* W.

80) *Strophulus candidus* W.

terum bene valent; sunt tamen, praesertim dum eruptio circa quintum mensem contingit, qui irrequieti fiunt, febrem, vomitumque patiuntur, ac linguam albam et marcorem exhibent.

Caussae.

4. *Causa* strophuli, quae vulgo in acido primarum viarum, in prava lactis conditione et in ventriculi imbecillitate quaeritur, utpote saepissime apud infantes robustos comparens potius in nimio humorum ad cutem affluxu locari debet. Praeterea strophulus post quintum mensem maxime cum dentitione cohaeret. Interdum is aliorum morborum veluti crisin constituere videtur.

§. III.

Diagnosis.

Facilis
confusio.

1. *Strophulus*, ne dicamus de ictibus insectorum, cum *erysipelate recens natorum*, cum *morbillis*, cum *rubeola*, cum *variola*, cum *erythemate*, cum *hydroa*, cum *psydracia* et cum *tinea faciei* confundi potest.

Distinctio
ab erysi-
pelate re-
cens nat.

2. *Strophulus* solummodo dum febre stipatur, cum *erysipelate recens natorum* confundi posset.

Erysipelas R. N.

- a. Paucis a partu diebus ingruit.
- b. Gravia eruptionem praecedunt symptomata.

Strophulus cum febre.

- a. Circa quintum mensem comparet.
- b. Sine prodromis, sub adpectu levioris morbi, occurrit.
- c. Ordi-

b. Orditur a nucha, umbilico, ab extremitatibus et a genitalibus.

c. Ruborem diffusum, livescentem, exhibet.

c. Orditur plerumque a facie.

d. Papulas circulares, sive coccineas, sive profunde rubras, offert.

3. Symptomata coryzae, morbillos satis a *strophulo* distinguunt. Quoad rubeolam major in diali, a rubeola et a variola, diagnosi difficultas esset, nisi ea spatio paucorum dierum, — *strophulus* autem, etiamsi interdum febrilis, plerumque post aliquot tantum hebdomadas, terminaretur. Variola a *strophulo* cum vomitu ingruente, praecipue habita ratione morborum regnantium ac vaccinae, dignoscitur.

4. Cum *strophulus* papulas ubique sparsas, *Distinctio ab erythemate.* *erythema intertrigo* autem ruborem aequalem inter *oplicas cutis* sedem figentem referat, distinctio haud ardua evadit. Idem rubor aequaliter diffusus cum secessu epidermidis, *erythema recens natum*, quod supra descripsimus ⁸¹⁾, evidenter a *strophulo* distinguit.

§. CIV.

Prognosis. Cura.

3. *Strophulus* omni periculo vacat, dummodo *Prognosis.* retrocessus, saepe diarrhoea, vomitu, inflammationibus

81) Cap. XX. §. LXXXVIII. 9.

tionibus viscerum insignitus, impediatur. Quamvis hinc inde accidat, strophulum breve admodum curriculum absolvere, plerumque tamen ad plurimos menses, per repetitos eruptionis insultus, extenditur. Desquamatio raro et solum ad brachia observari solet. *Aphthae* nobis simul cum *strophulo* obvenerunt, igitur unum ab altero, ut WILSON credit, non liberat malo.

Cura.

2. *Strophulus* in infante vegeto nulla medela indiget. Temperaturae debitae hinc solum ratio habenda est. Praesente febre et alvo perturbata, *nitratis potassae* sive *magnesiaae* purae aliquot grana cum *syrupo* sive *fraxinus orni*, sive *rhei*, non neglectis in proVectiori morbo *balneis tepidis*, ordinem componunt. Diutius perseverante *strophulo* cum inquietudine et macie, *infusum herbae violae tricoloris* cum successu adhibetur.

CAP. XXVII.

De Urticatione.

§. CV.

Definitio. Historia. Symptomata.

Causae.

Vitium cutis adpectu urticariae simile sed *Definitio.*
 chronicum saepeque habituale ac summo pruritu
 patum, *urticatio* dicitur.

2. Plurimi quidem inter auctores *urticationis*, *Historia.*
 ab nomine *urticariae chronicae*, mentionem inje-
 re, sicuti praecipue videre est apud HEBER-
 EN ⁸²⁾ et J. P. FRANK ⁸³⁾; at nemo illam pro spe-
 ciali morbi forma ante WICHMANNUM ⁸⁴⁾ statuit.
 plurima *lichenum* exempla a WILLANIO allata ⁸⁵⁾
 hic pertinere videntur.

5. Urticatio cum magno pruritu, plerumque *Symptoma*
 crepente, aliquando praevia somnolentia, nausea, *mata.*
 phalea, artuum dolore, dyspnoea, febricula,
 et

⁸²⁾ *Medical transact.* Vol. V.

⁸³⁾ *Interpretat. Clinicae* p. 422.

⁸⁴⁾ *Op. c.* 3. Thl. p. 129.

⁸⁵⁾ *Op. c.* p. 24—36.

et interdum proxime ante menstruum periodum⁸⁶⁾, sub *forma triplici, macularum* scilicet *papularum* et *tuberculorum*, potissime ad brachia, dorsum manuum, truncum, collum, raro ad faciem erumpit, sub lecti tepore evanescit (alias maxime prurit), sub aëre libero et post lavationem redit, concessis liberis intervallis, interdum per plures menses graves patientibus, caeterum valentibus molestias affert, ac, nisi aeger scalpat, excepta nonnunquam furfuracea desquamatione, sine reliquiis desinit. *Maculae* et *papulae*,⁸⁷⁾ colorem fructus rubi idaei vel et livedinem cum cute aspera exhibent. *Tubercula* alba, dura, basi inaequalia, noctu praecipue valde pruriunt ac morbum, si dictum *tuberculosum*⁸⁷⁾ constituere videntur.

Causae.

4. Urticationi imprimis obnoxii sunt: homines climatibus septentrionalibus haud adsueta, cuncti tenera instructi, imprimis infantes, feminae et maxime hystericæ, ita hypochondriaci nec non haemorrhoidarii. Potissime a transpiratione suppressa, ab animi pathematibus excitatur, quamvis haud raro et sine nota causa obveniat. Contagii urticatio nullum suspicionem movet.

86) SAMUEL VOGEL *Handbuch der Arzneiwissenschaft*, 3. Th. p. 275.

87) *Phymatosis* SWEDIAURI, a GRAEC. Φῦμα, tuberculum. ARAB. Sorah, seu, sara. ANGL. Chronical nettle rash.

§. CVL

*Diagnosis. Prognosis. Cura.*1. *Urticatio cum urticaria et cum psydracia* *Diagnosis.*

potius quam cum *psora*, ut WICHMANN crediderat⁸⁸⁾, confundi potest.

*Urticaria.**Urticatio.*

a. Morbum *acutum* sistit.

a. Ad morbos *chronicos* pertinet.

b. Quolibet anni tempore observatur.

b. Morbus est praecipue hyemalis.

c. Aegros lecto plerumque affligit.

c. Aegri praeter pruritus nullum experiuntur morbi sensum.

d. Vix pluries eundem hominem invadit.

d. Morbum habitualement constituit.

2. *Urticatio* malum, periculo destitutum, at *Prognosis* valde incommodum et taediosum sistit.

3. Tueatur aeger a refrigerio, prospiciat transpirationi, habeat *balnea tepida*, et illiniat, in rebus mali, partes affectas *unguento demulcente*. Interne *decoctum radices smillaeis sarsaparillae ac pilulae ex resina quajaci officinalis, camphora, sulphurati stibii et mercurii*, nec non *extracto herbae solani dulcamarae*, conducunt. Si haemorrhoides subfuerint, *sulphur* cum lenis alvum evacuantibus indicatur. *Acido sulphurico* cum *infusione*

Cura.

⁸⁸⁾ L. c. p. 147.

sione rosarum vel cum decocto corticis cinchonae, utitur WILLAN ⁸⁹⁾.

CAP. XXVIII.

De Hydroa.

§. CVII.

Definitio. Causae.

Definitio. 1. Papulae, saepe pustulae, grano milii aequales, vel et majores, derepente cum pruritu orientes, fugaces, in squamulas sive exiguas crustas abuendae, hydroa ⁹⁰⁾ salutantur.

Causae. 2. Hydroae homines climatibus calidis non adsueti ⁹¹⁾, ac aestivo tempore sese aurae nocturnae

⁸⁹⁾ L. c. p. 34.

⁹⁰⁾ A GREG. 'ῥόγῳ, sudor. — Phlyzaktion SWED. — A GRAEC. Φυδρανίων, bulla, seu vesicula.

⁹¹⁾ Germani, Poloni, Italiam adeuntes, primis annis ita hydroa laborare, ac Itali et Galli, Rossiam petentes, urticatione affici solent. Frequentissime autem hydroa sudamen in regionibus tropicis obvenit (ANGLICE: Prickly-heat) ac ideo a WILLAN, lichen nuncupatur tropicus (l. c. p. 36). Pulchre hunc morbum WINTER-BOTTOM apud WILLAN descripsit. Ita CLARK (observations on the diseases of seamen in long Voyages. Vol. I. p. 34). MOSELY (on the diseases of tropical climates p. 20) et CLEGHORN (on the diseases of Minorca ch. 4).

nae frigidiusculae incaute exponentes, inprimis subjiuntur. Excitatur a sudore copioso sive spontaneo sive artefacto, a balneis frigidis meridianis horis adhibitis, ac verisimiliter a rebus heterogeneis, febrium, spasmodorum et evacuationum suppressarum, praecipue lactis ⁹²⁾, menstruorum, urinae ⁹³⁾ caussa, ad cutem depositis.

§. CVIII.

D i a g n o s i s.

1. Hydroa in sudamen, febrile, nervosum et Divisio. criticum dividitur.

2. Hydroa sudamen ⁹⁴⁾ ex papulis rubris vel H. sudamen. ex pustulis confertis, nunc sphaericis ac sero albo pellucido repletis, nunc conicis et liquore flavescente turgidis, manus, brachia, crura, pedes, rarius truncum et faciem, rarissime universum corpus occupantibus, noctu inprimis prurientibus, per totum aestatis curriculum nunc evanescentibus, nunc redeuntibus, nec morbis cum copiosis sudoribus alienis, constat.

C c 2

3. Hy-

⁹²⁾ Lactis secretionem a frigore aut alia caussa suppressa, saepe hydroa, nuticum familiare malum, nasci observavi.

⁹³⁾ Hydroae, urinosum humorem continentis, LORRY mentionem injecit. l. c. p. 32.

⁹⁴⁾ GERMAN. Schwitzblätterchen, ROSS. Водянистые-пузырки. POLON. Potówki.

H. febrile. 3. *Hydroa febrile* pustulas, nunc solitarias, nunc confertas, sudaminibus majores, sub curriculo aut versus finem morborum febrilium, praecipue vitiis hepatis stipatorum, ad labia, genas, pectus, volas manuum ⁹⁵⁾ prorumpentes, mox crustis ac squamis, sine ulla cicatrice deciduis, obtegendas, sistit.

H. nervosum, criticum. 4. *Hydroa sudamen et criticum*, febrili simile, cum levamine vel spasmodum, vel aliorum malorum ad varia loca, nulla excepta parte, plerumque sine pruritu, interdum cum tumore, nunquam cum cutis rubore, erumpit.

Facilis confusio. 5. *Hydroa* potissimum *sudamen cum miliaribus*, cum *bullis*, cum *zostere*, cum *strophulo*, cum *psora*, cum *psyracia*, cum *herpete* et cum *tinea faciei*, confundi potest.

Distinctio a miliaribus. 6. Pustulas miliformes a regimine sudorifero excitatas, endemicas ⁹⁶⁾, aut forte vulnere et affectionum tetanicorum comites, nequaquam ad *miliaria* sed ad *hydroa sudamen* pertinere jam monuimus ⁹⁷⁾. Distinguuntur sequentibus:

Mili-

⁹⁵⁾ P. I. Vol. I. §. XXI. 5.

⁹⁶⁾ LINNAEUS Diss. de morbis nautarum Indiae. Upsal. 1768. Amoenitat. academ. Vol. VIII. p. 27. — GME-LIN op. c. 3. B. p. 4. 26.

⁹⁷⁾ Cap. II. §. XIV. 2.

Miliaria.

- a. Morbus acutos conco-
mitant.
- b. Aegri lectum petere
adiguntur.
- c. Prodroma specifica
agnoscunt.
- d. Vix pruritus exhibent.

Hydroa sudamen.

- a. Morbum, tempore aestivo plerumque habitua-lem, sistit.
- b. Aegri occupationibus propriis vacare queunt.
- c. Sine prodromis prorumpit.
- d. Pruritu, praesertim nocturno, stipatur.

7. *Bullae* ad magnitudinem amygdalarum Distinctio a bullis. crescere, cuti rubrae insidere, halone rubro circumdari, morbis sat gravibus supervenire et solummodo nycthemeri spatium efflorescere solent; quae singula in hydroa aliter constituta esse, supervacaneum foret repetere.

8. *Hydroa praesertim criticum*, nonnunquam Distinctio a zostere. *zosteri* ita simile observatur, ut differentia nonnisi in summo pruritu et sede hic ad unum tantummodo latus circumscripta, inveniri possit.

9. *Hydroa sudamen* sub forma papularum Distinctio a strophulo. erumpens, magnam cum *strophulo* similitudinem alit, interea illud plerumque morbum adutorum, faciem rarissime occupantem, pruritu stipatum et copiosos sudores sequentem sistit, quibus in rebus valde a *strophulo* differt.

§. CIX.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. *Hydroa sudamen* praepostere fugatum, catarrho, diarrhoea et testantibus CLEGHORN atque MOSELEY gravioribus adhuc malis originem praebet. In hominibus ad herpetem dispositis ac liquoribus fermentatis abutentibus, interdum id in ulcera mali moris degenerat ⁹⁸). Reliquas species saepe variorum morborum *crisin* constituere jam dictum est.

Cura. 2. *Hydroa sudamen* summam transpirationis curam exposcit. Sub majori pruritu, quies corporis et regimen antiphlogisticum indicantur. Retrocessus secundum regulas generales tractari debet. Caeterae hydroae, naturae committuntur,

⁹⁸) TOWNE of the disease of the Westindies p. 177.

CAP. XXIX.

De Pemphigo.

§. CX.

Definitio. Historia. Symptomata.

Causae.

Morbus chronicus, habitualis, rebellis, prae- Definitio.
 viis sive haemorrhagiis, sive spasmis, sive urinae
 difficultate, sive febre, sive universali cutis pru-
 ritu, sub forma vesicarum, bullis similium, erum-
 pens, pemphigus ⁹⁹) nuncupatur.

2. Notitia de pemphigo, illi febris bullosae; Historia.
 um qua confundebatur, posterior videtur. Debe-
 ur ea JUNKERO ¹⁰⁰), SIMONSIO ¹⁾), HALLIO ²⁾),
 P. FRANKIO ³⁾), FEICHTMAYERO ⁴⁾), BRÜCKMAN-

⁹⁹) GERM. Blasenkrankheit. Ross. Пузырчатая сыпь. (NO

POLON. Choroba Bąblista.

¹⁰⁰) Diss. Conspectus pathologiae medicae de pemphigo.

¹⁾ London medical Journal 1788. p. 310.

²⁾ L. c. in cap. nostro IV. §. XVII. 2. (9).

³⁾ Epitome Vol. III. p. 268.

⁴⁾ HUFELAND's Journal der prakt. Heilkunde 10. B. 3^{te} St.
 p. 97. — 11. B. 4^{te} St. p. 139.

no ⁵⁾, JACQUEMINO ⁶⁾, MONTONIO ⁷⁾, potissime vero WICHMANNO ⁸⁾ et BRAUNIO ⁹⁾.

Sympto-
mata.

3. Pemphigi, *sexies* nobis visi, symptomata, multifaria aequae ac intricata sunt. Nullum morbi, sine praevio alio incommodo, erumpentis casum noscimus. Praecesserunt illum: in puella decimum nonum annum agente ¹⁰⁾, *haematemesis*; — in alia viginti annorum menstruisque orbata ¹¹⁾, primum *pneumonorrhagia*, dein *aphonia* et *asthma*, empyema simulans, atque a *convulsionibus*, subsequen-
tibus *extasi*, *urina cruenta* cum sedimento calculoso, illico fugatum; — in tertia vigesimum quartum annum numerante ¹²⁾, *stomacace*, *pneumonorrhagia*, et *difficultas urinae*; — in puero septendecim annos nato ¹³⁾, *gingivae cruentae* et *febris fe-
re rheumatica*; — in vetula ¹⁴⁾, *epigastrii dolor*, *respirandi difficultas* et *ardor urinae*; — in sene tandem ¹⁵⁾, universalis ac intolerabilis cutis *pru-
ritus*.

5) HORNS *Archiv für medic. Erfahrung* 1811. p. 62.

6) *Journal général de médecine*. T. 30, p. 264.

7) *Observations sur une maladie vesiculaire*. (*Journal gé-
néral de médecine*. T. 43. Janvier 1812. p. 4r.

8) L. c. et; *kleine Schriften*. No. 15.

9) L. c. cap. nostro. cap. IV. §. cit. (14).

10) In nosocomio civico *Vindobonense* a. 1799 — 1800.

11) *Ibidem*, eodem tempore.

12) *Ibid.* a. 1800.

13) *Vilnae* a. 1812. mense Martii.

14) *Viennae* a. 1813. mense Julii.

15) *Vilnae* a. 1814.

Sttus. Similes his etiam aliorum sunt observationes. Malis prodromis, nunc, saltem pro tempore cessantibus, nunc plus minus continuantibus, intolerabilis ardensque pruritus ad cutem, in parte una sive plurimis in locis, percipitur. Examinata parte affecta maculae profunde rubrae, cui plerumque plurimae vesiculae, brevi post in unam amplam bullam confluentes, insident, conspiciuntur. Interdum autem loca a maculis rubris obsessa, primum tument ac *tubercula*, obscure rubentia, magnitudinis hinc inde nucis avellanae, exhibent, ex quibus tandem tot *vesicae*, veluti flores ex gemmis arborum, evolvuntur. Immo, ex uno tuberculo, *duas* vesicas pullulasse vidimus ¹⁶⁾, quarum una, amplissima, ex circumferentia — altera, minor, ex apice, *florum luxuriantium* instar, prodibat. In genere, bullae amygdalas longe superant et ad ovum gallinaceum, quin immo ad pugni magnitudinem accedunt. Basis earum irregularis est et plerumque halone rubro, latitudinis vel nonnullarum tantummodo linearum, vel pollicis et ultra, circumdatur, quo ultimo in casu saepe plurimae vesiculae, veluti satellites, bullam praecipuam ambiunt. Bullae hujusmodi elasticae constanter serum flavescens continent, ac, quamvis pellucidae, structuram admodum tenacem prae se ferunt, verbo, eae vesicis, ab emplastro cantharidum excitatis, omnino similes sunt. Copia admodum diversa, nunc enim solitariae nunc innumerabiles cernuntur. Pemphigus
fre-

16) In puero Vilenſi.

quentius ad pectus et ad extremitates, praecipue inferiores, obvenit, interea eum ad palpebras, ad genas, ad albugineam oculi, ad internam superficiem labiorum, ad palatum, ad vaginam, nec non ad reliqua superficiei externae loca, conspeximus. Semel tantum *unice* volas manuum et plantas pedum occupabat¹⁷⁾. Facta eruptione dolor in parte cessat, vesicae autem nisi casu aut consulto ruptantur, unius alteriusve nychthemericis spatio, resorpto sero, flaccidae et rugosae fiunt, atque tandem relictæ plaga, sponte exsiccatura, evanescent. Cicatrices inde nullae sequuntur, at interdum pro tempore maculae cupreae. Eruptiones sibi indeterminato tempore succedunt, nunc scilicet omni fere die, nunc quavis hebdomade, nunc quovis mense, nunc omni secundo circiter anno. *Pemphigi nocturni*¹⁸⁾ nullum observavimus exemplum.

Causae.

4. Ad pemphigum, haemorrhagiae repetitae, urinae difficultates, et sexus femineus disponere videntur, quamvis, licet longe rarius, vel apud mares occurrit. Feminam quandam, quoties in utero gestabat, toties pemphigo laborasse, audivimus. Ingeniosa nobis BRAUNII opinio videtur, nonnulla urinae elementa a spasmō aut aliis causis retenta et ad cutim tandem deposita, pemphigum generare, — at, est hypothesis. Idem de opinione

¹⁷⁾ In vetula Vindobonense.

¹⁸⁾ FREIGHTMEYER l. c.

ione OSIANDRI ¹⁹⁾, acidum phosphoricum hic ac-
 cusantis. fatemur. Nisi tot mala interna eruptioni
 pemphigi praecederent, eum cum WICHMANNO ab
 insectis aut vermibus (e. c. a *cysticercæ cellulosaë*)
 derivandum esse suspicaremur, ac duae ex nostris
 egrotantibus se morbum super herbam sedentes
 acquisivisse, sancte asserebant. Caeterum non
 omne id quod *bullas* excitare valet, e. c. canthari-
 des, exhalatio rhus toxicodendri ²⁰⁾, vulnus a
 morsu canis non rabidi ²¹⁾, pro causa pemphigi
 genuini declarandum est.

§. CXI.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

1. *Pemphigum*, utpote morbum chronicum, *Diagnosis.*
 habituales ac rebelles, a *febre bullosa*, exanthe-
 mate scilicet febrili, symptomatico et saepe sana-
 bili, distinguendum esse, nemo inficiabitur. Ve-
 rum distinctio hujusmodi in prima morbi accessio-
 ne, rite monente FREICHTMEYER interdum ob id
 difficillima est, quod et pemphigus cum febre in-
 vadere possit, unde repetiti insultus ad diagnosis
 hujus morbi requiruntur. In genere, pemphigus
 vesicas ampliores ac magis irregulares quam febris
bullo-

¹⁹⁾ L. c. 23 St. p. 383. OSIANDER, in infante cum pem-
 phigo nato, glandulam suprarenalem dextram cum he-
 pate concretam vidit. l. c. p. 402.

²⁰⁾ *Nouvelles mémoires de l'Académie de Berlin* 1777.

²¹⁾ *Journal général de médecine. Paris* 1812. T. 43. Ob-
 servations de M. MOUTON sur le pemphigus.

bullosa exhibet, ac, uti monuimus, sat certa prodroma agnoscit.

Prognosis. 2. Nullum hucusque exemplum genuini pemphigi perfecte fugati nobis obvenit, ac certitudo sanationis non nisi post plures annos haberi potest.

Cura. 3. Adversus pemphigum diuretica, purgantia, diapnoica, antiscorbutica, herbam violae tricoloris, ulcera artificialia, insitionem psorae, unctionem cum oleo, tonica, nervina, acida mineralia, imprimis acidum nitricum, balnea omnis generis, sulphur, mercurium, subboracem sodae, aquam calcis, potassam, sodam, dietam lacteam, animale, vegetabilem, multaue alia, — verum *omnia incassum*, adhibuimus.

CAP. XXX.

De Psora, Psoriasi et Phthyriasi.

§. CXII.

Definitio. Historia, Symptomata.

Definitio. 1. *Psora* ²²⁾, pustulas praecipue sub lecti calore prurientes, in toto corpore, fere semper excepta facie,

²²⁾ Ψώρα. Scabies. GERM. Die Krätze. GALL. La gale, ou gale. ANGL. The itch. ROSS. Чесотка. POL. Świerzb. ITAL. La rogna.

acie, sed praecipue inter digitorum interstitia, bviis, aptas communicationi et in crustas desinentes, refert.

2. Apud veteres nomen quidem *psorae* variis Historiis morbis cutis impertitum invenitur, sed, si CELUM excipiamus, eo ad aliud significandum utantur. Immo, quamvis vera doctrinae psorae fundamenta, jam a seculo decimo septimo jactauerint, illius tamen absoluta cognitio ad nostra solum tempora pertinet, opera inprimis KRAU-
H²³⁾, GULDNERI A LOBES²⁴⁾, WICHMANNI²⁵⁾, HILDEBRANDTII²⁶⁾, CHIARUGII²⁷⁾, ACKERMAN-
NI²⁸⁾, GALESII²⁹⁾ aliorumque.

3. Psora sub forma pustularum miliformium, Symptoma-
olitarium, ad fundum durarum, rubellarum, mata.
ad apicem primum pellucidarum, dein albescen-
tium, primum inter manuum digitos incipere at-
que dein sensim sensimque ad articulationem pu-
gni et cubiti, ad foveam subaxillarem et popli-
eam, nec non tractu temporis ad pectus, dor-
sum,

23) Diss. de scabie humani corporis. Lips. 1779.

24) Beobachtungen über die Krätze. Prag 1791.

25) Aetiologie der Krätze. Hannov. 1786.

26) Bemerkungen über den Krätzeausschlag. Hannov. 1797.

27) Op. c. p. 128.

28) Bemerkungen über die Kenntniss und Cur einiger Krankheit. 5 Heft. Nürnberg. und Altdorf 1798. p. 30.

29) Essay sur le diagnostic de la gale, sur les causes et sur les consequences médicales pratiques a déduire sur les vraies notions de cette maladie. Paris 1812.

sum, abdomen, crura, calcanea, rarissime, in primis apud adultos, ad faciem et collum propagari solet. Infantes qui ab ancillis psora laborantibus brachiis feruntur, morbum ad nates primum contrahunt ³⁰). Quocunque in loco impetigo se dem figat, pruritus, a lecti tepore, a cibis acris, a liquoribus fermentatis, auctum, et ad scalpendum, cui aeger non sine voluptatis sensu satisfacit, invitantem, excitat. Pustulae, sponte vel scalptu ruptae, serum a contactu aëris in crustam, nunc squamosam, nunc duram, coalescens, fundunt. Vicina cutis, in aegro systemate dermoideo praeter modum sensili instructo, facile inflammatur ac nonnunquam vel erysipelas phlegmonosum vel furunculos parvos, rodentes, ad basin circulo rubro circumdatos, refert. Saepe pustulae plurimae inter se confluentes ulcus sat amplum vel crustas erosam cutem undique coepprimentes, producunt. Sub crustis durioribus ichor, qui absorptus deleterium in universum corpus exserere solet influxum, haud raro absconditur. Praeterea vigiliae ex continuis pruritu et irritatione, nec non animi pathemata ob foedum et ignominiosum contractum morbum, pluries systema vasorum tum lymphaticorum, tum sanguiferorum, tum nervorum, tum viscerum abdominalium, in consensum trahunt. Postremo si aeger aliunde labe quadam imbutus fuerit, ulcuscula psorica, natura

30) GULDNER l. c. p. 43. not. 17.

natura propria simplicia et benigna, indolem alie-
nam, pro re nata scorbuticam, veneream, scro-
phulosam, arthriticam, induunt.

§. CXIII.

C a u s s a e.

1. Aetas infantilis, juvenilis, debilis corporis C. praedia-
constitutio, sudor, immundities, victus deprava-
ponentes.
us, temperies humida simulque calida, ad pso-
ram suscipiendam *praedisponunt*. In genere, ex-
ceptis hominibus sulphur, magnesium, mercu-
rium tractantibus aut maxime munditiei studentibus,
caeteri omnes, inter quos contra opinionem
nonnullorum et infantes atrophicos ³¹⁾ et capucinos ³²⁾
recensemus, a psora, data huic morbo op-
portunitate, haud immunes sunt.

2. Inter infinitas de caussa *excitante* psorae C. excitantes.
cholarum hypotheses ³³⁾, ea contagii specifici ³⁴⁾
verisimilior videretur, nisi certo sciremus eandem
in *caro exulceranti* L. ³⁵⁾ adscribendam esse. Vesti-
gia

31) JUST in BALDINGERS *neues Magazin für Aerzte*. 10. B.
3s St. p. 213. — GULDNER l. c. p. 47. not. 21. Multos
infantes atrophicos psora laborantes inter Judaeos
Vilnenses inveni.

32) PANAROLUS *Pentecost*. III. No. 35.

33) GALES l. c.

34) CHIARUGI l. c. p. 135.

35) GERM. *Krätzmilbe*. GALL. *Le ciron de la galle*.

gia istius opinionis apud THEIZIR ABYNZOAR ³⁶⁾ MOUFET ³⁷⁾, HAUPTMANN ³⁸⁾, HAFENNEFFER ³⁹⁾ et MEAD ⁴⁰⁾ inveniuntur, verus interea auctor HYACINTHUS CESTONI ⁴¹⁾ est. Quamvis plurimum Italiae medici eum secuti sint ⁴²⁾, attamen neque hic neque alibi, nova psorae aetiologia recipiebatur donec WIGHMANN eam iterum, ac ab omni contradictione ⁴³⁾ vindicatam ⁴⁴⁾, exposuerit, Constat enim acarum exulcerantem, ab acaro casei et farinae probe distinguendum ⁴⁵⁾, in psora tum huma-

na

36) Rectificatio medicationis et regiminis. Venet. 1549
Tract. 7. Lib. 19. p. 34.

37) Insectorum sive minimorum animalium theatrum.
Lond. 1634. cap. 23. p. 266.

38) Scrut. pestis. Lib. 1. c. 7.

39) Nosodochium, cutis affectus p. 77.

40) *Philosophical transactions* Vol. 23. for the year 1702.
p. 1296.

41) *Lettera al Sign. ANTONIO VALLISNIERI* (*Opere di*
FRANCESCO REDI T. I. Append. p. 14).

42) JOSEPH PAPA Quaest. med. Dr. JOS. VALENTI Catanensis. Catan. 1753. Quaest. 3. p. 47.

43) GROSCHMANN in BALDINGERS *neues Magazin für Aerzte*. 11. B. 18. St. p. 77. JAC. LEVI Diss. de varia scabiiei indole. Goett. 1790.

44) Op. c. secunda editio a. 1791.

45) MÜLLER edit. systematis LINNAEI. Norimb. 1775.
p. 105. — GEER *Mémoires pour servir à l'histoire des insectes*. Stockholm 1778. — LATREILLE *genera crustaceorum et insectorum*. Paris. 1806.

na, tum equorum, tum ovium ⁴⁶⁾ et quidem in recentibus et clausis adhuc pustulis, aut potius in ruga seu rima prope eas ⁴⁷⁾, debita adhibita dexterritate ⁴⁸⁾ constanter inveniri. Et modus, quo psora contrahi solet, hanc aetiologiam confirmat. Communicatur nempe per commercium cum hominibus et animalibus, imprimis equis, camelis ⁴⁹⁾ eodem morbo laborantibus, et magis adhuc per attactum vestium praecipue lanearum et linteorum infectorum, per moram in castris ⁵⁰⁾, navibus, nosocomiis, scholis, balneis publicis, lupanariis et cauponis immundis et aliorum insectorum incunabulis. Lotrices, quamvis linteis summopere infectis lavandis intentae, psoram, certe saponis gratia, vix unquam contrahunt ⁵¹⁾.

46) RUDOLPHI *Bemerkungen aus dem Gebiete der Naturgeschichte, Medicin und Arzneykunde*. 1. Th. p. 17. — WALZ. *Natur und Behandlung der Schaafräude*. Stuttgart 1809.

47) FABRICIUS *Entomologia systematica*. Bionsvig. 1805.

48) GALES l. c. p. 19.

49) LOUIS FRANK *Collection d'opuscules de médecine pratique*. Paris 1812. p. 9.

50) FROWEIN de scabie post superatum nuper bellum epidemica. Duisb. 1764.

51) ACKERMANN l. c. p. 38.

§. CXIV.

*D i a g n o s i s.*Facilis
confusio.

1. Priusquam ignominiosi morbi *diagnosis* pronuntiatur, ne eum cum *hydroa*, cum *psyracria* et cum *herpete* confundamus, probe cavendum est.

Distinctio
ab hydroa.

2. Sedes et pruritus *hydroae sudaminis* confusione hujus morbi cum *psora* facilem reddunt.

Hydroa sudamen.

a. Morbus aestivus est.

b. Pustulae copiosae sunt et *confertae*.

c. Mox evanescit, mox redit.

d. Non communicatur.

Psora.

a. Morbum omnium anni temporum constituit.

b. Pustulae *solitariae* cernuntur.

c. Constanter adest.

d. Communicatur.

Hydroa febrilis, *nervosa* et *critica*, ob id quod saepius faciem occupent, ardore potius quam pruritu stipentur, ac nequaquam communicari queant, a *psora* distinguuntur.

Divisio.

3. Divisio *psorae* in *siccam* et *humidam* nullius est momenti; non ita distinctio in *simplicem* et in *complicatam*. Illa enim sistit vitium mere locale, — haec, vitium locale, morbo universali junctum. Duratio major minorve mali, constitutio corporis plus minus gracilis, praesentia sive

sive absentia symptomatum alienam labem indicantium, ac praecipue conditio et adspectus pustularum, de illius sive complicatione, sive simplicitate testantur. In aegris enim scorbuticis et venereis, ulcuscula localia, originis psoricae, characterem labis universalis induere et aliquando ostendere solent. Quum idem in vulneribus, etiamsi a caussis externis oriantur, contingat, observatio nostra memorabilis quidem, at mira non est.

§. CXV.

P r o g n o s i s.

1. *Psora simplex* tam leve constituere solet ^{Periculum.} malum (excipe in infantibus), ut a vulgo impuro nequidem pro *morbo* habeatur ⁵²). Et spatio paucorum dierum, concessis munditie, aëre libero, diaeta selecta, separatione convalescentium ab aegrotis, sanari ea potest. Non ita sub adversa rerum positione, vel in *morbo complicato*, ubi taediosae saepe curationis est. In genere psora rarissime sponte, haud raro autem adventante gravi quodam morbo, pro tempore saltem, evanescit. Letale illius exemplum refert RUDOLPHI ⁵³).

2. Doctrina *retrocessus psorae* stricte sum- ^{Retroces-} ta, sanae rationi adversatur. Hoc autem non ^{sus.}

D d 2

impe-

52) Sic Judaei Poloni.

53) L. c.

impedit, quominus dyspnœae, dyspepsiae, infarctus viscerum abdominalium, hydropes, mictus niger⁵⁴⁾, mala nervorum, vitia cordis *) etc., quae haud raro psoram praepostere remediis externis fugatam sequuntur, tum ex prava remediorum adversus impetiginem adhibitorum actione, tum ex suppressione secretionis habitualis, quam pustulae psorae instar fonticulorum largiebantur, explicari possint.

P. critica.

3. Nec admitti potest *psora critica*. Qui aliter sentiunt, aut psoram cum hydroa et psydracia confundunt, aut impetiginem illam, versus finem morbi, sicuti in nosocomiis saepe accidit, fortuito acquisitam, pro critica habent, aut latentem jam prius psoram non animadverterunt **).

P. salubritas.

4. Psorae a nonnullis⁵⁵⁾ jactata *salubritas*, cum MUZELIO⁵⁶⁾, non aliter quam per utilitatem, quam ulcera artificialia afferre queunt, explicatur.

54) RAMAZZINI Constitutio Mutinensis a. 1691.

*) TESTA op. c.

**) Miror recentem scriptorem (NEUBURG: *klinische Bemerkungen über einige chron. Krankheiten*. Frankf. a. M. 1814).

55) JERZEMBSKI Diss. de scabiei salubritate in affectibus hydropicis. Halae 1777.

56) *Medicin. und chirurg. Wahrnehmungen*. 2. B. p. 74.

§. CXVI.

C u r a.

1. Fuga opportunitatum psoram acquirendi, Prophylactica.
mundities tum corporis, tum vestium, lavatio ope
aquae saponis, et usus rerum suaveolentium ⁵⁷⁾,
totam hujus morbi prophylacticam amplectun-
tur ⁵⁸⁾.

2. Cur adversus psoram simplicem vel succum C. ps. sim-
herbae nicotianae tabaci, gravissimis interdum plicis.
symptomatibus ansam porrigentem ⁵⁹⁾, vel deco-
ctum seminum delphinii staphidis agrii ⁶⁰⁾ cutim ni-
mis irritans ⁶¹⁾, vel alia, helleborum scilicet album ⁶²⁾,
inu-

57) REDI l. c.

58) Reichsanzeiger 1802. p. 3537.

59) Medical commentaries. Vol. I.

60) RANQUE praescribit: R. Pulveris seminum delphinii
staphidis agrii unciam semis. Extracti papaveris somni-
feri drachmas duas. Aquae fontis libram unam. Co-
que per tertiam horae partem. D. Sr. usui externo
praemissa agitatione vasis. (*Mémoire et observations
cliniques sur un nouveau procédé pour la guérison de
la gale.* Orleans et Paris 1811).

61) GALES l. c. p. 46.

62) PRINGLE praescribat: R. Pulveris radices hellebo-
ri albi drachmas duas. Florum sulphuris unciam
unam. Axungiae porcinae uncias duas. M. Quarta
corporis pars singulis vicibus ad noctem cum hoc un-
guento inungitur (op. c. cap. 8). HEBERDEN unam
radicis hellebori partem cum octo partibus axungiae
misce-

inulam helenium ⁶³), *clematidem vitalbam* ⁶⁴), *ledum palustre* ⁶⁵), *bellidem minorem* ⁶⁶), *acidum sulphuricum* ⁶⁷), *nitricum* ⁶⁸), *muriaticum* sive commune ⁶⁹), sive *oxygenatum* ⁷⁰), *sulphatem zinci* ⁷¹),

carbo-

misceri jubet (Comment. de morb. hist. et curat. p. 104). Cutem inde inflammari DONALDUS MONRO jam dudum monuit.

63) BRUCKMANN radicem inulae helenii decorticatam cum aqua ad consistentiam pultis coqui, et butyrum recens, ut fiat unguentum, addi jubet (*Sammlung aus-erles. Abhandl. für prakt. Aerzte.* 10. B. 26 St. p. 364).

64) WATSON *Journal de médecine.* T. 87. p. 210.

65) LINNAEUS *Amoen. acad.* Vol. VIII. p. 283.

66) HUNDERTMARK herbam expressam cum butyro calido ad consistentiam unguenti, quo partes affectae inunguntur, coqui suadet. (*Diss. de scabie artificiali* p. 27).

67) HELWICH *Diss. de olei sulphurici usu in quibusdam scabiei speciebus.* ANDRE BRX in *Journal général de médecine, chir. et pharmacie* 1812. Decembre.

68) LESCHEN acidum nitricum cum axungia miscet (*LODER's Journal für die Chirurgie* 2. B. 13 St. p. 139). Adhibetur idem remedium ab ALYON (*Essays sur les propriétés médicales de l'oxygène.* Paris 1798) et MARCUS (*Magazin für Therapie und Klinik.* 1. B. 13 Heft. p. 14).

69) BORELLUS *Cent. II. obs. 7.* — LENTIN *Beyträge* p. 238.

70) BRINCKMANN in HUFELAND's etc. *Journal der ausländ. medic. Litter.* 1803. I. B. p. 35.

71) HEGENISCH in HORN's *Archiv.* 3. B. p. 218.

carbones ⁷²⁾, magnesium ⁷³⁾, potassam puram ⁷⁴⁾ et picem *) adhibeant medici, quum sulphur et mercurius iis certissima remedia suppeditent, — plane ignoramus. Praemissis igitur *detergentibus*, imprimis *lotione saponacea* ⁷⁵⁾, vel *balneo maris* ⁷⁶⁾, vel alio, illico ad sulphur sub forma tum *unguenti* sive *simplicis* ⁷⁷⁾, sive *compositi* ⁷⁸⁾, tum
vapo-

72) THOMANN *Annales Wirceburg.* Vol. II. p. 35. | DUV-
VAL in BRERA *Giornale di medicina pratica*, Vol. II. 5.

73) GRILLE in *Annales de chimie*. T. 33.

74) ACKERMANN: R. Lapidis caustici drachmam semis,
solve in aquae libris duabus (l. c. p. 77).

*) HORN's *Archiv für medic. Erfahrung.* 1813. Januar.
Febr. S. 99.

75) THOMANN l. c. p. 40. HELMERICH (*Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie* 1813.
Août.

76) BEIREIS Diss. de caussis, cur imprimis plebs scabie
laborat, et de nova ei medendi ratione.

77) R. Pulveris sulphuris puri unciam unam et semis.
Butyri recentis sive axungiae porcinae q. s. ut fiat un-
guentum, ad magnitudinem nucis manibus ad noctem
uno alterove corporis loco illiniendum. HELMERICH
potassam addit.

78) *Unguentum JASSERI*: R. Pulveris subtilioris florum
sulphuris, vitrioli albi, baccarum lauri ana partes ae-
quales. M. f. c. oleo lini vel olivarum unguentum.—
Jam dudum WALDSCHMID et GULDENKLEE hoc un-
guentum laudaverant. (ACKERMANN in BALDINGERS
neues Magazin für Aerzte. 8. B. p. 145).

vaporis ⁷⁹⁾, tum balneorum sive naturalium ⁸⁰⁾, sive artefactorum ⁸¹⁾, tum lotionum ^{*}) confugitur. Adversantibus aegrotis sulphur, sub bona corporis constitutione, aut si psora pauca solummodo occuparet loca mercurio, sub forma unguenti vel albi ⁸²⁾, vel citrini ⁸³⁾, aut sub ea solutionis ⁸⁴⁾ locus

79) J. P. FRANL Epit. Vol. IV. p. 174. — Salzburg. med. chirurg. Zeitung 1792. 3. B. p. 191. — GALES l. c. p. 51. — Carbonibus ardentibus in vase, calefaciendo lecto idoneo, sulphuris uncia semis cum nitrate potassae drachmis duabus, inspergitur. Ponitur vas in lectum, quo aeger nudus decumbit ac corpus ad caput usque sese undique obtegit.

80) Cap. I. §. VI. 28. (22).

81) Ibid. (23). Balnea haec artefacta sulphurea quammaxime in psora infantum praestant. Commendantur et a JADELOT.

*) Hoc auxilio, et ab Auterriethio commendato, in levissimo ac recentissimo malo, praecipue apud infantes, cum successu utimur. Immo saponem sulphureum huic scopo valde idoneum, componi jussimus. Paratur ex partibus aequalibus saponis et sulphuris. Pro divitibus adhibetur sapo medicinalis et flores sulphuris; pro pauperibus inservit sapo viridis et sulphur commune. Illi et oleum bergamoti superadditur. Sapo sulphureus id boni quoque habet, quod vulgus eo in balneis nostris publicis uti potest, ubi scilicet pudet unguenta coram omnibus in usum ducere.

82) Cap. XX. §. LXXXIX. 2. (40).

83) Cap. XVIII. §. LXXXIII. 2. (6).

84) Ibid. (7).

cus est. Caeterum dummodo aeger cibos pruritum excitantes, praecipue salitos fumoque induratos, evitet, aliisque facilis digestionis modice se alat et transpirationis curam habeat, nullo peculiari vitae regimine opus est. Nec apud pauperes, vestimentorum et linteorum copia destitutos, ut ea jam ab initio curae mutantur, absolute requiritur.

3. Praesente *statu inflammatorio* systematis C. p. com cutanei, vasa cutis primum *hirudinibus*, sive ^{plicatae} *cucurbitulis cruentis*, immo urgente febre, in aegro plethorico, ipsa *venae sectione* depleri debent, non neglecto reliquo regimine antiphlogistico, inprimis lenibus alvum evacuantibus. Locis a psora detentis, sub magno dolore et conspicua tensione, *cataplasma emolliens*, alias *acetas plumbi*, frigide imponi oportet. Labefactatis *primis viis* et in *psora diuturna*, alvum, praemisso resolvente, rite purgare juvat. Debilitatis forte primis viis *remediis amaris* et *aromaticis* locus est, e. c. *extracto matricariae chamomillae, fumariae officinalis, centaureae benedictae*. Si natura morbo adsuevit, usui sulphuris externo, *fonticuli* ad brachia praemittuntur. In *complicatione scorbutica*, praescripto regimine congruo, praemissisque detergentibus, *sulphur*, inprimis sub forma vaporis, sed *nunquam* mercurius, sensim sensimque in usum ducitur. Quo primum autem pruritus deletur, ulcuscula relictas, non amplius remediis externis, exceptis

exceptis balneis iisque. favente anni tempore, frigidis, marinis, sed antiscorbuticis internis, nec non decocto ligni quajaci officinalis, sive baccarum juniperi communis, curantur. Psorâ lui venereae juncâ, a sulphure abstinendum et mercurius extus in usum ducendus est. Si psora aëgrum scrophulosum aut rhachiticum detineat, utrum impetigo reliquis malis levamen attulerit nec ne, inquirere oportet. Si levamen attulerit, per fonticulos vices salutare psorae agenda sunt, ac tandem impetigo, balneis potissime sulphureis, adhibitis simul remediis morbo universali accommodatis, fuganda est. Neque nocet, excepto casu complicationis syphiliticae, aëgris diu a psora vexatis, sulphur intus exhibere⁸⁵); ni enim fallimur, ipse sudor sulphur tunc redolens, ad acaros necandos jam sufficit.

Monitum.

4. Haud raro contingit, quod sub usu remedium externorum, praecipue unguentorum, pustulae jam fere fugatae de novo copiose recrudescent. Hoc in casu psydraciae species, sepositis topicis auxiliis, solis balneis tepidis curanda, coram habetur. Perbelle hujusmodi argumentum BURDIN illustravit⁸⁶).

5. Nisi

85) R. Pulveris sulphuris puri, magnesia et elaeosacchari foeniculi ana drachmas duas, D. Sr. cap. ter de die ad cuspidem cultri.

86) *Réueil périodique de la société de médecine de Paris.* 3. T. No. 16.

5. Nisi in psora praepostere sanata regulae ge-C. retroces-
 erales ⁸⁷⁾ sufficerent, novam ejusdem morbi in-
 sectionem ⁸⁸⁾, sive illius insitionem ⁸⁹⁾, annuente
 egro gravi morbo detento, suademus.

§. CXVII.

Psoriasis.

1. *Psoriasis* ⁹⁰⁾ nobis est vitium cutis sub for- Definitio.
 na punctulorum, excoriationum et crustarum,
 praecipue ad regionem pubis, sub axillis, ad su-
 percilia, sed et ad reliquum corpus obveniens,
 pruriens et communicabile.

2. Praecipue de psoriasi observationes obve-Scriptores.
 niunt apud CELSUM ⁹¹⁾, HAFENREFFER ⁹²⁾,
 MERCURIALEM ⁹³⁾, TURNERUM ⁹⁴⁾, PECHLI-
 NUM

87) Cap. I. §. VI. 35.

88) ZACUTUS LUSITANUS op. c. Lib. VII. obs. 19.

89) HUNDERTMARK l. c.

90) *Phthiriasis inguinalis* SWEDIAUERI. *Prurigo pubis*
 WILLANI.

91) De medicina lib. VI. cap. 6.

92) Op. c. lib. I. cap. 10.

93) Op. c. lib. I. cap. 17.

94) Op. c. edit. Angl. p. 159.

NUM ⁹⁵⁾, TULPIUM ⁹⁶⁾, FORESTUM ⁹⁷⁾ et LORRYUM ⁹⁸⁾.

Caussae. 3. Caussam foedae hujus impetiginis *pediculus pubis* sive *morpio* sistit, plus minus cuti intrusus ac unguium scalptu, non sine dolore, ac relicto stigmate rubro, facile extrahendus. Communis infectionis modus coitus est, quo psoriasis nonnunquam a tuguriis feminarum vulgarium impurarum ad palatia matronarum elegantissimarum migrat. Et nutrices prolem inficere queunt, ne dicamus de linteis vestibusque contaminatis. Latri-nae et sellae in iuste accusari videntur.

Diagnosis. 4. Psoriasis, apud homines caeterum non impure et in primis ad loca inconsueta e. c. ad crura, brachia, supercilia, tarsum obveniens, nisi partes laesae exacte et microscopio examinentur, facile pro alia impetigine declaratur, ac graves medicorum nobis hac in re sunt noti errores. Interdum morpiones sanguinem, instar sudoris cruenti, eliciunt ⁹⁹⁾.

Prognosis. 5. Psoriasis recens et partialis nonnullarum horarum spatio abigitur; inveterata autem et universalis interdum rebellis evadit.

6. Loca

95) Observat. med. 24.

96) Observat. med. 40. Lib. 3.

97) Opp. p. 244.

98) Op. c. p. 570.

99) Sic in puella pemphigo laborante contigisse vidi.

6. Loca affecta illico vel infusione foliorum *nicotianae tabaci*, vel *solutione mercuriali*, vel *unguento sive tabacino* ¹⁰⁰⁾, sive *oxydi hydrargyri cinerei* ¹⁾ unguuntur, vel pulvere *murtatis hydrargyri dulcis*, insperguntur. Concessa una alterave hora vel nocte integri actioni horum remediorum, partes affectae aqua cum sapone abluuntur, aut corpus totum balneo purificatur, non neglecto lin-
eorum omnium lectique mutatione. Et *sapo* no-
ster *sulphureus* predest.

§. CXVIII.

P h t h i r i a s i s.

1. Proventus pediculorum humanorum citra Definitio,
impuritatem corpus humanum infestans *phthiria*-
in constituit.

2. Morbus hic, nobis quidem nunquam vi-Scriptores;
us, ita testimoniis ARISTOTELIS ²⁾, GALENI ³⁾,
SERAPIONIS ⁴⁾, AETII ⁵⁾, PLINII ⁶⁾, CAELII AURE-
LIANI

100) Paratur ex foliis nicotianae in pulverem redactis
et oleo.

1) Unguentum Neapolitanum.

2) Histor. animalium. Lib. V. cap. 32.

3) De composit. med. sec. loc. Lib. I. cap. 8. 9.

4) Pract. Tract. I. cap. 5.

5) Tetrab. II. Serm. II. c. 67.

6) Lib. XXIV. c. 13.

LIANI ⁷⁾, AMATI LUSITANI ⁸⁾, FORESTI ⁹⁾, HAFNEREFFERI ¹⁰⁾, MERCURIALIS ¹¹⁾ et VALLISNERII ¹²⁾ confirmatur, ut nullum de eo superesse possit dubium *).

Sedes.

3. Pediculi nunc undique ex superficie corporis, interdum cum sudore ¹³⁾, scaturiunt, nunc in tuberculis, abscessibus ¹⁴⁾, nunc in ipsis visceribus, e. c. in ventriculo ¹⁵⁾ delitescunt.

Caussae.

4. Caussae phthiriasis instar earum vermium intestinalium latent. In genere, febres ¹⁶⁾, esu carnis humanae putridae ¹⁷⁾ et venus accusantur.

Cert

7) Morbor. chronic. Lib. IV. c. 2.

8) Curat. med. Cent. III. 58.

9) Lib. VIII. obs. 14. 16. — Lib. IX. obs. 46.

10) Op. c. Lib. I. c. 10.

11) Op. c. Lib. I. c. 7.

12) Nuova giunta d'osservazioni ed esperienze intorno alla storia medica e naturale. Opp. I. p. 339.

*) Confirmatur et nuper in *Récueil periodique de la Société de médecine* a. 1807. Octobre (vid. HUFELAND und HIMLY's *Journal der prakt. Heilkunde*. 1813. März. p. 122) et ab egregio Dr. ALBERS (*Salzburg medic. chirurg. Zeitung*. 1814. No. 28. p. 48).

13) Ephem. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. app. p. 3. 5.

14) Ibid. an. 4. obs. 15.

15) Act. Hafn. Vol. III. obs. 91.

16) P. I. Vol. I. XLVIII. 4. p. 134.

17) RIEDLIN lin. med. 1696. p. 462.

18) PAULLINI Cent. II. obs. 55.

Certe haec aegritudo et in hominibus maxime puritati studentibus obvenit ¹⁹⁾.

5. Succus expressus *nicotianae* ²⁰⁾, *mercurius* ²¹⁾, *sulphur* ²²⁾, *staphis agria* ²³⁾ et *oleum* ²⁴⁾ inprimis pro balneo adhibitum, praecipua phthiriasis sistunt auxilia; quibus usus externus *arsenici* addi posset *).

Cura.

19) FRANCUS Diss. de phthiriasi, morbo pediculari, quo nonnulli Imperatores, Reges, alique illustres viri ac foeminae misere interierunt. Heidelb. 1678.

20) PORTA magia natur. Lib. VIII, c. 2.

21) DE LA FONTAINE op. c.

22) CAELIUS AURELIAN. p. 498.

23) DE LA FONTAINE l. c.

24) Eph. N. C. Dec. III. an. 9. et 10. obs. 18.

*) DIARIJ HUFELANDII l. c.

CAP. XXXI.

De Psydracia.

§. CXIX.

Definitio. Historia. Symptomata.
Caussae.

Definitio. 1. Nomine *psydraciae* tubercula sive pustulae, psorae quidem saepe similes, at haud communicativae et nulli corporis loco peculiariter addictae, inscuntur.

Historia. 2. *Psydracia*, diu cum psora confusa, a LORRY ²⁵⁾, SAUVAGES ²⁶⁾, J. P. FRANK ²⁷⁾ et SWEDIAUER ²⁸⁾ sub nomine nunc *scabiei*, nunc *psoriasis* descripta invenitur.

Symptomata. 3. *Psydracia* sub forma nunc *tuberculorum* parvulorum, basi regulari instructorum, rubentium, interdum modice prurientium, vix dolentium, livescentium, — nunc *pustularum*, psorae fere similium, at raro prurientium, tum ad faciem,

²⁵⁾ Op. c. p. 250.

²⁶⁾ Nosol. T. I. p. 135.

²⁷⁾ Epit. Vol. IV. p. 180.

²⁸⁾ Op. c. Vol. II. p. 221.

ciem, tum ad reliquas corporis partes, obvenit. Tubercula saepe ad apicem suppurant ac pustulae facile crusta squamosa cooperiuntur. Ambo indeterminato tempore, relictæ saepe macula sive stigmate coloris profunde rubri, evanescunt, ac haud raro periodice recurrunt.

4. Ad *caussas* psydraciae spectant: variae ar- Causae.
tes manuariæ, mansio in fodinis metallicis, im-
mundities, usus pharmacorum cutim topice irri-
tantium, thermae, plethora, haemorrhagiae sup-
pressae, vita sedentaria et casta, vigiliae, vitia
primarum viarum, periodus menstrualis, venus
nimia, lues venerea, scorbutus, scrophula, febres
aliique morbi praegressi, nec non vaccina.
Causa proxima saepe in inflammatione glandula-
rum cutanearum locata videtur.

§. CXX.

Diagnosis.

1. Prout *psydracia* sub forma sive tuberculo-Facilis con-
rum sive pustularum comparet, vel cum *ictibus*
insectorum, *furunculis*, *strophulo* et *urticatione*;
vel cum *hydroa*, *psora* et *herpete* confundi
potest.

2. Insecta fortuito cuti infensa, utpote eam P. ab icti-
vulnerantia, malum ad chirurgiae imperium per-
tinens excitant; reliqua, generi humano propria,
morbis specificis supra descriptis ansam porrigunt.
Haec cum ita sint, SAUVAGESIO, psydraciam et ab
Frank Prax. I. 2. E e in-

insectis repetenti, haud assentimus, medicosque juvenes hortamur, ne vulnuscūla, forte ab hac caussa, praecipue apud infantes orta, pro impetigine quadam declarent.

Distinctio
a furunculo.

3. *Furunculi* in plurimis partibus simul erumpentes, priusquam consuetum incrementum attigerunt, cum *psydracia tuberculosa* vel et *pustulosa* ²⁹⁾ confundi possent, nisi illi dolorem et nucleum, hī autem solummodo pruritus ac levem ad apicem suppurationem ostenderent.

Distinctio
a strophulo.

4. *Strophulus* consulto a J. P. FRANK ad *psydraciam*, quam *infantilem* dicit ³⁰⁾, revocatur; interea cum ille in *papulis*, hae autem in *tuberculis*, strophulo solum sparsim et transitorie mixtis consistat; utraque mala sejungenda esse, existimavimus.

Distinctio
ab urticatione.

5. Comparantibus *psydracia* et *urticatione* sub forma *tuberculosa*, similitudo inter eas intercedit, verum ibi tubercula rubra, livida, basi regulari ac modice prurientia — hic vero alba, basi irregulari et summum pruritus excitantia ³¹⁾ cernuntur.

Distinctio
ab hydroa.

6. *Psydracia pustulosa* certe *hydroae pustulosae* valde similis est, atque *psydraciam*, quam dicunt

²⁹⁾ Sic HEIMTO relate ad furunculum, quem *spurium pustulosum* vocat, contigisse videtur (l. c. p. 158).

³⁰⁾ L. c. p. 182.

³¹⁾ Cap. XXVII. §. CV. 3.

dicunt *hypochondriacorum* ³²⁾, nil aliud quam *hydroam nervosam* esse, suspicamur. Praecipua inter hujusmodi impetigines differentia in eo consistit, quod in *psydracia* copia pustularum longe major et super ampliolem superficiem sparsa cernitur, quam in *hydroa*.

7. Quum forma *psorae* et *psydraciae* eadem sit, ac illa ab hac solummodo per praesentiam sive absentiam acari exulcerantis distinguatur, securissimum diagnosticum in investigatione insecti locatum est. Quoniam autem haec investigatio saepe ardua evadit, sequentia criteria haud supervacanea erunt.

Psora.

a. Ortus morbi plerumque inter digitorum interstitia observatur.

b. Rarissime, inprimis apud adultos, faciem occupat.

c. Pruritus constans ac vehemens, sub calore lecti adhuc augetur.

d. Facillime communicatur.

Psydracia.

a. Ortus admodum varius est.

b. Saepe in facie animadvertitur.

c. Pruritus neque constans, neque vehemens, a lecti calore vix invalescit.

d. Non communicatur.

8. *Psydracia* nunc *vitium locale cutis*, nunc *Divisio* *symptoma affectionis universalis* sistit. Ad illud

E e 2 per.

32) FRANK Epit. I. c. p. 181.

pertinent: *P. artificum*, *P. ab immunditie*, *P. thermalis*; — ad hanc spectant: *P. ex plethorâ*, *P. gastrica*, *P. critica*, *P. venerea*, *P. scorbutica*, *P. vaccina*.

P. artificum. 9. *Psydracia artificum* ad manus sartorum et textorum, ex polline acri sive ex oleo rancido vestium antiquarum et lanae occurrit. Simili cuti vitio et homines in fodinis metallicis laborantes subijciuntur.

P. ab immunditie. 10. *Psydracia ab immunditie* apud homines maxime impuros ad extremitates aliasque corporis partes contingit. Huc et pustulae ab *unguentis* sua cura psorae ³³⁾, vel aliorum morborum ortae, spectant. Mirum omnino est, *tartritidem stibii et potassae*, cuti illinitum, pustulas peculiares a vaccina haud plane absimiles et nonnunquam per consensum partes genitales afficientes ³⁴⁾ generare.

P. thermalis. 11. *Psydracia thermalis* usu externo plurimum thermarum ³⁵⁾ communis, plerumque sua forma tuberculorum, sine aegrorum sive damni sive levamine, comparere solet.

12. *Psydracia*

³³⁾ Cap. XXX. §. CXVI. 4.

³⁴⁾ AUTHENRIETHS *Versuche für praktische Heilkunde* Tübingen 1807. p. 127 — 134. SHERWIN in *Mémoires of the medical Soc. of Lond.* Vol. II. — HUTCHINSON ibid. Vol. V.

³⁵⁾ E. c. Wisbaden, Aquisgranum, Baden in Austria et

12. *Psydracia a plethora* nunc pustulosa, P. a ple-
thora, nunc tuberculosa, apud juvenes sive caste viven-
tes, sive veneri primum litantes ³⁶⁾, sive liquori-
bus fermentatis indulgentes, nec non apud homi-
nes vitam sedentariam ducentes, vel haemorrhoi-
dibus sive menstruis suppressis laborantes, ob-
venit.

13. *Psydracia gastrica* nonnunquam ex aci-P. gastrica.
is primarum viarum ³⁷⁾ et ex vermibus ³⁸⁾ oriri
soa est.

14. *Psydracia critica* psoram criticam aucto-P. critica.
um ³⁹⁾ amplectitur, ac haud raro febrium alio-
umque morborum finem concomitatur.

15. *Psydracia venerea* sub forma tum pustu-P. venerea.
rum, tum tuberculorum, nunc indolentium,
nunc ardentium, vix unquam prurientium, prae-
sertim ad faciem, pectus, brachia, rarissime ad
manus obviarum, apparet. Pustulae halone viola-
eo circumdatae sunt ac tubercula adspectum cu-
ereum, foedum, veluti variolarum solidescantium,
prae se ferunt; ambo omnino a psora, aegrum ve-
ereum fortuito detinente, distinguere debent.

16. *Psy-*

36) *Scabies neogamorum* HÜNERWOLFF (Eph. N. C. Dec.
III. an. I. obs. 118).

37) HUFELAND'S *Journal der prakt. Heilkunde*. 6. B.
2s St. p. 382.

38) Ibid. 21. B. 4s St. p. 9.

39) TODE *medic. Annalen*. 1. Th. 5s Heft. p. 42.

P. scorbutica.

16. *Psydracia scorbutica*, pro re nata pustulosa, tuberculosa, plerumque pruriens, nulli parcens loco, saepe ex ipsis eccyhmomatibus evolvitur, aut iis circumdatur.

P. vaccina.

17. *Psydracia vaccina* ⁴⁰⁾ tertia, ut diximus ⁴¹⁾, hebdomade, vel tardius quoque a peracta insitione, sub forma vesicularum solitiarum, nulli cutis loco parcentium, nunc paucarum, nunc plurimarum ⁴²⁾, in conspectum venit. Vesiculae materie puriformi repletae, halone rubro latitudinis duarum triumve linearum elevato, compacto, et duriusculo circumdantur ac disruptae vel in crustam, vel in exoriationem desinunt. Curriculum hujus eruptionis spatium unius hebdomadis et ultra absolvitur. Magnam eam cum *varicella solidescens* ⁴³⁾ refert similitudinem a qua tamen defectu febris et habita ratione praegressae vaccinae distinguitur.

§. CXXI.

Prognosis. Cura.

Prognosis.

1. *Psydracia artificum* et *Psydracia ab immunditie* si causam evitare liceat, facillime abigitur. Idem de *Psydracia thermalis* valet. *Psydracia ex plethora*, *Psydracia gastrica*

40) Schutzpockenkrätze GÖLISII (vid. cap. nostrum XIV. §. LXIX. 4. (57)).

41) Cap. XIV. §. LXIX. 7.

42) Ultra quinquaginta numeravimus.

43) Cap. XV. §. LXXII. 1.

gastrica, *Ps. critica*, sponte, at saepe non sine stigmate violaceo, rubro, evanescent ac facile redeunt. *Ps. venerea*, *scorbutica*, auxiliis localibus derepente suppressa, plurimis iisque gravibus malis ansam porrigere potest. *Ps. vaccina* in genere levem morbum constituit: si vero infans fuerit scrophulosus, facile hujus indolis particeps fit, ac malum addit malo.

2. *Psydracia artificum* et ab immunditie de- Cura.
tergentia exposcit. *Ps. thermalis* suspensione balnei et fuga refrigerationis sanatur. *Ps. a plethora* regimine antiphlogistico, inprimis *cucurbitulis cruentis* ad dorsum et usu interno seri lactis, debellari solet. *Ps. gastricae*, pro re nata, lenia purgantia, absorbentia, et anthelminthica accommodata sunt. *Ps. critica* et *habitualis* balneis tepidis, ulceribus artificialibus et lenibus diureticis curatur. Ita et *Ps. vaccina*. Reliquae curam universalem, diatesi, ex qua pullulant, accommodatam, postulant.

CAP. XXXII.

De Herpete.

§. CXXII.

Definitio. Historia.

Definitio. I. *Herpes* ⁴⁴⁾ impetiginem prurientem, plerumque serpentem ac periodicam sistit, sub forma nunc *papularum* rubrarum, sublutearum, nunc *pustularum* sero rubello, flavescente, limpido repletarum, comparentem, ac sive in desquamationem sive in crustas, sive in ulcera desinentem.

Historia. 2. Veteres et Arabes herpetem cognovisse, opera HIPPOCRATIS ⁴⁵⁾, GALENI ⁴⁶⁾, PLINII ⁴⁷⁾,

AETII

44) A GRAEC. Ερπη. serpo. *Synonyma.* Formica, serpigo, lichen, impetigo, petigo. GERM. *Die Flechte.* GALL. *Les dartres.* ANGL. *St. Antony's fire. Wild-fire. The shingles. Tetters.* ITAL. *L'erpete, serpicella, i sali, il salso.* ROSS. Лишай, POLON. *Liszay.*

45) Lib. IV. Epidem.

46) De compositione medic. Lib. V. De tumoribus. P. I. c. 9. De arte cur. ad Glauc. Lib. II. c. 1. 2.

47) Lib. XXVI. cap. I.

AETII ⁴⁸) et AVICENNAE ⁴⁹) testantur. Hujus denique morbi doctrinam WEDEL ⁵⁰), ROUSSEL ⁵¹), CARRERE ⁵²), PITNER ⁵³), RAMBEAU ⁵⁴), TOURNEY ⁵⁵), POUPART ⁵⁶), BERTRAND DE LA GRESSE ⁵⁷), GERAPS ⁵⁸), GEMPF ⁵⁹), GOLDBECK ⁶⁰), HENSLER ⁶¹), TILESII ⁶²), ALIBERT ⁶³), WEINHOLD ⁶⁴) excoluerunt.

§. CXXIII.

- 48) Tetrab. IV. sect. 2. c. 60.
- 49) Canon. Lib. IV. Fen 3. Tract. I. cap. 6.
- 50) Diss. de herpète. Jen. 1703.
- 51) De variis herpetum speciebus, caussis, symptomatibus etc. Cadomi 1779.
- 52) *Mémoire sur les vertus, l'usage et les effets de la douce amère.* Paris 1780.
- 53) Diss. de herpète. Budae 1780.
- 54) *Mémoire sur la nature et le traitement des dartres.* (*Journal de médec. militaire* 4. cahier 1782).
- 55) Diss. de herpète. Nanceji 1783.
- 56) *Traité des dartres.* Paris 1784. 2. édit.
- 57) *Essay sur le traitement des dartres.* Paris 1784.
- 58) Diss. herpetis naturam atque caussas lustrans. Marburg. 1790.
- 59) Diss. de herpetis natura et caussis. Marb. 1791.
- 60) Diss. de herpète. Jen. 1797.
- 61) Progr. de herpète. Kiliae 1801.
- 62) *Theorie der flechtenartigen Ausschläge.* Leipzig 1802.
- 63) Op. c.
- 64) *Der Graphit als ein neu entdecktes Heilmittel gegen die Flechten.* Leipz. 1808.

§. CXXIII.

Symptomata. Autopsia cadaverum. Analysis chemica.

Generatim 1. Ut multifaria herpetis symptomata debito ordine exponi possint, hunc morbum in *farinosum*, *miliarem* et *rodentem* dividemus.

H. farinosus. 2. *Herpes farinosus* ⁶⁵⁾ pruritu cutis, sensu ardoris et tensionis annunciatur. Mox papulae rubrae aut flavae, dispersae, copiosae, sine cutis tamen intermediae phlogosi, in conspectum veniunt, ac in minimas lamellas albescentes, quasi farinosas, sive instar depositionis terreae, fatiscunt. Herpes hic, nunc constans, plerumque volaticus, ad faciem, praecipue pone aures, ad mentum, supercilia, partem capillatam capitis, collum, cubitus, palmas manuum, poplitem, plantas pedum, ad labia vulvae, obvenire solet. Figura illius rotunda ⁶⁶⁾ aut triangularis est, marginibus elevatis, centro depresso, albido.

H. miliaris. 3. *Herpes miliaris* ⁶⁷⁾, praeviis saepe cephalalgia, dyspnoea et incommodis primarum viarum, cum magno pruritu, ardore, tensione et aliquan-

do

65) *Synon.* Herpes simplex, herpes siccus, lichen siccus. *GERM.* Trockne Hautflechte. *GALL.* Dartre farineuse, dartre seche, dartre furfuracée *ALIBERT.* *ANGL.* Dry tetter.

66) *Herpes furfuraceus circinatus* *ALIBERT.*

67) *Synonyma.* Fornica miliaris. *GALL.* Dartre miliaire. Feu volage. Dartre boutoné.

do rubore tumoreque partis, sub formâ congeriei pustularum, seminibus milii similium, vel interdum sub illa phlyctaenarum ⁶⁸⁾ prorumpit. Cruciatu inde maximi, praecipue post lautum pastum et ad noctem, oriuntur. Pustulae sive vesiculae ad basin roseae, et ad apicem subalbae, vel sponte, vel scalptu rumpuntur, effluente ichore acrisaepe foetido, qui in crustas ⁶⁹⁾, aut squamas ⁷⁰⁾ rescat tenues, inaequales, scabras, nunc cinereas, nunc luteas, nunc subatras, sive siccas ⁷¹⁾, sive madidas ⁷²⁾, desinit. Herpes hic eadem ac alter occupat loca, praeterea saepe ad scrotum, et ad perinaeum, nec non aliquando circa papillas mammarum occurrit. Ad scrotum imprimis aegrum ad cruentum usque scalptum, sequente ardore, veluti a carbone accenso, cogere solet. Duratio morbi per menses, annos, vel per totum vitae curriculum, renovata saepius pustularum efflorescentia, observatur.

4. *Herpes rodens* ⁷³⁾, instar herpetis miliaris, H. rodens. interdum praevio saevissimo universali pruritu

68) *Herpes phlyctaenodes, vesiculosus, diaphanus* TILLESII (op. c. p. 43).

69) *Herpes crustaceus* ALIBERTI.

70) *Herpes squamosus* A.

71) *Herpes centrifugus, lichenodes* A.

72) *Herpes squamosus madidans* A.

73) *Synon. Ignis sacer* CELSI. *Herpes estiomenus* GALENI. *Herpes exedens, h. depascens, lupus vorax, h. phagedaenicus, h. noma, GALL. dartre rongeante.*

tu ⁷⁴⁾ adoritur. Pustulae disruptae hic ichorem, partes vicinas rodentem, exulcerantem, fundunt, quo, malum magis magisque tum in latitudinem, tum in profundum propagatur. Nonnunquam e crustae mox deciduae, mox redeuntes generantur. Communis hujus morbi sedes facies est. Vultum a crustis, larvae instar, exceptis oculis, totum obductum vidimus. Alias herpes mentum solum detinet (*Mentagra*), quo in casu facile ad collum proserpit, ac apud mares, barbae caussa, gravia incommoda parit. Interdum pili istius, plurimis in locis veluti penicilli uniti, cernuntur. Nec herpetis rodentis, universam corporis superficiem sub forma ulcerum foetidorum, marginibus irregularibus instructorum, ac facile cruorem fundentium, obsidentis, desiderantur exempla. Immo haud raro malum ad *interna loca* proserpit, aut ibi cutis loco evolvitur. Partes sic obnoxiae, cavitates aurium *), narium ⁷⁵⁾, pulmones ⁷⁶⁾, trachea ⁷⁷⁾,

vesi-

74) Sic in nobilissimo Polono observavimus.

*) Legatur memorabilis historia morbi Principis Spirensis in J. P. FRANK epitome Vol. IV. p. 144.

75) Ozaenam, certe non syphiliticam, in homine olim herpete laborante conspexi.

76) Phthiseos, quin immo et peripneumoniae indolis herpeticae habeo exempla.

77) Phthisis trachealis, habita proportionem, saepius quam pulmonalis, ex herpete originem trahit.

vesica urinaria ⁷⁸), urethra ⁷⁹), uterus ⁸⁰), esse solent. Neque systema glandularum lymphaticarum, neque ossa a morbo, haud raro febre lenta terminaturo, immunia manent ⁸¹).

5. Sectiones hominum saltem *cum* herpete de-
Autopsia
cadaverum
 functorum, nunc de pulmonum inflammatione, nunc de liquore seroso in pectoris cavitate extravasato, nunc de intestinis aut exulceratis, aut a vesiculis obsessis et saepissime de hepatis volumine aucto ⁸²), testantur.

6. *Analysis chemica* squamarum et crustarum
Analysis
chemica.
 herpeticarum sequentia docuit: *squamae* ex albumine, mucilagine animali, muriate sodae, sulphate sodae, acido phosphorico libero et phosphate calcis componuntur et *crustae* eadem principia, excepto acido phosphorico, cujus loco carbonatem calcis continent ⁸³), offerunt.

78) Enuresin gravem in viro, olim herpete rodente laborante, iisdem remediis, quae prius hunc morbum fugarunt, sanavi.

79) WEINHOLD l. c. p. 52.

80) Herpetem cum fluore albo alternatim comparentem, ac scirrhum uteri, fugam herpetis subsequentem, observavi.

81) ALIBERT l. c. p. 66.

82) ALIBERT l. c. p. 90.

83) ALIBERT l. c. p. 91.

§. CXXIII.

C a u s s a e.

C. praedis-
ponentes.

1. Quamvis herpes nulli aetati parcat, rarius tamen infantes, saepius juvenes, praecipue circa pubertatis epocham, et adultos, saepissime vero senes aggreditur. Nonnullae regiones e. c. Insularia, ita herpeti favent, ut eum fere endemium dixeris. In genere potius urbium incolas, et proceres, quam rusticos et egenos invadit. Frequenter dispositionem hereditariam agnoscere solet.

C. excitantes.

2. Evolvitur herpes, praecipue vere, aestate et autumno, sub victu aulico, sub esu ciborum sale fumoque induratorum ⁸⁴⁾, carniū corruptarum ⁸⁵⁾, sub usu liquorum fermentatorum, sub vita aut nimis activa, aut plane sedentaria ⁸⁶⁾, ab actione ignis ⁸⁷⁾, a terrore ⁸⁸⁾, a tristitia ⁸⁹⁾, a veneris desiderio ⁹⁰⁾, a suppressis haemorrhoidibus, menstruis, lochiis, fluore albo, diarrhoea et sudore habituali, a cohibita lactatione ⁹¹⁾, a retentione

84) HERRENSCHWAND *Traité des principales et des plus fréquentes maladies* p. 331. — LORRY l. c. p. 245.

85) ALIBERT l. c. §. 248.

86) Ibid. §. 249. 250.

87) Ibid. §. 252.

88) Ibid. §. 178.

89) Ibid. §. 254.

90) Ibid. §. 255.

91) Ibid. §. 18.

entione lotii ⁹²⁾, a laesionibus organicis ⁹³⁾, a psora ⁹⁴⁾, a viru venereo etc. — Hoc ultimo excepto casu, herpes nunquam quid contagiosi, neque per insitionem ⁹⁵⁾, offert.

3. Quamvis *caussa proxima* herpetis lateat, C. proxima. eam tamen non semper unam eandemque esse, compertum habemus. Ex caussarum enim enumeratione elucet: triplicem, quam sub nomine herpetis descripsimus, morbi cutanei formam ex diathesi nunc arthritica, nunc scorbutica, nunc syphilitica, nunc scrophulosa, nunc carcinomatica pululare, quod infra accuratius adhuc demonstrabitur. Interea sponte ex symptomatum examine, herpetem nil aliud esse, nisi *inflammationem chronicam*, saepe pustulosam, membranae mucosae cutis, tum in desquamationem, tum in exulcerationem transeuntem, intelligitur.

§. CXXIV.

D i a g n o s i s.

1. Pro varia herpetis forma, diversae cum eo *Generatim*, confundi possunt impetigines, quae, si rite distinguerentur, minor ac vulgo creditur morborum pro

⁹²⁾ Difficultates urinae, cum herpete alternatim obvias, aliquoties vidi.

⁹³⁾ ALIBERT. l. c. §. 253.

⁹⁴⁾ Ibid. §. 241.

⁹⁵⁾ Ibid. §. 171.

pro herpete declaratorum evaderet copia. Ipsa ALIBERT mala herpetica longe ultra debita confinia extendit. Caeterum a disceptationibus circa formam hujus morbi abstinemus, dummodo nobis concedatur, herpetem variam indolem agnoscere ac ipsius characterem praecipue in pruritu, in sensu serpendi et in periodica evolutione consistere.

H. farinosi
similitudines.

2. *Herpes farinosus faciei cum erythemate gutta rosea*, — ille aliarum partium cum *porrigione* similitudinem alit. — *Erythema* autem *gutta rosea* neque prurit, neque dolet, neque serpit, a rarissime ad mentum, frequentissima herpeti (mentagrae) sede, obvenit. — *Porrigo*, quacunque in parte obveniat, nulli, saltem evidenti cutis vitio originem debet, — *herpes farinosus* contra ex praeviis papulis nascitur.

H. miliaris
similitudines.

3. *Herpetis miliaris* forma quodammodo cum *miliaribus*, *zostere*, *exanthemate mercuriali* *miliariformi*, *hydroa*, *psora*, *psudracia*, *tinea*, et si in squamas desinat, cum *lepra squamosa* convenit. *Miliaria* vero sistunt *exanthema*, *herpes impetiginosus*. Idem de *zostere* dicendum est, qui praeter ea arcte ad unum tantummodo corporis latus circumscribitur invenitur, cum herpes plus minusum ad serpendum offerat. Et *exanthema mercuriale* acute decurrit ac praeterea a symptomatibus catarrhalibus comitatur. *Hydroa* fugax est, *herpes miliaris* chronicus. Porro rerum positio

res, sub quibus varii hi morbi obveniunt, rite per-
 pensae, diagnosi instar luminis sunt. *Psora* com-
 municatur, *herpes* vero, nisi syphiliticus, omni
 contagio destitutus est. Praeterea *psora* ab initio
 pustulas *solitarias* exhibet, *herpes* vero pustulas
congregatas. Tandem illa vix unquam, hic saepe
 in facie comparet. *Psydracia* frequenter ex caus-
 sis obviis externis oritur ac pustulas plerumque
 majores vixque congregatas exhibet cum pruritu eo
 herpetis minore.

4. *Herpes rodens* cum *ulceribus cancris* et ^{H. rodentis}
leprosis confundi potest. ^{similitudi-}
 nes.

5. *Herpes* vix unquam vitium *primarium* sive ^{De indole,}
locale cutis sistit. Ut igitur *diatheses*, quae illi
 ansam porrigunt, rite eruantur, praecipuum est
 momentum.

6. Maxima herpetum pars ex *diathesi arthriti*-^{H. arthriti-}
ca pullulat, ac *principium*, quod vulgo dicitur ^{cus.}
herpeticum, eodem jure *arthriticum* vocari pos-
 set *). Sic docent aetas, in qua herpes plerum-
 que contingit, — classis hominum, quae illi prae-
 cipue subjicitur, — vitae genus, quod eum exci-
 tat, — influxus anni temporum, — recursus saepe
 periodicus, — volubilitas sedis, — ardor cu-
 tis,

*) Video, me hanc opinionem cum egregio practico
 communem habere: *Klinische Bemerkungen über einige*
chronische Krankheiten, von Dr. J. G. NEUBUR.
 Frakk. a. M. 1814.

tis, — depositio ad eam materiei phosphatem ca-
cis continentis — ipsaque tandem curandi rati-
Hic autem animadverti debet, herpetem arthriti-
cum, praesertim apud homines robustos, haemo-
rhoidarios, saepe *complicationem inflammatoria-*
inire et in genere pruritu maximo ac continu-
stipari.

H. scorbu-
ticus.

7. *Herpes scorbuticus* apud egenos et homi-
nes in nosocomiis inclusos, potissimum ad extre-
mitates inferiores et ad faciem obvenit ac plerum-
que minus quam reliquae species prurit.

H. syphili-
ticus.

8. *Herpes syphiliticus* circa partes genital-
evolvi, pruritu et ardore nocturno stipari, ac sa-
niem foedentem largiri solet. Diagnosi imprimi-
ex morbis praegressis instituitur.

H. scrophu-
losus.

9. *Herpes scrophulosus* infantibus, junioribus
feminis familiaris, amplas plagas frontis, collis-
scapularum potissimum et brachiorum occupans
marginibus elevatis, haud multum pruriens, us-
plurimum siccus est.

H. carcino-
maticus.

10. *Herpes carcinomaticus* plerumque roden-
ac praesertim feminis aetate proVectis communis
saepe a duritie viscerum abdominalium, a febre
lenta stipatus, observatur.

Complica-
tiones.

11. Nec *complicationes* unius alteriusve ha-
rum diathesium desiderantur, quo in casu herpe-
tis natura non aliter quam habita summa ratione
constitutionis aegri, vitiorum haereditariorum,
morborum praegressorum, caussarum praesen-
tium.

um, symptomatum et effectus medicamentorum
rui potest.

§. CXXV.

P r o g n o s i s.

1. Nulla extat impetigo, quae tam saepe pro *Salutaris.*
herpetica et salutaris haberi possit, quam herpes, in-
rimis ille, qui recens est ac copiosa secretionem sti-
atur. Tali herpete comparente pertinacem hypo-
chondriasin, rebelle asthma, aliaque incommoda
ugata vidimus. Cum nostris observationes ALIBER-
96) aliorumque plane conveniunt.

2. Sicuti autem erumpens herpes saepe saluta- *Metastasis.*
is, ita illius sive spontanea, sive artificialis fuga
ut *recessus* nocua animadvertuntur. Organa cum
caussa herpetica affinitatem peculiarem habent-
ia 97), praecipue retrocessus experiuntur effectus.
Aliquando *hepar et ventriculus* inde scirrhusa fiunt;
ut *cor sive aorta*, in anevrysma aut exulceratio-
nem incidunt *).

3. Quo diutius perseverat herpes, — quo *Difficultas*
ampliores occupat superficies, — quo magis ad *sanationis.*
haereditaria spectat mala, — et quo annosior ae-
ger, eo difficilius sanatur. Saepissime morbus
profligatus, post mensem vel annum unum alte-

F f 2

rumve

96) L. c. p. 84.

97) §. CXXII. 4.

*) Testa l. c.

rumve recrudescit. Devicta licet impetigine, interdum doloris et stuporis sensus in cute remanet ⁹⁸). Nil certius de herpete omnino fugato testatur, quam evacuationum consuetarum ac antea suppressarum reditus. Herpes nonnunquam vultuum obstitit sanationi ⁹⁹). Aliàs, accedente erysipellate, typho, vel alio morbo, ipse evanescit ¹⁰⁰).

Periculum. 4. Periculo quidem herpes sub debita cura vix instruitur. Interea tum apud senes, tum apud pauperes, tum apud homines, a gravibus animi curis vexatos, saepe marcori universali, ac praeviis vel viscerum obstructionibus, vel hydropi, feбри hecticae letali, ansam porrigit.

§. CXXVI.

Generatim. 1. Prima, dum herpetis suscipitur cura quaestio est, utrum morbus fugandus sit nec ne? — Responsum in regulis generalibus impetiginibus medendi continetur. Si autem herpetem sanare liceat, altera occurrit quaestio: num scilicet *remedia interna*, num *externa*, num *utraque simul* in usum deducenda sint?

Remedia interna.

2. Herpetem pro varia sua origine variam quoque exposcere curandi rationem, per se intelligitur.

98) HERBERDEN op. c. p. 99.

99) NEUMANN in SIEBOLD's Chiron. 3. B. 18.

100) ALIBERT l. c. p. 93.

tur. Haud arduum quoque fore existimamus, regulis generalibus adversus impetigines, ex variis diathesibus pullulantes ¹⁾, observationes speciales circa remedia, in herpete usitata, debito modo adjungere. Inter haec, quae usui interno inserviunt, recensenda sunt: a) *sulphur*, remedium scilicet cuilibet herpeti, excepto venereo, accommodatum, cujusque laudes, quamvis praeter modum, ALBERT merito cecinit ²⁾. Noli autem timere, si, quod consuetum est, primis hujus remedii exhibitis dosibus, impetigo augeatur, tunc etenim paulo post verisimiliter imminuetur. Caeterum memorer esto, personas systemate nervoso excitabili ac pulmone debili praeditas, sulphur interdum aegre ferre, quod de ipsis aquis mineralibus eum continentibus dici oportet; b) *antimonium*, praecipue *crudum* ³⁾, ita *calx antimonii sulphurata* ⁴⁾ etc. c) *mercurius*, qui tamen nisi antimonio junctus

1) Cap. I. §. VI. 15 seq.

2) L. c. §. 283. „Pour ce qui me concerne, j'emploie journellement le soufre à l'hôpital St. Louis, et le succès couronne constamment son administration.“

3) R. Antimonii crudi unciam semis. Conservae rosarum, fumariae, cochleariae aa unciam unam. Gummi Quajaci drachmas duas. M. f. c. Syrupo limonum electuarium. D. S. mane et vespere drachmam unam. (LA. GRESIE l. c.)

4) HUFELAND's *Journal der Heilkunde* 4. B. p. 42. 9. B. p. 3. — 11. B. p. 181.

ctus ⁵⁾), excepto herpete venereo et scrophuloso, vix boni quid operatur; d) *graphites plumbago* ⁶⁾) a nobis nunquam interne adhibitus; e) *acidum* tum *sulphuricum* ⁷⁾), tum *nitricum* ⁸⁾), tum *muriaticum* ⁹⁾); f) variaque *vegetabilia*, praesertim *stipites solani dulcamarae* ¹⁰⁾), *radix juniperi communis* ¹¹⁾), *cortex ulmi campestris* ¹²⁾), *herbae vio-*
lae

5) Aethiops scilicet antimonialis.

6) Plumbum scriptorium. GERM. *Reissbley*. GALL. *Carbure de fer*, *crayon noir*. ANGL. *Black lead*. R. *Plumbaginis anglicae* unciam unam. Mellis uncias quatuor. M, exacte, ut f. electuarium. D. S. Mane et vespere cochl. coff. (WEINHOLD l. c. p. 93).

7) HOME *klinische Versuche*. p. 448.

8) Hoc remedio Herpetem rodentem in sene miraculi instar debellavi.

9) EVERS in SCHMUCKERS *vermischten Schriften*. 1. B. p. 193.

10) CARRERE l. c. — OTTO de usu medico dulcamarae. — DE LA GRESIE l. c. — Exhibetur extractum totius plantae methodo STÖRKIANA paratum a granis sex ad grana duodecim, augendo dosin ad drachmam unam de die. Potest et decoctum ex drachmis duabus, — usque ad sex, stipitum ad colaturam librae exhiberi. Summopere idem remedium ALTHOFF commendat. (*Praktische Bemerkungen über einige Arzneymittel*. 1. B. 1791).

11) BRUCH Diss. de radice juniperi decocta. Argent. — WILHELMI Diss. de junipero. Argent. — HENNICHKE Nov. Act. med. N. C. T. II, obs. 32.

12) BANAU *sur l'usage de l'orme pyramidal*. Journ. de Paris

lae tricoloris ¹³⁾, *centaureae jaceae* ¹⁴⁾, *menyanthis trifoliatae* ¹⁵⁾, *fumariae officinalis* ¹⁶⁾, *scabiosae arvensis* ¹⁷⁾, *conii maculati* ¹⁸⁾, *pulsatillae nigricantis* ¹⁹⁾, quae singula interdum prosunt, saepe effectum destituuntur, vix unquam nocent, dummodo primae viae inde non laedantur. Nulla enim in impetigine magis ad digestionis opus respiciendum est, quam in herpete. Quare, electo victu, pro re nata diathesi sive arthriticae, sive scorbuticae accommodato, abdomen nunc resolventium et

Paris 1783. No. 255. — *Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte*. 9. B. p. 195. — BALDINGER *neues Magazin*. 8. B. p. 161. — *Arzneykundige Abhandl. des Collegiums der Aerzte in London*. 2. B. p. 152.

13) *Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte*. 8. B. p. 330. — NOTHNAGEL *Handbuch für prakt. Aerzte*. 1. B. p. 244.

14) ALLIONI *flora Pedemontana*. Vol. I. p. 158. — PENCHIENATTI et BRUGNONE in BERTRANDI *op. anatomiche e cerusiche*. Vol. 4. p. 182. not. a.

15) *Gazette salulaire*. a. 1777. p. 163. Vid. TODE *chirurg. Biblioth.* 7. B. p. 275. — Succus expressus adhibetur.

16) STRANDBERG *om fel vid, chron. sjuk do mars botan.* de p. 17. Succus ad uncias duas.

17) BAUMIN. *Histor.* T. III. p. 2.

18) LANDUETTE *Journal de médecine*. T. 26. p. 335. — VALENTIN *medical repository*.

19) POUPART l. c. p. 204, 211. Extracto a gr. uno ad grana sex utitur.

et purgantium ope. ab obstructionibus et saburris liberatur, ad quod *aquae minerales saponaceae* et *salinae* mirifice inserviunt; nuncque per remedia *amara* et *aromatica* corroboratur. Praeterea maxime ad debitam urinae copiam respiciendum, ne de instauratione evacuationum suppressarum loquamur.

Remedia
externa.

3. Concesso *remediorum externorum* usu, secundum regulas generales determinando, plerumque *fonticulus* sive aliud ulcus artificiale, si fieri liceat, in viciniis loci affecti praemittitur. Si cutis ac herpetis status vasorum sanguiferorum nimiam repletionem ostendat, curam optimo rerum successu *hirudinibus* aut *cucurbitulis cruentis*, excepta facie, circa herpetem positis, incipimus. Dein, nisi impetigo jam admodum inveterata sit, quid *butyrum recens*, insulsum, quid *cremor lactis*, quid *saliva*, quid *malvae rotundifoliae decoctum*, parti affectae applicita, quid *balneum tepidum* valeant, experimur. Hisce enim simplicissimis auxiliis, herpes potissimis pharmacis rebelles, plus vice simplici debellavimus. Alii *olei* ac *lavationis frigidae* ²⁰⁾, aut *decocti sabinæ* ²¹⁾ praestantiam laudant. Remediis allatis haud conducentibus, excepto herpete syphilitico, ad *balnea sulphurea*, sive *naturalia*, sive *artificialia* confugimus.

20) BANG Collect. Havniens. Vol. I.

21) KAUSCH *Memorabilien der Heilkunde, Staatsarzneywissenschaft*. I. B. p. 35. Züllichau 1817.

gimus. ALIBERTUS embrocationem partis affectae ope aquae sulphuricae commendat ²²⁾. Ita unguentum ex sulphure et *axungia porcina* ²³⁾, Nonnunquam *balnea maris* reliquis palmam arripiunt. *Balnea* inprimis *Wisbadensia* ²⁴⁾ et *Neundorfensia* ²⁵⁾, vel alia tepida cum *foliorum eupatorii* (*cannabini*?) et *stipitum solani dulcamarae* ana manipulis duobus ²⁶⁾ conduxisse sunt visa. Neque in rebelli malo, si pars id ferat, *fotus animalis* recenter mactati negligendus est. In genere tamen in pertinaci herpete, vix auxilium, quod *acetum forte*, antiquis jam notum remedium ²⁷⁾, antecelleret, invenies. Succum *citri medicae* ²⁸⁾, *acidum nitricum* cum *axungia* ²⁹⁾, *acidum muriaticum*,

22) Op. c. §. 294.

23) Op. c. §. 300.

24) RITTER in HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde*. 7. B. 3s St. p. 74.

25) WAIZ ibid. 24. B. 4s St. p. 32.

26) DE LA GRESIE l. c.

27) ALEX. TRALLIANUS de arte medica Lib. I. c. 9. — Q. SERENUS medicina. cap. de prurigine, papulis et scabie.

28) SÖNNERAT *Reisen nach Ostindien*. 1. B. p. 101. — RODSCHIED *medic. chirurg. Bemerkungen*.

29) LESCHEN in LODERS *Journal für die Chirurgie*. 2. B. 1s St. p. 179.

ticum, cum oleo ³⁰⁾, *sulphatem aluminis* ³¹⁾, *sulphatem zinci* ³²⁾ ipsi haud tentavimus. *Tartratem stibii et potassae* cum *axungia porcina* ³³⁾ utiliter herpeti illinitum fuisse affirmatur ³⁴⁾. In herpete syphilitico, aut saltem syphilidi juncto, *mercurius tum muriaticus oxygenatus* ³⁵⁾, tum *acetatus* ³⁶⁾, tum *oxydatus* ³⁷⁾ locum sibi vindicat. Et *graphites* jure sibi laudem promeruit ³⁸⁾. Ita *ceratum nicotianae tabaci* ³⁹⁾, *decoctum corticis nucum juglandis*

30) NEUMANN l. c. — Drachma una acidī ad unciam unam olei amygdalarum adhibetur.

31) FRAUENDORFER unguentum a GRÜNLING depromptum laudat: R. Gummi Tragacanthi, in aqua plantaginis soluti, unciam unam, aluminis, mercurii sublimati corrosivi aa drachmam unam, quae ultimi remedii dosis, nisi in vehiculo plurimarum librarum, nimia est.

32) BELL on ulcers.

33) R. Tartari emetici drachmam unam. Axungiae porcinae unciam unam. M.

34) Clar. MALFATTI, medicus Vindobonensis.

35) BELL l. c. — OSWALD in HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde*. 23. B. 3^a St. p. 40.

36) STYX in HUFELAND's *Jornal* 3. B. 1^a St. p. 174.

37) THILENIUS *medic. chirurg. Beobacht.*

38) R. Graphitis optimi drachmas sex. Axungiae porcinae drachmas decem. M. Illiniatur bis de die locus affectus.

39) Succī nicotianae, cerae flavae aa uncias tres. Resinae pini unciam unam et semis. Terebinthinae unciam unam. Olei myrrhae q. s. ut fiat ceratum. (Vogel l. c.).

juglandium viridis ⁴⁰⁾, *aqua calcis* ⁴¹⁾, *subborax sodae* ⁴²⁾, *magnesium* ⁴³⁾, *cuprum viride aeris* ⁴⁴⁾, *ammonia* ⁴⁵⁾, *oleum animale* DIPPELII ⁴⁶⁾ et *vesicatorium* plagae herpeticæ, certe non in facie, impositum ⁴⁷⁾. *Plumbi* quidem boni in herpete extant effectus ⁴⁸⁾, at hujus remedii usum hic cum LORRY ⁴⁹⁾ veremur. Nec libenter *arsenico* ⁵⁰⁾, excepto herpete rodente aperte indolem carcinomaticam prae se ferente, locum concedimus. *Tutius pulvis carbonum, herba conii maculati, hyoscyami nigri, et praecipue solani nigri* ⁵¹⁾ adhibentur.

4. Occa-

40) *Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte.* 12. B. p. 237. R. *Corticum viridium* nucis juglandis siccatarum unciam unam. Infunde c. s. q. aquae libra una. Post tres horas infusio ebulliat per horae quadrantem, refrigerata coletur.

41) HUFELAND's *Journal* 16. B. 3s St. p. 209.

42) LÖFFLER *Beiträge.* 1. B.

43) GRILLE et MORELOT l. c.

44) DESSAULT *Journal der Chirurgie.* 3. B.

45) MARTINET *expériences nouvelles sur les propriétés de l'acali volatil, fluor.* Paris 1780.

46) ALIBERT l. c. §. 301.

47) BLOCH *medic. Bemerkungen.* p. 97.

48) THEDEN *Unterricht für Wundärzte.* TODE *medicin. chirurg. Bibliothek.* 1. B. 3s St. — 6. B. p. 233.

49) L. c. p. 341.

50) ADAIR in *Comment. von Edinburgh.* 9. B. p. 35.

51) ALIBERT l. c. §. 302.

Connubi-
um remedi-
orum ext.
et intern.

4. Occasionem remedia interna externis jun-
gendi sese saepius in herpete offerre, non est cur
moneam. Oportet vero, ut hoc connubium ita
locum habeat, ut illa haec mutuo sustineant.
Rebellis caeterum herpes haud raro *noli me tange-
re*, veluti exclamat, quod probe retinendum est.

CAP. XXXIII.

De Tinea.

§. CXXVII.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. **F**olliculi mucosi sive pustulae partis capillatae
capitis aut faciei, humorem viscidum in coagulum
pronum, ac in crustas desinentem fundentes, *ti-
neam* sive *capitis* ⁵²⁾, sive *faciei* ⁵³⁾ constituunt.

2. Tineae

52) *Sahafati* ARAB. GERM. *Kopfgrind, Erbgrind, der
Vierziger*. GALL. *Teigne, tigne*. ANGL. *Scald-head*.
ROSS. Шолуди. POLON. *Parch*.

53) *Crusta lactea, lactumen infantum*. GERM. *Milchbor-
borke, Sägesprünge, Milchschorf, Milchgrind*. GALL.
Crôte laiteuse. Rache à feu volage. ANGL. *Milk-scab*.
ROSS. Моложной спрунь огникъ. POLON. *Ognik*.

2. Tineae capitis, veteribus notae⁵⁴⁾, doctri- Historia.
 nam praecipue MURRAY⁵⁵⁾, CHIARUGI⁵⁶⁾, STEG-
 GER⁵⁷⁾, GALLOT⁵⁸⁾, ALIBERT⁵⁹⁾, HOME⁶⁰⁾ et
 VOGT⁶¹⁾ excoluerunt. De tineae faciei pulcre scri-
 pserunt: STRACK⁶²⁾, ROSTAGNI⁶³⁾, MOLITOR⁶⁴⁾,
 CORDES⁶⁵⁾, SAMBSTAG⁶⁶⁾ et WICHMANN⁶⁷⁾.

§. CXXVIII.

*Symptomata. Autopsia cadaverum. Analysis
 chemica.*

1. Tinea pro varia sede et vi varia exhibet Generatim
 symptomata.

2. Ti-

54) Cap. I. §. 1. 2.

55) De medendi tineae capitis ratione paralipomena.
 Opusc. T. II. p. 230.

56) Op. c.

57) Diss. de tineae. Budae 1782.

58) *Recherches sur la teigne.* Paris 1802.

59) Op. c.

60) Diss. de tineae capitis. Edinb. 1803.

61) Diss. de tineae capitis. Vitemb. 1805.

62) *Von dem Milchschorf der Kinder und einem specifischen
 Mittel darwider.* A. d. L. Weimar 1788.

63) Doctis animadversionibus versionem italicam opusculi
 STRACKII ornavit.

64) Diss. de crusta lactea. Budae 1783.

65) Diss. de crusta lactea. Goett. 1796.

66) Diss. de crusta lactea. Erlang. 1804.

67) *Ideen zur Diagnostik.* 1. B. p. 43.

T. capitis
benigna.

2. *Tineam capitis benignam* pruritus inter capillos, cutis tensio et ardor, ac interdum porrigio glandularumque circa collum et caput positarum tumor, attactum respuens, praecedunt. Nonnullis caput dolet. Aucto pruritu, augetur scalpends necessitas, quo sub opere aut tumor latus, aut pustulae percipiuntur. Ille ostiolum ductus folliculosi, ex quo humor glutinosus, melleus manat exhibet; hae liquidum album, flavescens continent, illudque disruptae fundunt. Ichor iste foetidus inter capillos effusus, ab aëris attactu in crustas variae formae et consistentiae desinit. Sunt enim crustae hujusmodi nunc orbiculares, tenues, in medio excavatae, ad margines elevatae ⁶⁸), — nunc irregulares, granosae, griseae fuscae ⁶⁹); nunc furfuraceae, albae, mox siccae deciduae, mox humidae, adhaerentes ⁷⁰); nuncque flavae, viscosae, crines conglutinantes ⁷¹). Praeterea ALIBERTUS tineae, sub forma squamarum lucidarum, coloris argentei, obvenientis crinesque in fasciculos colligentis, nobis haud visae meminit ⁷²). Externa crustarum superficies dum secedit, ex materia subtus latente, nova iterum for-

68) *Tinea favosa* (*Teigne faveuse*) ALIBERTI. op. c. T. I. Achores, favi, Auctor.

69) *Tinea granulata* (*Teigne granulée*). Op. c. Tab. II.

70) *Tinea furfuracea* (*Teigne furfuracée*). Op. c. Tab. III.

71) *Tinea muciflua* (*Teigne muqueuse*). Op. c. Tab. V.

72) *Tinea asbestina* (*Teigne amiantacée*). Op. c. Tab. IV.

formatur. Interea cutis subjecta magis magisque afficitur et textus cellulosus eroditur. Nonnunquam et pediculorum proventus observatur. Vigentibus hisce symptomatibus aeger caeterum plerumque optime se habet, interdum vero marescit.

3. Pustulae tineam capitis constituentes ali-
quando in vera desinunt ulcera, ichorem foet-
lissimum largientia, crustis saxeis cooperta, ac
cranii ipsius cariem minitantia. Haec *tinea* di-
citur *maligna*. T. cap. ma-
ligna.

4. *Tinea faciei benigna*; morbus plerumque
infantis, praevia morositate et inquietudine ac
umore glandularum colli, ad genas, frontem,
mentum, retro aures, obvenit. Cutis partium af-
ficiendarum primum rubet, splendet, tenditur,
tumescebat, calet, prurit ⁷³⁾; ac dein pustulis pel-
lucidis, magnitudine lentium, sero flavescente re-
pletis, obsidetur. Hae, saepissime pruritus ter-
minantes, sponte vel vi disruptae, liquorem tena-
cem, flavum effundunt, cujus externa superficies
in crustas ex luteo rubras, friabiles desinit. Ri-
dis hujusmodi crustae fatiscunt, quo fit, ut no-
vus inde emergat liquor, iterum in crustas termi-
natus. Obducitur saepe ita universa facies lar-
vae instar, unis exceptis palpebris. Oculi, evo-
luta T. faciei
benigna.

73) Recens nati pruritus, partem affectam cuivis obje-
cto affricando, manifestant.

luta tinea, immunes manere solent; non ita aeger prorumpente impetigine, vel ea retropulsa, quae scilicet in casu *peculiari ophthalmiae* ansa porrigitur. Saepius malum ad *ures* fertur, ac sanie ex earum meatu effluit. Ad oris cavum illud WICHMANN observavit. Eruptio plerumque per duodecim vel quindecim dies durat, ac totidem fere exsiccatio. Totus morbus spatio nonnullorum mensium, sub lotii instar urinae felis foetentis largiori fluxu, absolvitur.

T. faciei
maligna.

5. *Tinea faciei maligna* ⁷⁴⁾ perpetuo pruritu stipatur, in profundum serpit, sanie rodentem fundit, facile oculos in consensum trahit, ac nisi ei auxiliemur, per annos durat et interdum macie, febre lenta, et morte terminatur.

Autopsia
cadaverum.

6. Sedes tineae capitis in bulbis capillorum locata est ⁷⁵⁾, verum eos omnino sanos detexit CHIARUGI ⁷⁶⁾. Ut ALIBERT autumat, sedes huius morbi in rete vasculoso cutaneo quaeri debet ⁷⁷⁾. Idem per cadaverum sectiones demonstravit, malum non ad sola tegumenta circumscriptum esse, sed aponevrosin occipitalem, periosteum et superficiem externam cranii attingere.

7. Ana-

⁷⁴⁾ *Crusta serpigiosa* WICHMANNI.

⁷⁵⁾ MURRAY l. c. p. 236.

⁷⁶⁾ L. c. p. 187.

⁷⁷⁾ L. c. §. 42.

7. *Analysis chemica* docet, crustas tineae albumen, gelatinam et phosphatem calcis continere 78). Analysis chemica.

§. CXXIX.

C a u s s a e.

1. *Tinea capitis benigna* morbum sistit inter Prædispo-
epocham dentitionis et pubertatis constitutiones nentes.
omnis generis invadentem. *Tinea capitis maligna*
praecipue in scrophulosis, syphiliticis aut alia la-
e imbutis evolvitur. Idem de *tinea faciei ma-*
igna dicendum est. *Benigna* inter sextum et duo-
decimum aetatis mensem, praecipue apud infantes
facie subrotunda, pingui, cute candida, genis
profunde aut ex flavo rubris instructos, obvenit.

2. *Tinea benigna* in genere a singulis caussis, Excitantes.
quae affluxum humorum caput versus promo-
rent, excitatur, hinc a stimulo dentitionis, a ve-
amentis et fasciis, quibus infantum capita obtegi,
ut eorum corpuscula involvi solent, a sensuum
nimique facultatum evolutione, a voracitate etc.
Praeterea ipsa lactis conditio, praesertim si nutri-
es ab animi pathematibus excrucientur, vel li-
quoribus fermentatis abutantur, in hunc morbum
influit. Ita immundities, cubicula humida, prae-
er modum calida. De contagio, quod MERCU-
RIALIS

78) ALIBERT l. c. §. 46.

Frank Prax, I, 2.

G g

RIALIS ⁷⁹⁾, CHIARUGI ⁸⁰⁾, MELLIN ⁸¹⁾, BÜCKING ⁸²⁾, HAHEMANN ⁸³⁾, alique accusarunt, ex cepta tinea venerea, nec suspicionis umbram habemus. Alia insecta, vel forte vermes hic subesse, SWEDIAUER suspicatur ⁸⁴⁾. *Caussae tineae malignae* sponte elucent.

Proxima. 3. *Caussam proximam tinearum benignarum* in exuberantiam humorum locamus, qui non aliter per integumenta infantum, quam succi arborum juniorum per corticem exsudare videntur. In graviore malo, processus inflammatorius, secretionem morbosam largiens, evidens est, qui apud infantes labe aliqua infectos, specificum characterem induere solet.

§. CXXX.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.

1. *Tinea cum strophulo, cum hydroa et cum herpete* confundi potest.

Distinctio
a strophu-
lo.

2. *Tinea faciei* a strophulo distinguitur, cum ibi *pustulae*, hic autem *papulae* praesto sint. Porro in strophulo neque pruritus, neque rubor, neque

79) Op. c. Part. I. cap. 10.

80) L. c. p. 190.

81) *Kinderarzt*, p. 106.

82) BALDINGERS *neues Magazin für prakt. Aerzte*. 7. B. 3. St. p. 257.

83) BLUMENBACH *medic. Biblioth.* 3. B. p. 701.

84) L. c. p. 221, in nota.

neque tensio cutis, tineae faciei comites, observantur.

3. Tanta similitudo aliquando inter *hydroam* ^{Distinctio} *febrilem* genas et labia occupantem et *tineam faciei* ^{ab hydroa.} occurrit, ut, nisi aetas aegrorum, morbi que praegressi lucem afferant, diagnosis ardua evadat. Nullum enim aliud discrimen inter hos morbos hucusque nobis detegere licuit, nisi quod *tinea faciei* majori cutis irritatione, quam *hydroa*, stipatur; *hydroa* autem crustas duriores, sicciores magisque nigricantes, quam *tinea faciei* exhibeat.

4. *Herpes* solum cum *tinea maligna*, utpote ^{Distinctio} *ab herpete;* quae pariter prurit ac serpit, confundi potest, ac revera, eundem forte morbum, quem in infantibus *tineam malignam* vocamus, in adultis pro *herpete* declaramus. Si enim quaedam datur differentia, haec nonnisi in crustis, in *tinea* majoribus, quam in *herpete*, quaeri potest.

5. *Tineam* nequaquam cum MURRAYO ⁸⁵⁾ et ^{Indoles ti-} *neae.* CHIARUGIO ⁸⁶⁾ pro vitio locali habere possumus; totum enim morbi curriculum, eam cum universo systemate evidenter cohaerere, docet. Quaenam autem corporis conditio *tineae* ansam porrigat, arduum est determinare, nisi admittamus, *tineam benignam* ex diathesi inflammatoria, — *malignam* vero ex diathesi sive scrophulosa, sive venerea,

G g 2

pullu-

85) L. c. p. 234.

86) L. c. p. 198.

pullulare. Varias tineae species ex varia crustarum forma statuere, supervacaneum existimamus.

§. CXXXI.

P r o g n o s i s.

Periculum 1. *Tinea benigna*, quamcunque partem occupet, vitium quidem sistit foedum, ast adeo periculo destitutum, ut potius pro *salutari* haberi queat. Antiqua haec est vulgi opinio, „nec vulgus tam saepe, ac medici opinantur, de morborum successione judicando, a vero aberrat.“ Interea infantes graciles, sub mala cura, a tinea hinc inde extenuari non reticebimus, ne dicamus de tinea maligna, morbo, ut ipsum nomen fert, periculoso, saltem si unis naturae viribus committatur.

Retrocessus. 2. Nil magis salubritatem tineae comprobatur, quam mala, quae ex incauta illius sanatione sive spontanea fuga oriuntur. Huc pertinent hydrops pectoris ⁸⁷⁾, inflammatio cerebri ⁸⁸⁾, insania ⁸⁹⁾, diarrhoea ⁹⁰⁾, ac, ut vidimus, ophthalmiae rebelles et tussis ferina. Neque hydrocephalum acutum, de die in diem frequentiore, impeditae per tonsuram

87) Plura exempla hydrothoracis ex tinea praepostere sanata, pater meus in propria praxi collegit.

88) SCHENK obs. lib. I. obs. 13. p. 15.

89) LORRY l. c.

90) ALIBERT l. c. §. 34.

ram evolutioni tineae capitis, morbi hodieum re-
vera rarioris, adscribere haesitamus.

3. Tinea capitis caeteris paribus prae illa fa-
ciei rebellis esse solet. Vidimus tamen et hanc
ad menses et annos extensam fuisse. Saepe mor-
bus, qui profligatus videtur, de novo recrudescit.
Quo citius in tinea faciei benigna crustae crustas
insequuntur, quoque maturius lotium foetorem
urinae felis acquirit, eo citius sanitas expectari li-
cet. Saepe sponte tinea haec absoluto dentitionis
opere evanescit. Eodem pacto rebellis tinea ca-
pitis adventante epocha pubertatis, hic saepe re-
ardata, haud raro profligatur. In genere mirifice
partes genitales in partem capillatam capitis influ-
unt et vice versa ⁹¹⁾).

§. CXXXII.

C u r a.

1. *Prophylactica* morborum cutis in genere et *Prophyla-
ctica.*
infantum in specie ⁹²⁾, tineae tum capitis, tum
faciei plane adaptari potest. Inprimis caveamus
oportet, ne evolutionem horum morborum reme-
diis externis impediamus.

2. Levior *tineae capitis* gradus, in infante *C. t. capi-
tis.*
caeterum sano, praeter victus et reliqui regiminis
rationem, nulla exposcit auxilia. Solum studen-
dum est, ut singula emunctoria aperta sint, inpri-
mis

91) ALIBERT l. c. et §. 24.

92) Cap. I. §. VI. 3.

mis ut alvi evacuatio rite procedat, utque pediculorum impediatur proventus. Praesentes, aliorum insectorum instar, necantur; optime conducere solet *unguentum* ex *butyro* recenti et *seminibus veratri sabadillae* paratum, quod crinibus citra refrigerationis periculum rescissis, inungitur, circumdato arcte capite, ne pediculi aufugiant. Pluries eandem repetere juvat operationem, ut vel eorum ovula destruantur. In graviore morbo, eoque recenti, si aegrotulus fuerit floridus ac irritatio in parte capillata magna, *hirudines* cum levamine retro aures ponuntur, exhibitis repetitis lenibus *alvi purgationibus* et *semicupiiis*. Evoluta plene tineae, crustae emolliendae, ac ut decidant, praeparandae sunt. Optime huic scopo *cataplasma* ex herba *malvae rotundifoliae*, cum *butyro* insulso recenti, continuo impositum, inservit. Si saxearum crustarum indoles actionem hujus remedii eluderet, pars illarum durior, prius *novaculâ* caute auferenda foret. Abactis crustis, loca subjacentia decocto malvae, vel aqua tepida, vel urina ⁹³⁾ quotidie lavanda, ac *unguento emolliente* sive *butyro* inungenda sunt, quo facto caput, mitrae aut cucuphae specie ex vesica porcina, cooperitur. Si nova in conspectum veniret tineae eruptio, ea non impedienda ac peracta uti prima curanda foret, donec morbus sponte evanescat. Nisi hoc nonnullorum

93) GUYON *leçons diverses*. Vol. 2. p. 529. In Italia hanc methodum saepe profuisse vidi.

lerum mensium curriculo contingat, simul ad remedia interna, diatesi scrophulosae sive venereae accommodata, confugiendum est. Primo in casu *sulphuretum antimonii et hydrargyri cum extracto conii maculati* optime nobis satisfacit, exhibito simul decocto ex *stipitibus solani dulcamarae, radis smilacis chinae et juniperi communis*. Tineae venereae rebelles solo usu interno *muriatis oxygenati mercurii* debellantur. Dum et interna remedia per debitum tempus adhibita effectu destituuntur, praecipue si ulcera tineae pravum exhibeant adspectum, auxilia validiora externa indicantur. Hujusmodi sunt: *herba conii maculati* ⁹⁴), *solutio muriatis oxygenati mercurii* ⁹⁵), *unguentum hydrargyri vel album* ⁹⁶), vel *rubrum* ⁹⁷), *acidum salis*

94) STÖRK de cicuta p. 173. MURRAY l. c. p. 241. — STÖLLER *Beobachtungen und Erfahrungen*. Gotha 1777. p. 139. R. Herbae malvae uncias quatuor, coque c. s. q. lactis, sub finem adde pulveris herbae conii maculati unciam unam. Butyri recentis uncias tres. M. f. cataplasma molle.

95) BELL l. c. p. 241. — DUNCAN *Krankengeschichten* p. 118. R. Aquae destillatae libram unam. Sublimati corrosivi grana duodecim, ad scrupulum unum.

96) R. Mercurii praecipitati albi drachmam unam. Axungiae porcinae unciam unam. M.

97) Butyri recentis uncias duas. Cerae albae liquefactae drachmas tres. Mercurii praecipitati rubri, camphorae aa drachmam unam et semis.

salis ⁹⁸⁾, *acidum nitricum* ⁹⁹⁾, *aerugo* ¹⁰⁰⁾, *cantharides* ¹⁾, *cineres bufonum* ²⁾, *nitras argenti fusus* ³⁾, ne de periculosis nonnullis e. c. de *nicotiana tabaco* ⁴⁾ et de *arsenico* ⁵⁾ loquamur. De

98) BRÜCKMANN in HUFFELAND's, SCHREGERS und HARTLES *Journal der ausland. medic. Litterat.* 1803. 1. Th. p. 40. — THILENIUS *medic. chirurg. Bemerk.* p. 494.

99) ALIBERT l. c. §. 61.

100) THOMANN *Annal. Würceb.* Vol. 2. p. 330. — DESSAULT *ausert. chirurg. Wahrnehmungen.* No. 191. — STARKE *klinisches Institut.* p. 30. — DUNCAN *medical cases and observations.* Edit. 3. p. 197. R. *Aeruginis drachmam semis. Axungiae porcinae drachmas duas. Illiniatur caput mane et vespere ad drachmam semis.*

1) *Nosografia per l'anno 1789.* p. 171. — WENDT *fünfte und sechste Nachricht.* Octava pars cantharidum unguento simplici miscetur ad illinienda ulcera dura.

2) *Mercure de France.* Mois d'octobre 1777. p. 190. — STOLL *Praelect.* p. 285. *Berliner Sammlung.* 7. B. p. 70. Arcanum hoc munificentia LEOPOLDI II. pretio conspicuo a presbytero (PIEVANO FORZONI) emptum et publici juris factum est.

3) *Lapide infernali margines ulcerum indurati destruuntur, quo facto filamenta carpta, butyro illinita, superimponuntur. Potest et butyrum antimonii eodem scopi adhiberi* (GHERLI *Centuria prima d'osservazioni rare di medicina e cirusia.* Venezia 1731. p. 15).

4) *Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte.* 12. B. p. 457. Commendatur decoctum nicotianae, cujus effectus letales recensentur in *Journal de médecine continué.* Vol. 15. p. 289.

5) De letifera applicatione arsenici vide *Breslauer Samml.* 2. B. p. 114.

pulvere carbonum ⁶⁾ et de *sulphure* ⁷⁾ propriam adhuc desideramus experientiam. Magnas huic remedio laudes ALIBERT ⁸⁾ ac VYLIE ⁹⁾ tribuunt. Si omnia nos desererent remedia, saltem pro pueris robustis ac parum sensilibus, ad crudele quidem, sed efficax remedium *evulsionem* scilicet *capillorum* ¹⁰⁾, deveniendum foret.

3. Si

6) THOMANN l. c. ad. an. 1800. p. 10. 137. — ALIBERT. l. c. §. 64.

7) SCHACK in MURSINNA's *Journal für die Chirurgie* 2. B. 18 St. p. 134. Unguentum JASSERI tineae il-linitur.

8) L. c.

9) Sequentem methodum nobiscum communicavit illustrissimus vir. — 1. Radendi de capite capilli. 2. Caput aqua tepida saponacea perlavandum. 3. Partibus capitis tineae inquinatis axungia porcina inungatur, posteaque eadem iterum aqua tepida saponacea perlaventur. 4. Denique fiat frictio hisce: R. Hydrosulphureti potassae drachmas duas. Solve in aquae calcis unciiis decem. — R. Unguenti nitratis hydrargyri q. s. quotidie assidue eodem inungendum; praeter hoc etiam unguento picis aridae cum floribus sulphuris mane et vespere. 5. Interne decoctum specierum quaiaci compositarum et pilulae Plumeri.

10) Sine hac pilorum evulsione, tineam plerumque redire, testatur THILENIUS. Quas nulla methodo sanare potuit tineas, has Hebraeus per capillorum evulsionem sanavit, testante GESSCHER (*TODE arzneymund. Annual. 4s Heft. p. 24*). Operationem hanc defendunt et CHIARUGI (l. c. p. 105) et BERTRANDI (l. c. p. 192)

atque

T. faciei.

3. Si *tinea faciei* nimias molestias generaret aut limites excederet, frenum illi imponitur leni sive *emetico*, sive *purgante*, ac potissime usu *herbae violae tricoloris*¹¹⁾. Commendabatur primum hoc remedium ab egregio STRACK ac illius efficaciam THILENIUS, ROSTAGNI, J. P. FRANK¹²⁾, HAASE¹³⁾, quorum suffragiis plane accedimus, confirmarunt. Exhibentur folia vel recentia¹⁴⁾, vel sicca

atque eam praepostere plane rejiciunt EVERS (Act. Acad. Goetting. 1790) et ALIBERT (l. c. §. 57). Methodus evulsionem capillorum perficiendi sequens est. Si paucas solummodo capitis plagas occupet tinea, tunc volsella capillis prope radices apposita, hi ipsi cum bulbis extrahendi sunt. Si magis extensa est, tunc methodo a KNACKSTEDT exposita (BALDINGERS *neues Magazin für Aerzte* 7. B. p. 440), emplastrum paratur ex pice alba ad ignem liquefacta, cum panxillo farinae scallinae ac oleo olivarum, quod linteis, digito vix latioribus, sat longis, numero quatuordecim, aut octodecim, commissum ac leviter calefactum, tinea, resectis prius capillis, imponitur et post horam sine impetu ac lente, cum sat multis, qui huic adhaerent capillis, detrahitur, ac pro re nata iterum aliquoties imponitur. Sunt, qui simili ac longe rudiori methodo caput sine misericordia quasi decorticent.

11) JACEA off.

12) Epitome l. c. p. 203.

13) Diss. de viola tricolore. Erlang. 1782.

14) R. Herbae violae tricoloris sine radice, floribus aut semine manipulum unum, coque in lactis libra una. Post levem ebullitionem coletur; exhibeatur haec dosis

icca ¹⁵⁾. Lotium aegri citissime sub usu hujus
 harmaci odorem urinae felis contrahere solet.
 unt, qui violae tricolori *folia farfarae tussila-*
inis ¹⁶⁾ et *primulae veris* ¹⁷⁾ anteponant. Externis
 emediis hac in tineae specie opus haud est. In-
 erim crustas vel lacte nutricis, vel unguento emol-
 iente ¹⁸⁾ emollire, minime nocebit. *Tinea mali-*
na balnea universalia, corticem mezerei vel ve-
 icatorium perpetuum ad nucham, et usum inter-
 num *sulphureti hydrargyri et antimonii* exposcit.
 In debilibus connubium *corticis cinchonae* cum
radice smilacis chinae vel *sarsaparillae* admo-
 dum conducit.

spatio nychthemeri ac continuetur, donec facies mollis
 nec amplius tumida sit atque urina foetorem deponat.

15) R. Pulveris herbae violae tricoloris drachmas tres,
 sacchari drachmam unam. M. D. S. ter de die ad cu-
 spidem cultri. Vel: R. foliorum violae tricoloris unciam
 semis. Coque ad colaturam unciarum quatuor c. s. q.
 aquae. D. S. Ter de die cochleare majus cum lacte et
 saccharo.

16) ABRAHAMSON in *Archiv der prakt. Arzneykunde*. 3. B.
 p. 20.

17) UNZER *medic. Handbuch*. p. 455.

18) BERTRANDI sequente linimento utebatur: R. Olei e
 vitellis ovorum uncias duas. Aquae liliorum alborum
 uncias quatuor. Croci orientalis scrupulum unum. In-
 simul agentur ad formam linimenti.

CAP. XXXIV.

D e L e p r a.

§. CXXXIII.

Definitio. Divisio. Variæ species.
Autopsia cadaverum.

Definitio. 1. *N*omen *leprae* atrocissimo impetiginum generi tribuitur, quod sub forma sive vitiliginis diffusae, sive squamarum, sive tuberculorum, sive augmenti partis monstruosi apparet, ac morositate, stupore et plerumque anaesthesia cutis affectae stipatur.

Divisio. 2. *Lep*ra ita definita impetigines adspectu diversas amplectitur, quae, ut ordinatim describi possint, in *lepram albam*, in *L. squamosam*, in *L. elephantiasin*, et in *L. partialem* dividi debent.

L. alba. 3. *Lep*ra *alba* ¹⁹⁾ antiquissima et in sacris paginis ²⁰⁾ memorata est. Occurrit ea hodie dum adhuc in Arabia ²¹⁾, ac descripta invenitur potissime apud

¹⁹⁾ Zarah Hebraeorum — Baras Orientis — Λευκη
 GRAEC. — GERM. *Der weisse Aussatz*.

²⁰⁾ MOSES in Levit. c. XIII. v. 2. et sequent.

²¹⁾ NIEBUHR *description de l'Arabie*. p. 119.

apud AVICENNAM ²²), OUSEEL ²³), RUSMEYER ²⁴), WEDEL ²⁵), WITHOFF ²⁶), SCHILLING ²⁷) et HENSLE ²⁸). Nuntiatur a vitilagine alba, quam leprosam vocavimus ²⁹), vel ab aliis maculis sive pustulis rubris, citrinis, lividis, nunc duris, nunc mollioribus. Evolutio magis morbo, non solum superficies cutis, sed et illius contextus, cum carnis subiacentibus, ad ossa usque afficitur. Corporis superficies inde dura, fissa, aspera fit. Abominatur sensus tactus, pilique albi lanuginosi redduntur. In magno morbi gradu cutis squamis et rhaadibus obtegitur, ulcera occurrunt serpentina (*L. syria*) cum carne luxuriante; pili decidunt (*L. alopecia*), ungues corrumpuntur, oculi, neque ruri, neque lucem respicientes, lacrymantur; palpebrae invertuntur, nares oppilantur, emunctio

22) Canon. Lib. IV. Fen 3. Tract. 3. cap. 1. Fen 7. tract. 2. cap. 9.

23) Diss. de lepra cutis Hebraeorum. Francf. 1709.

24) Diss. de lepra Mosaica seu legali. Gryphisw. 1723.

25) Program. de lepra in sacris 1715.

26) Program. de leprosis veterum Hebraeorum. Duisburg. 1756.

27) Diss. de lepra. Lugd. Batav. 1778. (BALDINGER Sylloge III. No. 1). Et: de lepra Surinamensi communicationes. Edit. Hahnii.

28) *Vom abendländischen Aussatze im Mittelalter, nebst einigen Beyträgen zur Kenntniss und Geschichte des Aussatzes.* Hamb. 1790. p. 195.

29) Cap. XVI. §. LXXVI. 4.

adest frequens; saliva copiose secernitur, gingivae et labia eroduntur; praeterea diarrhoea colliquativa, urina alba, crassa pinguis, fere sanios observantur, donec tandem tabes et hydrops mortuerrimae vitae finem imponant.

L. squamosa.

4. *Lepra squamosa* ³⁰⁾ vulgatissimam nobis quae quinquies visam speciem sistit. Historia illius cum ea leprae elephantiasis confunditur. Speciatim tamen de lepra squamosa scripsere, praeter HENSLERUM ³¹⁾, HELVETIUS ³²⁾, FORESTUS ³³⁾, SCULTET ³⁴⁾, WILLIS ³⁵⁾, COOK ³⁶⁾, FALCONER ³⁷⁾, BONORDEN ³⁸⁾, MECKEL ³⁹⁾, LARREY ⁴⁰⁾, WIL

LAR

30) *Lepra Graecorum. Lepra Ichthyosis. Impetigo ex corticativa.* GERM. *Der schuppige oder rautige Ausatz.* Ross. *Прокказа бешуйчатая.*

31) L. c. p. 362.

32) Diss. de Graecorum lepra. Lugd. Bat. 1678.

33) Observ. chirurg. L. IV. obs. 9.

34) Armament. chirurg. obs. 97. p. 309.

35) De medicamentorum operationibus Sect. 3. cap. 7.

36) *Second voyage.* T. 2 p. 245. 278. 310. 366. T. 3 p. 404. T. 4. p. 70.

37) *Memoirs of the medical society.* Vol. 3. No. 18.

38) Diss. de lepra squamosa. Halae 1795.

39) Diss. de lepra squamosa. Halae 1795.

40) *Memoires de chirurgie militaire et campagnes etc.* Paris, 1812. 2. T p. 69.

LAN ⁴¹⁾ et METTERNICH ⁴²⁾. Saepe leprae squamosae vitiligo nigra indolis leprosaе diu praecedit. Alias a pustulis ⁴³⁾, a tinea capitis, ab alopecia, ab ophiosi nuntiatur, vel et cum rubedine totius cutis derepente ingruit. In genere evolutionem morbi lassitudo universalis, morositas, horrores cum caloribus ac aestu interno, fornicationis census inter cutem et carnem, inprimis faciei, et saepe febris, per plures, ut vidimus, menses protracta ⁴⁴⁾, interdum periodis stipata ⁴⁵⁾, concomitari solent. Impetigines, leprae prodromi, tractu temporis systema cutaneum magis magisque afficiunt, ita ut cutis crassa, coriacea, tensa, inflexibilis, aspera, arida, et sulcata evadat. Squamis vero potissime ea cooperitur, copiosis, duris, pollicis magnitudine, deciduis moxque reproductendis. Nonnullis in locis epidermis sub forma furfurum secedit. Sub squamis cutis ipsa cruda, rubra, fissa, erosa, cruenta est. Interea sensus tactus perit, vox debilis et rauca fit, vires tum a sudore nocturno, viscido, hircum redolente, tum a somno aggravato et saepe a suffocationis periculo interrupto, perstante licet ciborum maximo

41) L. c. p. 85.

42) HUFELAND und HIMLY *Journal der prakt. Heilkunde*. 1811. 108 St.

43) FALCÖNER l. c.

44) J. P. FRANK *Epit.* Vol. IV. p. 213.

45) P. I. Vol. I. §.

ximo desiderio, exhauriuntur animusque dejicitur. Urina sedimentum exhibet terreum, halitus foetet, mucusque narium et lacrymae tantam acredinem adipiscuntur, ut genae erodantur. In maximo morbi gradu, praevis ossium doloribus ac glandularum tumoribus, pustulae lividae cutim obsident, in ulcera rodentia transeunt, quae ligamenta capsularia hinc inde destruendo, extremum lapsui ansam porrigunt. Tandem lipothymiae et convulsiones, alternatim sibi succedentes, malorum catervam claudunt.

L. elephantiasis.

5. *Lepra elephantiasis* ⁴⁶⁾ summum morbi leprosi gradum constituit, ac genuinos nefandae aegritudinis characteres prae se fert. Ea haec est, quae in Aegypto et in India orientali ab antiquissimis temporibus endemica, imperante POMPEJO in Italiam ac reliquam Europam irruerat ⁴⁷⁾, ac dein per Saracenorum incursiones et tandem per bella

46) *Synonyma.* Satyriismus, satyriasis, syriasis, morbus heracleus, seu herculeus, cancer universus, cancer totius corporis, ulcus universale, morbus Phoenicius, morbus Lazari, malum Lazari, malum Hierosolymitanum, Elephantia, lepra Syriaca et Aegyptiaca, L. Americana, L. nigra, L. tuberculosa, mulsania. — *Λεπρῖασις* GRAEC. — *Khorah Hindous.* — *Judam, Jusam, Daül asad, Arab.* — *Boacsi Surinamorum.* GERM. *Der knollige Aussatz.*

47) PLINII natur. histor. §. 26. c. 1.

bella sacra ⁴⁸⁾ ita hic divulgata fuit, ut sub fine seculi decimi tertii novendecim millia nosocomiorum *unis* leprosis recipiendis dicatur ⁴⁹⁾ numerarentur. Saeviit porro lepra ista usque ad seculum decimum quintum (quo solum ad Rossiam pervenisse fertur ^{*})), sub cuius curriculo, acsi lui venereae adventanti locum cedere vellet, extingui coepit. Hodiedum ea, saltem in Europa, perrara est ⁵⁰⁾. Exactior descriptio tum leprae in genere, tum elephantiasis in specie apud ARETAEUM ⁵¹⁾,
CEL-

48) Apparet igitur opinionem, lepram per sacra bella in Europam introductam fuisse, erroneam esse. Primum enim bellum crucigerum in a. 987 incidit, et secundum in a. 1100. — Ast jam a. 630 lex lata fuit a Rege Longobardorum *Rhotario*, in qua leprosos civiliter mortuos declarat, atque vetat, ne mendicantes leprosi aliis accedant, jubetque, ut signum sui per sonitum concussi ligni edant (MURATORI antiquit. ital. med. aevi. T. 2. Diss. 16). Sic curia suprema per Regem PIPINUM ad COMPENDIUM a. 757 convocata, legem jam tulit pro dissolutione matrimonii leprosorum, iisque sacra loca adeundi facultatem ademit. (RAYMOND *histoire de l'éléphantiasis*. p. 108).

49) GERMAN. *Armen Leute Häuser, Lazarethe*. GALL. *Ladreries, léproseries*.

^{*}) RICHTER *Geschichte der Medecin in Russland*. 1. Th. p. 148.

50) Unum solummodo exemplum in mercatore Graeco vidi.

51) De causis et signis diuturn. affect. Lib. II. c. 13.

Frank Prax. I. 2.

H h

CELSUM ⁵²⁾, GORDONUM ⁵³⁾, FUMANELLUM ⁵⁴⁾,
 SCHMIEDELIUM ⁵⁵⁾, COZIERUM ⁵⁶⁾, BRUNATUM ⁵⁷⁾,
 VIDAL ⁵⁸⁾, CHAMSERU et COQUERAU ⁵⁹⁾, PEYSON-
 NEL ⁶⁰⁾, HEBERDEN ⁶¹⁾, DANIEL ⁶²⁾, LARREY ⁶³⁾,
 JOANNIS ⁶⁴⁾, VALENTIN ⁶⁵⁾, GOURLAY *), EDMON-

STON

52) Lib. III. c. 26.

53) Liliū medicinae. Lugd. 1574. cap. 22.

54) Sermo de lepra et elephante morbo. opp. p. 479.

55) Diss. de lepra. Erlang. 1750. v. HALLER collect.
 diss. pr. VI. N. 194.

56) Journal de médecine. Dec. 1757.

57) De leprosis apud Patavinos. Diss. posthuma.

58) De la lèpre de Martigue (Mémoires de la Société R.
 de médecine 1776). Ejusdem: second mémoire sur l'é-
 lephantiasis (ibid. a. 1783).

59) Recherches sur l'état actuel de la lèpre en Europe et
 réflexions sur le précédent mémoire. (ibid.).

60) Philosophical Transact. Vol. 50. P. I. p. 38. (De le-
 pra Insulae Guadeloupe).

61) Arzneykundige Abhandl. des Colleg. der Aerzte in
 Lond. 1. B. 2 art. p. 20. (De lepra Insulae Madera).

62) Systema aegritudinum. P. I. p. 213.

63) L. c.

64) Medic. Bemerkungen und Untersuchungen einer Ge-
 sellschaft von Aerzt. in Lond. 1. B. 18. art. p. 183. (De
 lepra Galloprovinciae).

65) Apud ALIBERT L. c.

*) Observations on the natural history, climate, and di-
 seases of Madera. London 1811.

TON *), ne de operibus jam recensitis SCHILLINGII et HENSLERI sermonem instituamus, invenitur. Pulchre historia leprae et a SPRENGELIO trahitur ⁶⁶). Ad *symptomata* elephantiasis quod attinet, morbus a maculis cum sensu cutis affectae deletus, a pustulis, a vitis unguum et crinium, ab ipsis denique haemorrhoidibus ⁶⁷) annuntiari solet. Raro illius evolutionem febris comitatur. Signa generalia sunt: „animi corporisque segnitie insolita, morositas, facilis iracundia vel in dolosuspicio, dispositio, insomnia tristissima, terribilis, ephialtes ⁶⁸), lascivia insueta ac major viri-
us coeundi potentia ⁶⁹); oculorum albedo obfusa, turbata, vel rubra, aut livida, aut in nigrum declinans, figura oculi rotunda, leonina;

H h 2. *vox*

*) *Edinburgh med. and surgical Journal* 1810.

⁶⁶) Op. c.

⁶⁷) HALY ABAS in emendis servis praescribit: „animum intueri, ne forte sint in eo emorrhoides, aut minus aut similia.“ (HENSLER l. c. p. 1.).

⁶⁸) *Gallice*: cochemar.

⁶⁹) Jam ARCHIGENES monuit, leprosis vehementem alacritatem ad coitum atque impetum in venerem esse. GALENUS leprosos satyris similes esse dicit, ob continuum fere priapismum. SCHILLING ait: vidi in aethiope stupendum priapum, ad veterum imaginem duabus ulnis (HENSLER l. c. p. 398). Lege et ALBERT op. c. p. 141. §. 421. Alias lepra evolutioni pubertatis obstat, vel coeundi potentiam infringit. (GOURLAY l. c.).

vox rauca, vel rarius acuta et subtilis, cum anhelitus foetentis strictura; narium exterius rubrarum, livescentium, interna angustatio, vel ulcus, frequens sternutatio et privatio olfactus; faciei inflatio, cum magna validaque rubedine, a pelle super fronte quasi tensa et lucente, nodosa adpectu torvo; capitis, superciliorum ac mentum porrigo; pilus rarior, mutatus, alopecia; — sudoris foetor, alvi tarditas; eructatio perpetua; lottum subjugale ac turbidum, interdum tenue aquosum; pulsus parvi ac lenti ⁷⁰⁾. “ Mala hujusmodi, quibus nodosa aurium deformitas addi debet, sensim sensimque plurimorum spatio annorum invalescunt, donec ad fastigium perducto morbo sequens obveniat rerum imago: „vox penitus extinguitur, foetorque animae et corporis cum spirandi labore, continuo increscit; sub lingua grandinosa ⁷¹⁾ rarinarum venarum varices quae et alibi ad pectus, ad tibias oriuntur, subnigrae comparent; secedunt pili vix non omnes ex caput et supercilia praetumida, liminaque palpebrarum et mentum, et axillae, et pubes tibiaeque glabrescunt; finduntur, incurvantur et corrupti labuntur ungues; musculorum torositas omnis disparat, inprimis illorum, qui inter pollicem et indicem digitum sunt positi; ciborum digestio prava

70) J. P. FRANK epitom. l. c. p. 217.

71) Tubercula palati adnotat VIDAL l. c. p. 170.]

et flatuum incommoda vel et fames⁷²⁾, in quibus-
 am canina, augentur; vix faeces alvus, ac ju-
 ventosam continuo vesica urinam expellunt; in-
 iusta veneris cupido ac tentigines in consumpto
 morituro⁷³⁾ jam homine intenduntur; extremi-
 tum articulos, phalanges, a carie latente erosa,
 tumores insensiles, alii juxta alios circumdant;
 et ulcera sicca, profunda, sensuque vix prae-
 sentia, deturpant, et cutis hinc inde in plicas cras-
 iores, nodosas elevata, in sulcos ac rugas aspe-
 ctu profundas, aut fissas alibi contracta, elephan-
 ti magis, quam humani pedis figuram aemula-
 tur; interdum nares, intermedia cartilagine erosa,
 collabuntur; aut prorsus, ut digitorum phalanges,
 non integra quoque membra⁷⁴⁾, a vivis, vel spon-
 taneè, ac sine dolore separantur⁷⁵⁾.“ Pulsus occul-
 tus, parvus, ad mortem usque.

6. Signa leprae, tum squamosae, tum nodo-L. partialis.
 e, nonnunquam in una solummodo parte obve-
 niunt, ac lepram partialem constituunt. *Lepra*
partialis squamosa frequenter in Europa occurrit,
 praesertim in

72) De *siti* quidem mentionem vix faciunt auctores de
 lepra, interea BRUCE continuam eam esse apud le-
 prosos Abyssinae monet (*Voyage en Nubie et Abyssi-*
nie. T. 3. p. 46).

73) Leprosi usque ad mortem satyriasin patientis exem-
 plum refert VIDAL l. c. p. 168. Vide et SCHILLING
 (op. c. p. 159).

74) VIDAL l. c. p. 168.

75) FRANK Epit. l. c.

praesertim ad cubitum, genua et in genere ad loca, ubi ossa mox sub cute jacent, capite non excepto. Ut plurimum utrumque latus occupat e. c. ambigua, tibiae etc. Formam exhibet macularum circularium, saepe in centro depressarum, ad margines elevatarum, halone rubro circumdata rum, squamis nunc densis ⁷⁶⁾, nunc tenuibus albis ⁷⁷⁾, nunc nigris ⁷⁸⁾ coopertarum in climatibus calidis prurientium. *Lepra partialis nodosa*, sive *elephantia* ⁷⁹⁾, de qua ALARD egregie scripsit * in Aegypto ⁸⁰⁾, in India ⁸¹⁾ et in Astu

rii

76) *Lepra vulgaris* WILLAN. l. c. p. 86. Tab. 8. *Lepra crustaceae* ALIB. op. c. Tab. 31. Tab. 33.

77) *Lepra alphas* W. l. c. p. 98. Tab. 9. fig. 1. *Lepra squameuse* ALIBERT op. c. Tab. 30.

78) *Lepra nigricans* W. l. c. p. 101. Tab. 9. fig. 2.

79) Arabes alique, monente HENSLERO, elephantiasin ab elephantia distinxerunt, sic, ut lepram universalem tuberosam, vocarent *elephantiam*, partialem verum pedis lepram nodosam, *elephantiasin*. Graeci, quos sequimur, contrario plane modo haec vitia denominabant. Recentioribus auctoribus nomen morbi glandulosi (*maladie glandulaire*) arridet. (ALARD op. c. p. 153).

*) *Histoire de l'éléphantiasis des Arabes, maladie particulière au système lymphatique, fréquente dans nos climats, quoique méconnue de nos jours.* Paris 1810.

80) Prosper ALPINUS medic. Aegypt. p. 56. — THEVENOT *Voyages* Vol. 1. p. 834. — LARREY l. c.

81) *De pedibus strumosis*, in India solitis, observationes

riis ⁸²⁾, aliisque forte Europae locis *), domicilium habet. Manus, imprimis autem pedes, afficit. " In plurimis sub morbi principio, febris manifesta, cum rigore, calore, deliriis, inguinisque dolore, tumore glanduloso, occurrit. Mox cruris in parte, aut utriusque inflatio, rubedo ac dolor, interdum cum stria rubra, sat lata, tensa, vasorum lymphaticorum decursum indicante, insequuntur: quo tempore et febris et tumor glandularum inguinalium subsidere observantur. Saepius, sed tempore incerto, haec febris revertitur; et in crure post quemvis insultum, incrementum tumoris, oedemati consimilis, sed magis renitentis, conspicitur: donec, sub melioris valetudinis,

si

suas cum tabula aenea communicavit CLEYER (Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. obs. 13. p. 52). Vide et TOWN (on the changes of the air and the concomitant epidemical diseases, in the island of Barbadoes p. 304). HENDY (a treatise on the glandular disease of Barbadoes), ROLLO (Remarks on the disease lately described by Dr. HENDY), HILLARY (observations on the changes of the air and concomitant epidemical diseases in the island of Barbadoes), ALARD (op. c. Tab. I.). In peninsula COROMANDEL et MALABAR idem morbus perical dicitur. (KAEMPFER amoenitat. exot. p. 561. fasc. 3. obs. 8).

82) TOWNSEND Voyage en Espagne fait dans les années 1786. 1787. — THIERRY observations de physique et de médecine faites en différents lieux d'Espagne. Vol. 2. p. 130.

*) ALARD op. c. p. 169. 198.

si modo sitim in quibusdam intensam excipiamus, adspectu. pedis elephantini figura, nunc aequalis, nunc per sulcos plicasque divisa, emergat et sub pelle crassiori, squamosa, humor tenax, glutinosus cellulosa dilatata, tenaciori ac varicibus depicta circumseptus, in substantiam lardaceam concrescat, vel ex cute disrupta per fissiones, per ulcera impura, fungosa destillet; aut pars ipsa, sine sensu, post longos modo annos, a vicinis separatur. Interdum localis hic tumor nunc manus, nunc brachium, nunc aures, nunc nucham, nunc dorsum, vel lumbos, nunc ipsa pudenda *), occupasse est visus ⁸³⁾ — Verisimiliter et *malum*, quod vocant *mortuum* ⁸⁴⁾ huc pertinet: consistit enim in pustulis crustosis, magnis, foedis, sine sanie, cum quadam insensibilitate et turpi adpectu in coxis et tibiis frequentius obvenientibus, subinde cum glandularum inguinalium tumore. Immo, ipse forte *cancer*, quocunque demum in loco

*) Sic in peninsula COROMANDEL et MALABAR, ad scrotum et ad testes contingit, qui morbus ab incolis *andrum* vocatur. (KAEMPFER amoenit. exot. p. 557. fasc. 7. obs. 8. — ALARD op. c. p. 114). In Japonia idem malum dicitur SENKI (ALARD. l. c. p. 117), quo nomine et in Aegypto occurrit (DESCENETES *histoire médicale de l'armée d'Orient*).

83) FRANK Epit. l. c.

84) SAUVAGESII spec. 6. — GALLICE: *Le mal mort*. Vide LORRY (l. c. art. 10. p. 395) et ASTRUC (de tum moribus Lib. II. p. 40).

oco contingat, speciem leprae partialis refert, quae de re plura infra.

7. *Cadaverum sectiones* docent, sedem praecipuam leprae in textu celluloso cutis esse, hancque corrupto, sensim carnes substratae et tandem ossa ipsa ad medullam usque vitiari et in massam informem mutari ⁸⁵⁾. Praeterea glandulae mesenterii infarctae, hepatis substantia durior, viscerisque volumen auctum, observata sunt ⁸⁶⁾. Ita, in lepra partiali, et dimensor vasorum lymphaticorum augetur ^{*)}.

§. CXXXIV.

Causae.

1. Lepra procul dubio saepe morbum haereditarium constituit ⁸⁷⁾. Hoc autem non impedit, quominus hinc inde leprosi sanam prolem generent ⁸⁸⁾, aut leprosi ex sanissima stirpe originem ducant ⁸⁹⁾. Infantes et mulieres rarius quam viri a lepra

⁸⁵⁾ SWEDIAUER l. c. p. 198. in nota.

⁸⁶⁾ LARREY l. c. p. 72.

^{*)} HENDY op. c. — ALARD op. c. p. 74.

⁸⁷⁾ MERCURIALIS op. c. lib. II. cap. 5. — VIDAL l. c. p. 164. — ALIBERT l. c.

⁸⁸⁾ FRANK Epit. l. c. p. 230.

⁸⁹⁾ Parentes mercatoris Graeci, quem cum elephantiasi curavimus, perfecte sani erant.

a lepra afficiuntur ⁹⁰). Nunquam aut mitissime ea labbrant eunuchi ⁹¹).

C. excitantes.

2. Excitari videtur lepra in praedispositis ab esu piscium corruptorum ⁹²) et carnis porcinae ⁹³), ab usu aquarum corruptarum ⁹⁴), liquorumque fermentatorum ⁹⁵), ab animi pathematibus ⁹⁶), a venere nimia, a frigore humido partibus denudatis admoto ⁹⁷), et ab immunditie ⁹⁸). De contagio specifico, lente insidias struente, quamvis a multis

90) GORDONIUS l. c. cap. 22. p. 95.

91) HENSLER l. c.

92) WILLIS l. c. — ALIBERT l. c. §. 22. Dari autem populos ichthyophagos leprae nequaquam subjectos, compertum habemus (*Voyage à la recherche de la Perouse*. T. 2. p. 72. et BIKARDIERE *Reise nach dem Südmeer*. 2. B. p. 49).

93) Sic leges MOISIS et MUHAMMEDI docere videntur, quamvis FISCHER aliter sentiat (Programmata de antiquissimo carnis esu, simul porcina ab insimulata malitia ista vindicat, quod nempe anceps hoc cibarii genus ad lepram corpora praecipitet. Erfurt. 1721). Et LARREY carnem porcina, saltem in Aegypto, pro causa leprae habet (l. c. p. 75).

94) ALPINUS l. c. p. 25.

95) VIDAL in *second mémoire*. p. 171. 175.

96) Ex terrore lepram evolutam vidit VIDAL l. c. p. 168. Mater terrefacta prolem leprosam generavit, uti videre est apud ALIBERT l. c. p. 144. §. 444.

97) WILLAN l. c. p. 97. — FALCONER l. c. p. 372.

98) WILLAN l. c.

multis in dubium vocato ⁹⁹⁾, tum leges Mosaicae, tum modus, quo lepra Europam invasit et adhuc per negotiationem veneliciariam propagatur, tum recentissimae observationes ^{*)} testantur. Contagium leprae admittunt et THOMAS ¹⁰⁰⁾, et LARREY ¹⁾. Tandem caussa lepram excitans in verminibus ²⁾, in tractatione Gymnoti electrici ³⁾, in insectis ⁴⁾ et in ipso demum cum elephantis commercio ⁵⁾ quaesita est.

3. Populi antiquitatis, praecipue Graeci, lepra C. proxima. ultioni deorum tribuebant ⁶⁾. Medici veteres eam a vitis quatuor humorum ⁷⁾ et praecipue ab atra bile ⁸⁾ repetierunt. Nostram hac in re igno-

99) ALEXAND. TRALLIANUS 2. problem. medicinal. probl. 42. — ARISTOTELES 7. probl. sect. ultima. — VIDAL l. c. p. 169.

*) GOURLAY l. c.

100) *Medical advise to the inhabitants of warm climates.* p. 119.

1) Op. c. p. 71.

2) LINNAEUS de lepra in amoenitat. academ. — MURRAY Diss. de vermibus in lepra obviis. Goett. 1779.

3) *Nouveaux mémoires de Berlin.* 1. Vol. p. 68.

4) JÖRDENS op. c. p. 3.

5) Sic suspicatur vir ingenio praeclarus MALFATTI.

6) *Les Choéphores tragédie d'Eschyle.* Act. 2. Sc. 2.

7) CONSTANTINUS AFRICANUS de morborum cognitione et curatione. Lib. 7. — GORDONIUS l. c. p. 196.

8) GALENUS. EBN SINA. v. HENSLER in excerptis. p. 5. 6. 7.

ignorantiam plane fatemur, causam proximam leprae in ignotam corporis et praecipue systematis lymphatici conditionem, quam *diathesin leprosam* vocamus, rejiciendo.

§. CXXXV.

D i a g n o s i s.

Signa gentilitia.

1. Ex descriptione variarum specierum leprae apparet, symptomata maxime constantia et gentilitia hujus morbi esse: pulsum interdum febrilem, sed constanter debilem saepeque lentum, — urinam jumentosam, turbidam, sedimento instructam, aliquando limpidam, alvum ab initio morbi tardam, — flatus ructusque copiosos, transpirationem foetore peculiari quasi hircino stipatam; — vocem raucam nasalem, halitumque olentem, — morositatem, lasciviam, anaesthesiam, formationis sensum, — varices, potissime haemorrhoides, tumores glandularum lymphaticarum, — vitia pilorum et unguium, — impetiginem maculosam, pustulosam, squamosam, nodosam, ulcerosam, — tabem inprimis musculorum praecipue pollicis, — nec non cariem.

Species variae.

2. Varias expositas leprae formas, re ipsa unum eundemque morbum constituere, tum ex similitudine symptomatum gentilitiorum, tum ex identitate causarum apparet. Nec aliter sentit ALIBERT *). Miramur hinc WILLANUM, lepram squa-

*) Op. c. *Septième livraison.*

scamosam, ac si ea morbum a lepra nodosa plane distinctum constitueret, describere ⁹⁾, cui opinioni et ALARD accedit ^{*}). Diversitas enim, quae inter has leprae species intercedit, formae magis, quam intimae naturae morbi inniti videtur, quae ultima potissimum in classificatione morborum pro norma haberi debet. Varias autem leprae formae cum variis vitiis superficiei corporis confundi possent.

3. Sic *lepra alba* ab universali candore cutis *L. alba albinorum* ¹⁰⁾, quorum plurima vidimus exempla, distinguatur oportet. Albi enim praeter lucis intolerantiam, nil morbosum exhibent, ac peculiarem generis humani constituunt varietatem ¹¹⁾. Idem de *aethiopibus*, quorum color albus nonnullis a leproso vitio derivatus est ¹²⁾, dici debet.

L. alba
cum albinis.

4. *Le.*

9) L. c. p. 91.

^{*}) Op. c.

10) Leuco-Aethiopes. GERM. *Weisse Mohren, Kakerlaken, Dundos*. GALL. *Albinos, nègres blancs, blafards*.

11) BLUMENBACH de generis humani varietate nativa. Goett. 1795. — HALLER element. physiol. T. V. p. 24. — BUZZI *dissertazione storico anatomica sopra una varietà particolare d'uomini eliofobi*. Milano 1784.

12) SMITHS *essay upon the variety of colour and figure in the humane species*. — B. RUSH in *American philosoph. transactions*. Vol. 4.

L. squa-
mos. ab
ichthyosi,
hystri-
cias
etc. distin-
guitur.

4. *Lepra squamosa* ab *ichthyosi* et *hystri-
cias* utpote a vitiis conformationis, illaesa caeterum sa-
nitate perstantibus, distinguenda est. *Porrig-*
quidem interdum ex diathesi leprosa originem tra-
hit, at in genere facile a lepra squamosa, ob de-
fectum signorum gentilitiorum leprae, distingui-
tur. Idem de herpete dicendum est. *Tinea capi-*
tis in parte capillata cranii incipit, quae in lepra
plerumque versus finem solummodo afficitur ¹³⁾.

L. ele-
phant. a sy-
philide.

5. *Lepra elephantiasis* cum *impetiginibus sy-*
philiticis, praecipue sub forma tuborum obvenien-
tibus, ab iis, qui signa horum morborum probe
haud noscunt, facile confunditur; alias enim con-
fusioni hujusmodi vix locus est.

Extensio
leprae.

6. Praeter allatas species leprae. aliae adhuc
aegritudines preesto sunt, quae ex eadem ac lepra
diathesi pullulare videntur. De *pellagra*, de *pli-*
ca, aliisque malis infra describendis ¹⁴⁾, loquimur.
Immo lepram affinitatem cum *diathesi carcinoma-*
tica habere, cum ALARDO ¹⁵⁾ et SAVARESY ¹⁶⁾ exi-
stimamus, quam opinionem, ab ipso nomine *can-*
cri universalis, leprae impertito, confirmatam de-
bito loco ¹⁷⁾ dilucidabimus.

§. CXXXVI.

¹³⁾ WILLAN l. c. p. 87.

¹⁴⁾ Cap. XXXVII.

¹⁵⁾ L. c.

¹⁶⁾ *Sur la fièvre jaune* p. 95.

¹⁷⁾ P. III. Vol. II. Cap. de carcinomate.

§. CXXXVI.

P r o g n o s i s .

1. 1. Lepra squamosa aliquando sanatur, nun-^{An sanabi-}
 quam autem L. elephantiasis. Sed et primo in ca-^{lis?}
 u, quo antiquior morbus, quo annosior aeger, eo
 difficilior evadit cura. Nec quae partialis est le-
 pra, facilius quam universalis debellatur, immo
 atente FALCONER difficultas sanationis major sub
 minori cutis affectione, quam sub late expansa
 lepra, observari solet ¹⁸⁾. Haud pauci, qui sana-
 ti videntur, tardius iterum in eundem morbum in-
 cidunt ¹⁹⁾.

2. Lepra partialis sive squamosa, sive ele-^{Mutatio}
 phantia, interdum in malum universale transit, ^{unius spe-}
 nullum autem habetur certum testimonium, le- ^{ciei in al-}
 pram squamosam in lepram elephantiasin trans- ^{teram.}
 visse.

3. Maculae leprosaе nonnunquam in infantia ^{Longitudo}
 am comparent, quin morbus unquam invale- ^{morbi.}
 scat ²⁰⁾. Quo primum vero macula leprosa alicubi
 rescere incipit, malum et in aliis partibus in con-
 spectum venit ²¹⁾. Impetigo haud raro malorum
 internorum sistit veluti crisin, saltem pro tem-
 pore. Hoc vel de partiali malo valet. In genere,
 miser-

¹⁸⁾ L. c. p. 374.

¹⁹⁾ HILLARY l. c. p. 325.

²⁰⁾ VIDAL l. c. p. 163.

²¹⁾ SCHILLING l. c. §. 12.

miserrima mors ex tabe, ex hydrope, ex ossium carniisque corruptela inevitabilis est. Terribilem aegri desperati morbo conclamato laboranti imaginem, sacrae paginae exhibent ²²).

§. CXXXVIII.

C u r a.

Generatim. 1. Methodus medendi a nobis exponenda praecipue leprae squamosae accommodata fuit. Componitur ea ex remediis internis et externis, variis morbi stadiis adaptandis.

R. interna. 2. Medici Graeciae curam leprae, praeter venae sectionem, a *drasticis* incipiebant. Inter haec praecipue *radix hellebori nigri* adhibebatur ²³). Nostris verò temporibus nemo amplius hoc remedium ad purgandum subministrat, cum certiora extent. At, aliorum *narcoticorum* instar id contra lepram sub forma extracti adhiberi meretur ²⁴). Evoluta morbo, nunc laudem, nunc vituperium promeruerunt: *antimonium, sulphur, petroleum* ²⁵),

mer-

22) LIB. HIOB c. VII. v. 5. 13. 14. 15. — C. IX. v. 22. 30. 31. — Cap. X. v. 15. — Cap. XIII. v. 27. 28. — Cap. XVI. v. 16. — Cap. XVII. v. 7. — Cap. XIX. v. 17. 19. 20. 26. — Cap. XXX. v. 17. 19. 26. 28. 30.

23) ORIBASIIUS medicin. collectan. Lib. 7. et Lib. 8. cap. 3. 6. — Dosis pulveris a granis decem ad grana quindecim.

24) Diss. de lepra in HALLERI Collect. disp. pract. T. 6. p. 83. — Dos. a granis quinque ad viginti.

25) PIERRE in *New medical Journal*. Vol. I. Part. 2. —

mercurius ²⁶⁾, *arsenicum* ²⁷⁾, *acidum nitricum* ²⁸⁾,
conium maculatum ²⁹⁾, *letum palustre* ³⁰⁾, *solanum*
dulcamara ³¹⁾, *quajacum officinale* ³²⁾, *cortex ulmi* ³³⁾,
 plan-

MAZZINI opp. p. 336. Exhibebat interne quotidie a
 duobus cochleariis ad sex.

26) Praecipue solatio mercurii sublimati corrosivi laudatur
 a FALCONER (l. c. p. 375), a PEARSON (London medical re-
 view and magazin. Vol 6. p. 64). At illi non favet
 HILLARY (l. c. p. 329) ac pessime egit in aegro nostro
 elephantiasi affecto. Econtra profuit calomel Dr.
 GOURLAY l. c.

27) USTERI Repertorium der medicin. Litteratur. 1791.
 p. 149. — MATIUS de elephantiasi arsenico curata.
 Regiom. 1803. Et apud Indos medici sacerdotes ar-
 senicum, sex partibus piperis remistum, exhibent.
 (FRANK Epit. l. c. p. 237).

28) SCOTT in BEDDOES communications. — CHISHOLM
 in DUNCANS Annals of medicine for the year 1800.
 Vol. V. Sect. 2. — In lepra squamosa partiali et ego
 cum fructu acidum nitricum adhibui.

29) QUARIN tentamen de cicuta. Cap. 9. 10.

30) ODEHLIUS in Actis Suecicis. T. 34. 39. — Neue
 Abhandlungen der Schwedischen Academie. 4. B. — LIN-
 NAEUS Diss. de ledo palustri. Upsal. 1775. — Amoen.
 Academ. Vol. 8. p. 285.

31) CRICHTON apud WILLAN l. c. p. 110.

32) SENNERT Lib. V. P. I. p. 28.

33) LETTSOM Lond. Dispens. p. 137. — LYSONS in me-
 dical transactions. Vol. II. No. 13.

Frank Prax. I. 2.

plantago latifolia ³⁴⁾, *cinchona officinalis* ³⁵⁾, *cochlearia officinalis* ³⁶⁾, *cucumis sativus* ³⁷⁾, *potassa pura* ³⁸⁾, *meloës cantharides* ³⁹⁾, *caro viperina* vel *viperarum pulvis* ⁴⁰⁾, *lacerta agilis* ^{*}, *saurum lactis* ⁴¹⁾ etc. In genere remedia amara, antiscorbuticis nupta, ac pro re nata narcotica et diuretica, commendari queunt.

A. externa. 3. Sanguinis evacuatio, imprimis per *hirudines* ano admotas, in recenti malo ac urgentibus haemorrhoidibus, levamen affert. Nec *cucurbitulas cruentas* incipienti morbo opponere nocet. Im-

mo

34) CELSUS Lib. III. cap. 26.

35) HILLARY l. c. (In elephantia pedum).

36) MARCELLUS de medicamentis. cap. 19. — WILLAN l. c. p. 109.

37) HEURNIUS Comment. in Hippoc. Aphor. 20. Lib. 3. — WILLIS l. c. Sect. 3. cap. 7. — WILLAN l. c. p. 108. (Adhibetur sive succus fructuum, sive fructus in aceto macerati, sive in aqua cum foliis decocti).

38) WILLAN l. c. p. 107.

39) FALCONER nullum effectum ab hoc remedio a MEAD commutato obtinuit (l. c. p. 377).

40) GALEN Lib. XI. de simpl. med. facult. — ORIBASIIUS de virtute simplicium. Lib. 2. — FERNELIUS (method. med. general.) et PALMARIUS (de morbis contagiosis. Lib. de elephantias. cap. 9.) viperarum virtutem negant.

*) GOURLAY l. c. Sudorem et urinam promovet, et aliquando diarrhoeam et vertiginem excitat.

41) RHazes l. c.

mo, veteres varices incidebant, extrahebant, eradica-
bant. Ad reliqua remedia externa quod spe-
ctat, commendata fuere: *sulphas aluminis et po-
tassae, helleborus albus* ⁴²), *calx viva, mercu-
rius* etc., potissime autem *balnea sulphurea* alia-
que *calida* ⁴³), sive *simplicia*, sive cum *herbis* ⁴⁴),
ita *balnea marina* ⁴⁵). Praeterea ALIBERT et HAL-
LE *unguentum oxygenatum* squamis illinitum lau-
dant ⁴⁶). Aliud a SCULTETO suadetur unguen-
tum ⁴⁷), aliudque a WILLAN ⁴⁸).

4. *Regiminis diaeteticì* in lepra curanda ne-
cessitas ex ipsis sacris paginis elucet. Victus fa-
cilis digestionis ac antiscorbuticus imprimis com-
menda-

Regimen
diaeteti-
cum.

l i 2

menda-

42) REEGE *medical and surgical pharmacop.* — R.
Radiceis hellebori albi contusae uncias duas. Coque c.
aquae libris tribus; ad remanentiam librarum dua-
rum, cui adde salis ammoniaci drachmas duas. D. Sr.
pro lavatione.

43) FALCONER l. c. — WILLAN l. c. p. 104.

44) SCULTETUS *balnea* cum *fumaria, malva, veronica,*
enula paravit.

45) RUSSEL de aquae marinae usu. p. 37.

46) *Rapport général de la société philomatique de Paris*
Vol. 2. p. 83.

47) R. Unguenti pomatini uncias duas. Balsami peru-
viani drachmas duas. Florum sulphuris uncias duas
et semis. Olei tartari uncias duas. M. f. unguentum.

48) L. c. p. 105. (Unguentum picis).

mendari meretur. ARETAEUS virtutem radicis
dauci carotae extollit ⁴⁹⁾).

CAP. XXXV.

De Pellagra.

§. CXXXVIII.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. *Pellagra* ⁵⁰⁾ morbum sistit inter rusticos Insu-
 briae endemicum, periodice omni vere recrudes-
 centem, erythemate et porrigine ad dorsum ma-
 nuum insignitum, ac curriculo nonnullorum an-
 norum, supervenientibus imbecillitate, melancho-
 lia, marasmo et diarrhoea colliquativa, lethalem.

Historia. 2. Pellagra jam medio seculo decimo sexto
 in Insubria extitisse videtur ⁵¹⁾. Certa autem il-
 lius historia solummodo initium seculi octavi at-
 tingit.

49) Curat. diurnum. cap. 2.

50) Pelagra. An a Πέλας, ut erysipelas? — An a cu-
 tis desquamatione, italice *spellarsi*? Scorbutus al-
 pinus.

51) Invenitur ordinatio Capituli nosocomii majoris me-
 diolanensis a. 1578. die 6 Martii edita, quae sic sta-
 tuit: „*Quinto; quelli che saranno infermi di pella-*
rella,

tingit ⁵²). Praeclari de hoc morbo, millesies et ultra nobis viso, auctores sunt: ODÓARDI ⁵³), FRAPOLLI ⁵⁴), ZANETTI ⁵⁵), ALBERA ⁵⁶), STRAMBIO ⁵⁷), JANSEN ⁵⁸), FANZAGO ⁵⁹), WIDEMAR ⁶⁰), GHERAR-

rella, croste o piaghe, siano accettati, avendo però il mandato sottoscritto ut supra.“

52) Medicus, praxin in Sesto calende exercens, ANTONIUS TERZAGHI, J. P. FRANKIO die 10 Novembris a. 1794. scripserat: „Sino dall' anno 1750, in cui cominciò mio padre ad esercitare la medicina in Sesto calende di lui patria, osservò dei pellagrosi. Il di lui padre, che era egualmente medico, ne aveva veduti molto prima.“

53) D'una specie particolare di scorbuto. Venezia 1776.

54) Animadversiones in morbum vulgo pelagram. Mediol. 1777.

55) Acta physico-medica. a. 1778.

56) Trattato delle malattie dell' insolato di prima vera, detta pellagra. Varese 1784.

57) De Pellagra observationes. Mediol. 1785.

58) De Pellagra, morbo in mediolanensi ducatu endemico. Lug. Bat. 1788.

59) Memoria sopra la Pellagra del territorio Padovano. Pad. 1789. — Paralleli fra la pellagra ed alcune malattie che le somigliano. 1792.

60) De quadam impetiginis specie, morbo apud nos in rusticis nunc frequentiori, vulgo pellagra nuncupatur. Mediol. 1790.

GHERARDINI ⁶¹⁾, DELLABONA ⁶²⁾, SOLER ⁶³⁾, TRITIUS ⁶⁴⁾, ALLIONI ⁶⁵⁾, CERRI alique ⁶⁶⁾.

§. CXXXIX.

Symptomata. Autopsia cadaverum.

Symptoma.

1. Pellagra versus aequinoctium vernale cum taedio, tristitia, gravitate capitis, susurru aurium, vertigine, dolore dorsi, crurum imbecillitate et urina turbida, ingruit. Apud feminas menstruatio difficilis pauca evadit vel supprimitur, subsequente saepissime fluore albo copioso. In genere, pulsus debilis, parvus et apyrecticus est. Mense aprilis praeviis tensione, pruritu et ardore plantarum pedum, cutis ad dorsum manuum, pedumque prius rubet ac splendet, dein vero colore sublivescente obducitur. Sunt qui similem cutis conditionem ad dorsum ⁶⁷⁾, quin immo, ut vidimus, ad faciem,

61) *Della pellagra. Milano.*

62) *Discorso comparativo sopra la pellagra, l'elefantiasi de' Greci o lepra degl' arabi e lo scorbuto. Venezia 1791.*

63) *Osservazioni medico pratiche che formano la storia esatta della pellagra. Ven. 1791.*

64) *Pellagrae morbi inter Insubriae austriacae agricolae grassantis pathologia. Lips. 1792.*

65) *Raggionamento sopra la pellagra. Torino 1795.*

66) *Briefe einiger Aerzte in Italien über das Pellagra. A d. Ital. übers. von SCHLEGEL. - Jena 1807.*

67) Sic contingere solet apud rusticos, qui indusium ad dorsum apertum habent.

faciem, praesertim ad genas, exhibeant. Versus finem maii vel initium junii, epidermis corrugatur, separaturque sub forma squamarum minutarum. Cutis sic denudata, donec nova brevi post cooperiatur epidermide, attactui levigata, splendens et mollis est. Redit simul prospera valetudo, ad proximum usque ver duratura. Hoc autem ineunte eadem scena renovatur, atque ita periodice usque ad tertium sive quartum annum, aucta sub quovis insultu morbi vi, praesertim accedentibus borborygmis, flatuum eructatione, alvo obstructa. Tunc crura jam vacillant, nebulae ante oculos versantur, visus obfuscatur ac objecta sive duplicia, sive dimidiata cernuntur. Interdum tumor gingivarum, raro sanguinem fundentium, aphthae, in foeda ulcera desinentes, ptyalismus, et lingua fissa in conspectum veniunt. Multorum sudor foetidissimus, ei ex pane mucore correpto similis, observatur ⁶⁸). En delirium melancholicum, furiosum, cum peculiari sese vel in aquam coniiciendi, vel alio pacto sibi injuriam inferendi ⁶⁹) cupiditate. Gravissimis convulsionibus, praesertim brachiorum, nonnullos correptos observavimus. Singuli somnum interruptum, turbidum, non reficientem experiuntur. Ciborum desiderium nunc perstat, nunc evanescit. Interea cutis indicatis

68) JANSSEN l. c. p. 12.

69) Pellagrosus mense Augusti 1792 vidi, qui sibi cultro pudenda abscidit.

indicatis in locis magis magisque laeditur ac dura, sicca, pergamena, aspera, sulcosa, parumque insensilis fit et squamas quidem crassas, nunquam autem crustas exhibet. Saepe ungues deformantur ac crines, quos pluries instar setarum porci rigere conspeximus, decidunt, nunquam vero intricantur. Vulva hinc inde excoriationes, sive exulcerationes refert. Jam morbus vix remittit, ita ut aeger reliqua aestate et sequenti autumno hyemeque laboribus perficiendis impar reddatur. Quarto, quinto, sexto, interdum septimo vere ingruente, auctis singulis symptomatibus, diarrhoea colliquativa, meteorismo stipata, quid virium adhuc supererat, prosternit, donec miser in verum marasimum conjectus, nunc convulsus, nunc symptomatibus febris typhodis prehensus, extremum subeat fatum.

Autopsia
cadaverum.

2. *Cadaverum autopsia* lucem nullam hucusque super pellagrae naturam sparsit. Saepius intestina inflammationem ac maculas gangraenosas exhibent. Specus vertebralis, quod sciamus, adaperitus hucusque non fuit.

§. CXL.

Causae.

C. praedis-
ponentes.

1. Pellagra mares aequae ac feminas, rarissime infantes infra sextum annum et exclusive rusticos afficit. Duo enim solum nobis nota sunt pellagrae in incolis urbium exempla, unum scilicet

cet in hospite, alterum in bajulo. Morbus in regionibus clivosis ac siccis, nonnullis annis plus, aliis minus grassatur. Homines e stirpe pellagrosa orti, si mature solum natale derelinquant ac regionem huic aegritudini haud faventem adeant, immunes vivunt; alias prae ceteris ab eadem corripuntur. Extranei diuturna mora inter pellagrosos infici queunt.

2. Quamvis pellagra nequaquam psorae vel C. excitantes. luis venereae instar contagiosa sit, attamen illius progressus quotidiani ac introductio in pagos, ubi primum incognita erat, advenientibus novis incolis iisque infectis, magnam de contagio quodam lento nobis movet suspicionem. Vita egena, quam rustici Insubriae ducunt ⁷⁰⁾, nec non graves, quibus incumbunt, labores ad evolutionem pellagrae evidenter conferunt; at sub simili rerum positione rustici aliarum regionum ab hoc morbo tamen immunes vivunt! Neque ab aestu radiorum solarium pellagra repeti potest, cum ea tempore vernali in conspectum veniat et vigente adhuc aetate evanescat. Interea, homines solis actioni minime expositos a pellagra haud affici, fateri oportet.

3. *Causa proxima* pellagrae tum in scorbuto ^{C. proxima.} ⁷¹⁾, tum in peculiari systematis nervosi affectione

70) Jos. FRANK ratio institut, clinici Ticinensis. Vindob. 1797. in Praefat.

71) ODOARDI l. c.

ne hypochondriasi affini ⁷²⁾, quaesita est. Verum excepta virium prostratione fauciumque affectione, ne constanti quidem, nullum hic scorbuti indicium invenimus. Minor adhuc affinitas cum hypochondriasi (forte major cum *raphania*) occurrit. Ex sequentibus vero observationibus pellagram ex *diathesi leprosa* pullulare, elucebit.

§. CXLI.

D i a g n o s i s.

Est species leprae.

1. Pulsus debilis et parvus, urina turbida, alvus obstructa, flatus, transpiratio foetens, morositas, melancholia, imminuta cutis sensibilitas, vitia unguum et pilorum, impetigo squamosa et tabes, quae singula curriculum pellagrae comitantur, abunde illius *indolem leprosam* confirmant ⁷³⁾. Adde, lepram olim communissimam inter Longobardos fuisse ⁷⁴⁾.

Uni insubriae propria.

2. Fertur quidem pellagram hinc inde in aliis regionibus inveniri, e. c. ad Wolgam ⁷⁵⁾, Vienna

⁷²⁾ WIDEMAR l. c.

⁷³⁾ Cap. XXXIV. §. CXXXV. 1.

⁷⁴⁾ Longobardi jam seculo octavo pro populo adeo leproso agnoscebantur, ut summus Pontifex SYLVESTER Regi Galliae consilium dederit, ne filiam Regis Longobardi in uxorem duceret, ob dispositionem leprosam (HENSLEY l. c. p. 210).

⁷⁵⁾ GMELIN *Reise durch Russland* 1. Th. p. 156. (morbum inter infantes epidemicum, ulceribus foedis stipatum,

nae ⁷⁶⁾, in Westphalia ⁷⁷⁾, in Saxonia ⁷⁸⁾ etc., at, quamvis id haud impossibile existimemus, tamen nullibi, nisi in Insubria, hujus morbi vestigia detegere potuimus. Ipsam *Rosam Asturicam* a pellagra differre, infra demonstrabimus.

3. Pellagra facile societatem cum hydrop^e, ^{Complicationes.} asthmate, ophthalmia, ictero, obstructionibus viscerum et febribus intermittentibus inire solet.

§. CXLII.

Prognosis. Cura.

1. Pellagra plurima hominum millia singulis ^{Prognosis.} annis e medio tollit. Mutato quidem vitae regime haud arduum evadit morbi curriculum, primis saltem annis, interrumpere, — at, quot non difficultates huic obstant mutationi! Desperandum est, si diarrhoea profusa vires multopere deficiat, si nervorum systema praeter modum afficiatur, si oris cavum multum patiatur, sique cutis non

tum, curriculo nonnullorum annorum sanabilem, describit).

76) CARENO tentamen de morbo pellagrae observatae Viennae. 1794. (Per octo annos in magno nosocomio Vindobonensi praxin inter millenos aegros exercens, neq. umbram pellagrae detegere potui).

77) BRANDIS *Erfahrung über die Wirkung der Eisenmittel.* p. 254.

78) STARK *Handbuch zur Kenntniss und Heilung innerer Krankheiten.* p. 617.

non omnino desquametur. Quamvis enim desquamationem neque pro signo pathognomonico pellagrae, neque pro absoluta crisi habere possimus, attamen eo majus levamen esse, quo major epidermidis secessus, constanter observatur. Ne vero quis se pellagram sanasse credat, priusquam convalescens domum redux, nonnullos annos exploratorios sustinuerit.

Cura.

2. Non aliter pellagrae occurrere possibile erit, nisi in melius mutata rusticorum conditione, non neglecta separatione aegrorum a sanis. Ad curam morbi quod spectat, *balnea tepida* (sub quorum usu cavendum est, ne aegri in aquis pereant), primum constituunt auxilium. Accedit *diaeta nutriens*, ex jusculis carneis, gelatinis, ovis, lacte et vino. Nec spernenda est, primis saltem annis, virtus *seri lactis* cum *herbis antiscorbuticis*, praecipue cum *portulaca oleracea*. Ultimis vitae temporibus *radix valerianae officinalis*, *aether sulphuricus*, *succinas ammoniacae liquidus*, *cortex cinchonae*, vires quodammodo sustinent ac nervosis obstant symptomatibus. Praeterea transpirationis ratio habenda est. Diarrhoeam *radix quassiae simarubae*, *columbo*, et pulvis *caephelidis ipecacuanhae cum opio*, pro tempore compescere solent. Cuti affectae lac cum herbis emollientibus cum fructu imponitur. Neque frictiones cum *alcohol*, vel cum *succo recentem expresso sempervivi tectorum* nocent. Singula adhuc in pellagra tentanda forent.

forent pharmaca, quae in lepra aliisque morbis leprosis quandam praeuenerunt laudem.

CAP. XXXVI.

De Plica.

§. CXLIII.

Definitio. Historia.

1. *Plica* 79) morbum constituit in Polonia, Tartaria, aliisque finitimis regionibus endemium, praeuiis plerumque diuturnis ac universalibus incommodis nervoso-arthriticis, ad partes pilosas, potissimum capitis, erumpentem, crinesque conglutinantem ac inextricabiliter implicantem.

2. Plicam per tertiam Tartarorum incursionem, Historia ex oriente ad Poloniam, sub regno LESKI *Nigri* advectam fuisse, ibique a. 1285 inter incolas innotuisse,

79) *Synonyma.* Trichoma, capillitium intricatum, tricae incaleorum, morbus cirrhorum, helotides, lues Pokutiensis. GERM. *Der Weichselzopf, der Judenzopf.* POLON. *Gózdziec, Gwózdziec, Koltun, Wieszczyca gospłota.* (Teste LINDE; *Gózdziec* morbum totius systematis et *Koltun* effectum illius, vitium scilicet capillorum, significat). Ross. Колтунъ.

tuisse, historia testatur ⁸⁰⁾. Fertur porro idem morbus seculo decimo sexto, quo tempore impetrantibus JAGELLONE et CASIMIRO IV. Polonia magnum cum Germania alebat commercium, ad Austriam et Bohemiam pervenisse ⁸¹⁾. Sunt contra, qui plicam, antequam ad Poloniam venerat, jam in Alsatia, Friburgi in Brisgovia et in Helvetia variis sub nominibus ⁸²⁾ notam fuisse, contendunt. Interea certa de plica in Germania obveniente notitia ante annum 1564 non habetur ⁸³⁾. Immo in ipsa Polonia primum certum, amplum, ac scientificum plicae documentum annum tantummodo 1599 attingit, quo scilicet tempore LAURENTIUS STARINGIELIUS, Rector Academiae Zamosciensis, consilium facultatis medicae Patavinae ⁸⁴⁾, utpote pro morbo novo ⁸⁵⁾, expetierat. Scriptum hujusmodi HERCULI SAXONIAE ⁸⁶⁾
et

80) DUGLOSSI *Histor. Polon.* Lips. 1711. T. VII. p. 849.

850. — CROMER de origine et rebus gestis Polon. Basil. 1558. p. 263. — SOLIGNAC *Geschichte von Polen*, fortgesetzt von PAULI. Halle 1763. p. 289.

81) SPRENGEL *pragmat. Geschichte.* 2. Th. §. 86. testimonio SOMMERSBERGI innixus. (Scriptor. rer. Silesiacar. Vol. 1. p. 320).

82) *Matenflecht, Marenwirkung, Schrottlinzopf.*

83) STADLER apud H. SAXON. in op. citando.

84) Non *Ticinensis*, uti ALIBERTUS narrat (l. citando).

85) Id est, a 40 ad 50 annos noto.

86) De Plica, quam Poleni *Gedziec*, Roxolani *Koltun* vocant. Patav. 1650.

et THOMAE MINADOO ⁸⁷⁾ de plica disserendi opportunitatem dedit. At, eos nil nisi indigestas GALENI hypotheses in lucem edidisse, dolendum est. Idem de scriptoribus seculi decimi septimi, excepto quodammodo ABR. A GEHEMA ⁸⁸⁾, valet. Ad eos pertinent: LUC. CAEL. FULGINATUS ⁸⁹⁾, ANDREAS A GRAFFENBERG ⁹⁰⁾, RÖDER. A FONSECA ⁹¹⁾, ne de plurimis dissertationum auctoribus loquamur e. c. de ANDR. POSTHUMIO ⁹²⁾, GEHLERO ⁹³⁾, COUSINOTO ⁹⁴⁾, AGRICOLA ⁹⁵⁾, ZEIDLERO ⁹⁶⁾,
BREN-

87) Op. c. cui adjunctus est consultus, Paduae XV. Kal. Jan. 1599 de morbo cirrhorum sive helotide habitus. (HALLER Biblioth. med. pract. Vol. II. p. 255).

88) De morbo vulgo dicto plica polonica. Hamb. 1683. Idem in Act. erudit. Lips. 1683.

89) Consultatio de lue Sarmatica. Ferrar. 1600.

90) Dialog. VII. ad Sarmatas de novae Pokutiensis luis, quam cirrhorum morbum vocant, natura. Vincent. 1600. (HALLER l. c. p. 339. 683).

91) Consultatio de plica Polonica. App. ad Consult. med. Venet. 1613.

92) Diss. in qua novae Pokutiensis luis, quam cirrhorum vocant, natura et essentia examinatur. Vincent. 1600.

93) Diss. de plica. Basil. 1601.

94) Ergo plica epidemica Polonis. Paris. 1606.

95) Diss. de helotide seu plica polonica. Basil. 1615.

96) Diss. de plica polonica seu novorum cirrhorum symptomate. Lips. 1623.

BRENDELIO ⁹⁷⁾, SCHULZIO ⁹⁸⁾, ROLFINKIO ⁹⁹⁾, CRESSIO ¹⁰⁰⁾, WINKLERO ¹⁾, BOESIO ²⁾ etc. — Seculo decimo octavo, scripta de plica jam minus hypothesium et plus observationum exhibent, uti videre est apud BONFIGLIUM ³⁾, MICHALOWSKIUM ^{*)}, ERNDTELIUM ⁴⁾, SCHULZEUM ⁵⁾, VICATUM ⁶⁾, BISIUM ⁷⁾, HOFFMANNUM ⁸⁾, MUSTALLIER ⁹⁾, BRERA ¹⁰⁾, praecipue autem apud GILIBER-

BER-

97) Diss. de plica polonica. Jen. 1630.

98) Diss. de plica polonica. Lugd. Batav. 1648.

99) Diss. de plica polonica. Jen. 1658.

100) Diss. de plica. Heidelb. 1682.

1) Diss. de plica, GERM. *Weichselzopf*. Heidelb. 1682.

2) Diss. de plica polonica. Jen. 1687.

3) Tract. med. phys. de plica polonica. Wratislaw. 1712, Cracov. 1720.

*) *Kalendarz Polsti i Ruski*. Krakow. 1721. p. 30. (Hypothesibus abundat).

4) *Varsawia illustrata*. Dresd. 1730. p. 153.

5) *Krankheiten in Polen und Litthauen*. Dresd. 1754.

6) *Mémoire sur la plique polonoise*. Lausanne 1775.

7) *De melancholiâ, mania et plica polonica*.

8) *Beschreibung des Weichselzopfs nebst einer Anweisung, wie man sich in dieser Krankheit verhalten müsse, um davon zu genesen*. Königsb. 1792.

9) *Praktische Abhandlung über den Weichselzopf*. Wien 1790.

10) *Sylloge opusculorum*. Vol. I. Pav. 1798.

BERTUM ¹¹⁾, et DE LA FONTAINE ¹²⁾. Nec plurimae de eodem argumento dissertationes spernendae sunt, e. c. illae STABELII ¹³⁾, LUDOLFFI ¹⁴⁾, LANGGUTHI ¹⁵⁾, FRANC. A FRANKENAU ¹⁶⁾, JUCHII ¹⁷⁾, KORDALYI ¹⁸⁾, ORLOFFII ¹⁹⁾, GABRIELI ²⁰⁾, SYDOWI ²¹⁾, aliorumque. Seculo currente optime plicae doctrinam dilucidarunt SCHLEGEL ²²⁾,
ALIBERT.

11) Adversar. med. pract. prima. Lyon. 1791.

12) *Chirurg. med. Abhandl. verschiedenen Inhalts, Polen betreffend.* Breslau 1792.

13) Diss. singulares observationes de plica polon. Hal. 1724. in HALLERI collect. diss. pract. I. No. 17.

14) De plica, s. Judenzopf. Erf. 1724.

15) Progr. de plica quatuordecim pedum. Witt. 1776.

16) Diss. de plica polonica, Lithuaniae Koitun, Poloniae Godziak. Hafn. 1723.

17) Diss. de trichomate seu plica polonica, Sarmatiae endemica. Erf. 1734.

18) Diss. de plica polonica. Hal. 1776.

19) Diss. de plica polonica. Regiom. 1766.

20) Diss. de plica polonica. Budae 1780.

21) Diss. de trichomate. Francf. 1798.

22) *Ueber die Ursachen des Weichselzopfs der Menschen und Thiere, die Mittel denselben zu heilen, in kurzem auszurotten und dem dadurch entvölkerten Polen seinen ehemaligen blühenden Wohlstand wieder zu verschaffen.* Jena 1806.

ALIBERT ²³⁾, HECKER ²⁴⁾ et CHROMY ^{*}). Obiter idem argumentum WOLFFRAM ²⁵⁾, CHAMSERU ²⁶⁾, LARREY ²⁷⁾ et BOYER ²⁸⁾ absolverunt, uti alio loco monuimus ²⁹⁾.

§. CXLIV.

Symptomata. Autopsia cadaverum. Analysis chemica.

Generatim 1. Curriculum plicae diversum animadvertitur, prout germen morbi, vel jam diu in corpore delitescit, vel recenter acquisitum est. Primo enim in casu, vitio capillitii symptomata labem universi

23) Op. c.

24) *Gedanken über die Natur und die Ursachen des Weichselzopfes.* Berlin 1810.

*) *Neueste Ansicht des Weichselzopfes in seiner Grundursache.* Freiberg 1813.

25) *Versuch über die höchst wahrscheinliche Ursache und Entstehung des Weichselzopfs, nebst einer sichern Heilung desselben.* Breslau 1804.

26) *Recueil périodique de la société de médecine* 1807. Septbr.

27) *Bulletin des sciences médicales, par la société médicale à Paris.* 1808. Février.

28) *Journal de médecine continué.* Vol. 15. p. 352.

29) *Acta mea clinica.* an. 3. 4. 5. 6. Lips. 1812. p. 39. —

Mémoire sur l'origine et la nature de la plique polonoise. Vilna 1814.

universi corporis indicantia praecedunt, in altero contrarium contingit.

2. *Labes universalis plicosa*, sicuti per centenas observationes edocti sumus, unum alterum-
Labes universalis.

ex sequentibus signis, per menses aut annos plures perseverantibus, exhibet, nempe: cephalalgiam ³⁰⁾, hemicraniam ³¹⁾, dolores decursum nervorum faciei sequentes ³²⁾, vertiginem ³³⁾, sensum vacui cujusdam interni ³⁴⁾, pavores ³⁵⁾, taedium ³⁶⁾, melancholiam, maniam ³⁷⁾, intolerantiam

K k 2

tiam

30) Virginem plicosam, diu noctuque per octo annos intolerabili capitis dolore laborantem, novi.

31) Hemicraniae longe saepius quam cephalalgiae in plica obveniunt, verum non periodice, uti solent, recurrentes, sed continuo saevientes.

32) Dolores hujusmodi magnam interdum cum prosopalgia similitudinem offerunt, quod affinitatem prosopalgiae cum cancro et originem cancro e leprosa diathesi confirmare videtur.

33) Cephalalgias et hemicranias plicosas pluries in vertiginem transivisse aut alternatim cum iis aegros invasisse, observavi. Aliquando vertigo hinc est caduca.

34) Nunc regio cordis, nunc illa lienis aut ventriculi eodem pacto, acsi *vasa* esset, ab aegro indicatur.

35) Praecipue hoc symptoma inter Judaeos plicosos obvenit, ita ut solitudinem aequae ac consortium hominum respuant.

36) De taedio quidem multi plicosi conqueruntur, at nunquam usque ad vitam sibi eripiendam.

37) Tum melancholia, tum mania saepius ex plicosa di-

tiam lucis ³⁸⁾, lacrymationem ³⁹⁾, sensum luci
repentinae ante oculos ⁴⁰⁾, hemeralopiam ⁴¹⁾, di-
plopiam ⁴²⁾, amaurosin ⁴³⁾, cataractam ⁴⁴⁾, gra-
vedinem, stricturam immobilitatemque oculor-
um ⁴⁵⁾, strabismus, ophthalmitidem, psoroph-
thal-

diathesi apud nos oritur, praecipue si aegri potu alco-
hol indulgeant. Plurimi ita hallucinantur, ut liener
aut uterum per abdomen vagantem, latrantem, lo-
quentem accusent.

38) Citra omnia inflammationis indicia ea obvenire
solet.

39) Oculi nonnullorum continuo lacrymis innatant
sunt, qui ob id aegre viam, quam pergunt, observent.

40) Judaeus plicosus, in cubiculo obscuro degens, illu-
minando aliquando inopinate sibi inclarescere retulit. Idem uni-
cus porro est plicosus, qui de *nimia ad venerem pro-*
clivitate mihi querelas faceret.

41) Hemeralopia saepius fortuito plicam comitatur, praeci-
pue in nonnullis provinciis, ubi ea endemice regnat
e. c. in quibusdam Volhyniae et Ucrainiae locis, in-
terdum vero uti proprium plicosum symptoma ob-
venit.

42) Bina exempla diplopie in plicosis conspexi, ac ae-
gri eadem prorsus ratione ac pellagrosi de hoc incom-
modo rationem reddebant.

43) Plurima hujusmodi exempla observavi.

44) Morbi oculorum ex plicosa diathesi optime a LA-
FONTAINE descripti sunt.

45) Tantam interdum hic oculorum immobilitatem ob-
servavi, ut aeger varia eum circumdantia objecta non
aliter, quam totum caput circumvertendo, cernere po-
tuerit.

thalmiam, sociis trichiasi et distichiasi ⁴⁶⁾, hypopyon, aurium continuum susurrum, tinnitum, bombum sensumque sive insecti in aure reptantis ^{*)}, sive venti ex meatu auditorio prodeuntis, auditum duplicem ^{**)}, surditatem, olfactum gustumque deletum, dentes cariosos ⁴⁷⁾, cum gingivis caeterum saepe optime constitutis, halitum foetentem, siccitatem linguae, ac oris cavitatis glandulas sublinguales tumidas, a venis varicosis circumdatas, tumorem glandularum submaxillarium, colli, sensum tensionis ab occipite descendentem collumque complectentem, gravedinem pectoris, catarrhum chronicum, phthisin simulantem ac putis candidis aliquando insignitum ⁴⁸⁾, frequentem cordis palpitationem ⁴⁹⁾, pulsum admodum de-

46) Distichiasis existentiam Cl. SCARPA in Lithuania non negaret.

*) Tali pacto puella in clinico nostro laborabat.

**) Rarissimum hoc symptoma semel tantum mihi obvenit. In utraque aure id locum obtinuit, ac aegra asserbat, se verba ab *uno* prolata, ac si a *duobus* simul proferrentur, percipere.

47) Dentes bene constituti ac formosi in genere raro in Lithuania occurrunt, quod neglectu munditiei vix adscribi potest, cum certe vulgus in Italia, pulcherrimis dentibus instructus, majorem eorum curam non habeat.

48) Acta mea clinica. Vol. III. p. 83. — ALIBERT l. c. §. 35.

49) Cordis palpitatio frequentissime apud feminas plico-

debilem, extremitates subfrigidas, dolores sub lumbis, formicationis sensum inter cutem, ciborum desiderium deletum, picam, insuperabile liquorum fermentatorum desiderium, oppressionem epigastrii ⁵⁰⁾, vomitum ^{*)}, tensionem hypochondriorum ⁵¹⁾, praecipue regionis hepaticae ⁵²⁾, singultum ^{**)}, borborygmos, ructus, sensum globi in abdomine rotantis ⁵³⁾, alvum tardam ⁵⁴⁾, haemorrhoides ⁵⁵⁾, varices extremitatum inferiorum

saepe obvenit, ac interdum vanam morbi cordis, sive viscerum majorum, suspicionem movet.

50) De hoc familiari symptomate aegri plerumque praecipuum conqueri solent.

*) Vomitum rebellem, spatium duorum mensium perdurantem, et solummodo ab eruptione plicae sedatum non perrime vidi.

51) Aegri interdum ob hypochondriorum dolorem corpus flectere nequeunt.

52) Hepatis morbi chronici inter nos communes sunt saepe cum plicosa diathesi cohaerent.

***) Singultum per mensem protractum, et evoluta plica profligatum, observavi.

53) Citra taeniae latae, apud nos familiaris, praesentia sensus globi in abdomine rotantis a plicosis nonnulli percipi solet.

54) Constantissimum symptoma, drasticis et clysteribus vix debellandum, sistit. Vidi alvi obstructionem ultra mensem protractam, et enemata absorpta,

55) Haemorrhoides in regionibus septentrionalibus, etiam si plicae non faventibus, saepe occurrunt et non fallimur.

rum ⁵⁶⁾, fluorem album ⁵⁷⁾, menstrua irregularia, serosa, foetentia, urinam turbidam, sedimento copioso, nunc lateritio, nunc puriformi praeditam, aliquando veluti in diabete copiosam ⁵⁸⁾, alias suppressam ^{*)}, transpirationem specificè olentem ⁵⁹⁾, anaesthesiam tactus ⁶⁰⁾, dolores, stupores artuum, tumorem ultimarum digitorum phalangum, lumbaginem, erysipelas habituale potissimum crurum, spasmos, motus convulsivos et paralyzin variarum partium, ungues deformes, carie sicca laborantes, impetigines varias, praecipue guttam roseam, porriginem, vitiliginem, herpetem rodendum, denique locorum de die in diem frequentiores redduntur, at nullibi evidentiores, et constantiores, quam in plicosis, observari solent. Saepe haemorrhoides hic in juventute jam omnes limites excedunt.

56) Ulcera crurum antiqua ex varicibus et erysipelate communem nostratum constituunt morbum.

57) Et citra plicosam diathesin fluor albus apud nos feminis adeo familiaris est, ut plurimae eum nequidem pro morbo habere soleant. Longe autem gravius plicosas afficit.

58) Non solum diabetem in plicosis observavi (Acta mea clinica. Vol. III. p. 92). Sed saepius non sine stupore enormem copiam urinae ab iis redditae consideravi.

*) Per triduum urinam primam suppressam, ac dein involuntarie fluentem, conspexi.

59) GILIBERT *Sammlung prakt. Beobacht.* Leipz. 1792. p. 313.

60) Acta mea clinica Vol. III. p. 33.

dentem et similia. Stadium, sub quo plura ex hisce symptomatibus animadvertuntur, interdum ad decem, quindecim annos protrahitur, plerumque autem inter primum et tertium annum absolvi solet.

Evolutio
plicae.

3. Plica nunc sensim sensimque, nunc uno oculi ictu, inprimis praevio somno diuturniori *) evolvitur. In genere, evolutionem hujusmodi febris comitatur, instar nunc intermittentis, nunc continuae rheumaticae decurrens ac crudeli cephalalgia cum multis sudoribus *iisque foetidis* stipata. Hinc inde febris, nequaquam ad plicam spectans atque omnino accidentalis, e. c. typhus, evolutioni plicae ansam porrigit, quod et de puerperio ⁶¹⁾, de variolis ⁶²⁾, de scarlatina ⁶³⁾ etc. valet.

Formatio
plicae.

4. Ipsa sequenti modo formari solet plica. Plerumque sudor viscidus e parte capillata capitis manans, capillos ad basin conglutinat ac obducit. Nisus hic capillorum ad conglutinationem tantus est, ut Judaeus nobis obvenerit, cujus mitra ita cum crinibus cohaeserit, ut eam remove amplius haud

*) Per hebdomadem, vix trium [horarum spatio in nychthemero, vigilabat aegra quaedam ante plicae eruptionem.

61) Multa plicae sub puerperio evolutae numero exempla.

62) DE LA FONTAINE l. c.

63) Unicum solummodo casum plicae post scarlatinam evolutae observavi.

haud potuerit. Interdum vero *vel absente sudore* crines ad apicem intrlicantur, ac procul dubio haec *plica sicca* haud raro occurrere solet. Quocunque in casu capilli adeo ad implicationem tendunt, ut, si etiam liceat eos, incipiente morbo, ad vesperam separare, altera mane iterum intricati invēniantur. Plicā autem formatā, crinium implicatio nullo pacto solvi potest. Est vero plicae figura varia: consistit enim nunc in fune solitario ⁶⁴), alterutrum vel alterutrinque capitis latus occupante ⁶⁵), apice vel acuminato ⁶⁶), vel recurvo ⁶⁷), vel crasso ⁶⁸), instructo, nunc in funibus plurimis ⁶⁹) aut laceratis ⁷⁰), aut spiralibus ⁷¹), nuncque placentis, nido avium vel tiorae similibus ⁷²). Funes veluti capilli sani, integumentis cranii adhaerent. Nonnunquam inter eos areae observantur. Plica tiorae formam referens, incipiente morbo fere immobilis capiti affixa est; eo autem senescente, subcrecentibus capillis sanis, magis magisque a capite distare ac mobilis reddi inci-

64) Plica longicauda ALIBERTI. l. c. Tab. IX.

65) P. longicauda lateralis A.

66) P. longicauda fusiformis A.

67) P. longicauda falciformis A.

68) P. longicauda clavaeformis A.

69) P. caput-medusae A. Tab. VI. VII.

70) P. caput-medusae laciniata A.

71) P. caput-medusae cirrhata A.

72) P. cespitosa.

incipit. Pondus illius ab unciiis quatuor ad libras duas, tresve ascendit. Universa superficies cranii in plica recenti a rudiori attactu dolore afficitur, at nunquam crines ipsi sensu instruuntur. Fabula quoque est, crines sanguinem fundere. Bulbi aliquando intumescunt ac inflammationis fere vestigia exhibent, capillorum vero diameter normalis manet. Superficies integumentorum capitis hinc inde achores offert. Pediculi sat raro in plicosis occurrunt. Haud commune est, plicam ad barbam, ad crines subaxillares, vel pubis oriri. Formam autem tunc constanter fonium induit. Plica recens foetorem specificum spirat, antiqua odore destituitur.

Reliquiae. 5. Evoluta plica, symptomata universalia remittere, quin immo evanescere solent. Verum haud raro continuant, aut et majori vi saeviunt. Tale inprimis accidit infortunium, si evolutio imperfecte contigerit, aut quocunque demum modo impedita fuerit. Hoc in casu morbus unguibus longe magis infensus est. In genere, levamen a plica evoluta, pro tempore solum locum habet. Post annum enim unum vel alterum saepe cuncta recrudescunt symptomata, donec secunda sequatur crinium affectio. Sunt qui quatuor, sex, decem, morbi accessus patiantur. Interea corpus magis magisque labefactatur, habitusque aegrorum luridus et fere specificus evadit. Apud multos ulcera foeda, adpectu cancrosa, sed lentius serpentina,

tia, ad extremitates potissimum, in conspectum veniunt. Nec rarum est, genuinum cancrum labia, nasum, frontem, genas, mammas, devastare. Ossa facile cariosa fiunt. Musculorum vis evanescit, ac illi extremitatum marcescunt, rigescent. Tandem sive hydrops, sive scirrhus viscerum, sive phthisis pulmonalis, sive scorbutus, miserrimae vitae finem imponunt.

6. Plica recenter acquisita, cujus nullum in propria praxi numeramus exemplum, cum symptomatibus evolutionis trichomatis incipit, ac deinsensim sensimque universum corpus aggreditur, quo facto morbus, veluti plica jam diu in corpore delitescens, decurrit.

P. recenter
acquisita.

7. Plurima cadavera hominum cum plica demortuorum, nullum vero ex plica secuimus. In illis fere semper hepar morbosum quid offerebat, nunc enim volumine auctum, nunc scirrhosum, nunc friabile et acinosum, conspiciebatur.

Autopsia
cadaverum

8. Non laudandum, sed nostrae non adscribendum culpa, quod in Lithuania degentes analysis crinium plicosorum ex Gallia usque depromere coacti sumus. Enim vero praeter analysis a Cl. ALIBERT publici juris redditam ⁷³⁾, secunda adhuc desideratur. Docet autem illa, crines plicosos eadem ac sanos circiter exhibere principia, sed minori quantitate, praecipue minus sulphuris, minus

Analysis
chemica.

73) L. c. §. 143.

nus phosphatis et carbonatis calcis, minus ferri, et nullum sulphatem calcis, nullumque oleum. Praeterea longe facilius in aqua solvitur substantia crinium plicosorum, quam sanorum. Optandum foret, ut chemia non solum crines, sed et alios humores, praecipue urinam plicosorum examini subjiceret, et quidem non in morbo jam provecto, sed in recenti, tempore evolutionis trichomatis.

§. CXLV.

C a u s s a e.

Praedispo-
nentes.

i. Plica nulli aetati parcat, vidimusque infantes primum necdum annum attingentes et senes decrepitos, hoc morbo detentos. At, haec rara sunt exempla et in genere plica inter pubertatem et senium obvenire solet. Plicae connatae, a LAFONTAINE observatae, nullum propria praxis nobis casum suppeditat. Feminae aequae ac mares a plica afficiuntur. Nulla corporis constitutio ab ea immunis est, vidimusque homines robustos, floridos, obesos, plicam, saltem recentem, summo in gradu exhibentes. Capillorum color nequam in plicam influit. Maxime rustici trichomati subjiciuntur; accedunt mendicantes, sequunturque Judaei, longe minus, saltem in Lithuania, huic morbo obnoxii, quam vulgo creditur. Eum vel in splendidissimis occurrere familiis nemo medicorum in earum mysteriis initiatus ignorat; probrosus enim morbus illis est. Quocunque autem
in

in civium ordine plica appareat, saepissime ea vitium haereditarium, et haud raro ab avis ad nepotes transiliens, sistit. Corrupti autem nonnullorum mores investigationem originis interdum arduam reddunt; immo, hac ipsa ex caussa, plica nonnunquam in alienis regionibus a viatoribus polonis disseminari videtur *).

2. Latens plicae germen, a caussis permultis **Excitantes.** ocyus serius evolvitur, in quibus, si primam huius morbi rationem quaeris, maxime erras. Pertinent huc praecipue frigus, calor, humiditas, victus acris, animi pathemata et neglecta mundities. Quamvis enim SCHLEGELIO caussam plicae in Polonorum caput radendi more quaerenti ⁷⁴⁾ assentiri non possimus, cum trichoma et in partibus tectis et apud Judaeas crines continuo cooperientes obveniat; attamen frigus, inprimis capiti incaute admotum, multum in plicae generationem influere, haud dubitamus. Certe non sine peculiari ratione Poloni utriusque sexus, caput plus, quam reliquae gentes, hyemali tempore velamentis variis

*) Cum exercitus Polonorum a. 1813 et 1814 per Germaniam et Galliam, et antea per Hispaniam, vagatus sit, atque multae feminarum cum militibus omnium ordinum procul dubio commercium habuerint, nisi plicae ipsius, saltem labis plicosae apparitionem in alienis regionibus, praedicimus, ac medicorum ad hoc attentionem mature excitamus.

74) L. c.

varii generis custodire solent. Qui id negligunt extranei, facile habituali cephalaeae obnoxii fiunt. Interea sicuti extrema saepe se tangunt, ita et hic, abusus velamentorum capitis ad plicam excitandam valet. Revera plica frequentius aestivo quam hyemali tempore evolvi observatur. Evolvitur autem praecipue in regionibus humidis et uliginosis, in locis scilicet, in quibus vel Vistula, vel alia flumina ob frequentes inundationes paludes producunt, aut ubi aquae ex nivis liqufactione aut ex pluviis stagnant et a solo non arenaceo aegre absorbentur⁷⁵). Et victum ad generationem plicae apud praedispositos contribuere credimus, inprimis carnem porcinam, quam nostrates omnibus fere in morbis pro suspecta habent⁷⁶), aut halices aliique pisces, quibus potissime Judaei vescuntur. Peculiare vegetabilium acidorum desiderium, quo non solum Poloni, sed et extranei inter eos viventes, incitantur, attentione hic plane dignum est. Nil autem magis ad plicam producendam valet, quam animi pathemata, inprimis terror⁷⁷). Immundities hic non aliter, quam in

reli-

75) In Lithuania plica communissima est in districtibus
LUCK et SINSK.

76) Rarissime vulgus Lithuanorum apud medicum quaestionem, *utrum liceat carnem porcinam comedere?* silentio praetereunt.

77) Vir robustus a cane terrefactus illico in plicam incidit. Plura quoque exempla trichomatum ex terrore ob incendia mortesque parentum vel amicorum numero.

reliquis morbis cutaneis agere videtur. Extra autem dubium est, plicam, saltem recenter evolutam ac humidam, contagiosam habere indolem. Communicatur inprimis per lactationem, per lectos, vestes et mitras. Plicae per coitum acquisitione nullum habemus exemplum. Ab equis contagium plicae in homines transivisse ⁷⁸⁾, haud verisimile videtur, quamvis trichoma tum inter illos, tum inter vaccas, canes, capras, vulpes, lupos observetur.

3. Plicae *causam proximam* quaevis schola Proxima, per proprias hypothese explicare satagit; — at incassum. Immo, singulae hac in re disquisitiones non sine taedio perleguntur ac doctrinae incremento evidenter obstant. Nec ignoratio circa plicae naturam intimam iis mira videri potest, qui causam proximam februm intermittentium, inflammationum aliorumque morborum vulgarium profundius latere, quam quod oculo humano cerni possit, candide fatentur. Merum impuritatis plicam effectum sistere, ex dictis sponte refutatur. Neque de *indole venerea* plicae ⁷⁹⁾ suspicio moveri amplius potest, si consideremus: eam longe ante luem veneream in Europa innotuisse, vix aut ne vix quidem per coitum communicari, lentissime evolvi, ac mercurii virtutem non solum elude-

re,

78) Bibliothèque Britannique. Sciences et arts. Vol. 26. No. 2. a. 12. Juin 1804. p. 197.

79) Hanc opinionem WOLFFRAM et LARREY defendunt.

re, sed ab eo potius exasperari. Caeterum plicam cum lue venerea saepe complicari haud negabimus. Nec *arthritis* utpote in universa Europa plus minus obvia, de morbo, *unius* tantum regionis endemio, rationem reddit. Non ita, uti ex sequentibus apparebit, *diathesis leprosa*.

§. CXLVI.

Diagnosis.

Est species
leprae.

1. Si enim consideremus: in plica pulsum esse constanter debilem, urinam jumentosam, turbidam, sedimento instructam, alvum tardam, cum flatibus et ructibus; transpirationem foetorem peculiarem prae se ferre; morositatem, melancholiam, fornicationis sensum, varices, potissime haemorrhoides, tumores glandularum lymphaticarum obvenire; pilos et ungues praecipue laedi; cutim ulceribus defoedari ac tabem tot malis finem imponere; — quid ad *morbum leprosum* constituendum deficiat, plane non videmus. Adde plicam ex oriente, leprae scilicet patria, originem trahere, eam seculo decimo tertio, tempore igitur, ob lepram per universam Europam vagantem, praecipue infenso, divulgatam fuisse, eamque teste pellagra aliisque morbis infra recensendis, — non unicas leprae in Europa sistere reliquias, regionibus septentrionalibus minime exceptis ⁸⁰). Si

quis

80) „Regio hujus mali (leprae) inductrix est, tum
quae

quis objiciat, intelligi haud posse, cur lepra in Polonia tantum formam plicae induerit; — id libenter concedimus, at nequaquam pro objectione habemus. Quot etenim res non sunt, quae explicari nequeunt?

2. Plica, utpote quae communem cum *pellagra* <sup>Affinitas cum pella-
gra.</sup> habet stirpem, nonnullas etiam hoc cum morbo offert affinitates; sunt enim utrique morbi endemii, lento contagio instructi, haereditarii, rusticis inprimis familiares, symptomatibus nervosis stipati, quae apparente vitio ad superficiem externam corporis sublevantur quidem, ac re ipsa tractu temporis quotidie invalescunt, donec, laesis unguibus, vires frangantur, ac tabes vel hydrops vitam, certe citius in pellagra quam in plica, terminet. Pellagra magis cum lepra squamosa, ac plica magis cum elephantiasi convenire videntur.

3. Plica, *sporadice* et in aliis regionibus, <sup>An plica et
in aliis re-
gionibus
obveniat.</sup> praeter Tartariam et Poloniam visa est, nempe in Silesia ⁸¹), Bohemia ⁸²), Suevia ⁸³), Borussia ⁸⁴), Saxo-

quae valde calida est, tum quae *vehementer frigida* est. "

AETIUS tetrab. IV. serm. I. cap. 120.

81) STACHELBROTH in *Archiv der prakt. Heilkunde für Schlesien*, 2. B. 3s St. No. 4.

82) Judaeam ex urbe *Collin*, prope Pragam, vera plica laborantem, Viennae vidi.

83) GÖCKELIUS, Gallicin. Cent. II. No. 16.

84) HENNING'S *Genius der Zeit* 1799. April.

Frank Prax. I. 2.

L 1

Saxonia ⁸⁵⁾ aliisque Germaniae locis ⁸⁶⁾, ne de insula Ceylon ⁸⁷⁾ sermonem instituamus.

Plica spuria.

4. Interea non omnis capillorum implicatio illico pro *plica genuina* declaranda est. Datur enim trichomatis species, cui neglectus pectinis usus ansam porrigit, quodque ubicunque post diuturnos morbos obvenit. Plica haec *spuria* dicta, inter ipsos Polonos communis observatur, utpote quando morbis obscuris laborant, saepe consulto pectinis usum et capitis munditiem negligunt, spe, non semper inani, freti, depositionem materiae plicosae ad capillitium ita utiliter promoveri posse. Capillorum ista artificialis implicatio, integrum capillitium detinet, figuram irregularem exhibet, capiti minus adhaeret, mobilior est, patientia extricari potest, defluvium crinium socium habet, pediculorum saepe nidum constituit, ac potissime signis universalibus morbi plicosi destituitur.

Recondita plica.

5. Nisi progenies aegrorum aut probabilitas contagii suscepti indicio sint, recondita adhuc plica difficulter cognoscitur. Nec illius evolutio omnino ad diagnosin morbi plicosi requiri videtur. Sicuti enim febris variolosa aut scarlatinosa sine
variolis

85) VOGLER in HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde*. 11. B. p. 40.

86) HOLST *ibid.* 7. B. 4. St.

87) MEZELANE in *Verhandlingen van Haarlem*. T. 24. No. 3.

variolis aut *scarlatina* obvenire potest, ita et morbus plicosus *sine plica*. Interim nisi in crinibus, saltem in unguibus ocyus serius plicae indicia comparere solent. Antequam hoc contingat, de plica potissime inter nostrates suspecti sunt morbi nervosi praecipue affectionem medullae spinalis indicantes *), et morbi arthritici rebelles, praecipue si urinam jumentosam, dolorem epigastrii et affectionem auditus (certissima nempe plicae reconditae symptomata) socia habeant.

6. Plicam, quam *spuriam* vocant, nequaquam Variarum species. genuinae plicae speciem, sed vitium accidentale et locale capillitii sistere, quis non concederet? Sequitur inde, divisionem plicae in *veram* et *spuriam* omni fundamento destitui. Idem de divisionibus plicae ab ALIBERTO excogitatis ⁸⁸⁾ contendimus, cum forma varia plicae causas plane accessorias ac nullo pacto ad variam morbi indolem spectantes agnoscat. Sic, qui capite raso, excepto vertice, incedunt, *plicam* solummodo *solitariam* exhibere queunt; sic feminae, crines circumvolvere solitae, *plicam caput medusae*, viri autem quorum capilli libere pendent, *plicam longicaudam* offerre solent. Summi econtra momenti est plicae divisio in eam, quae ex vitio totius systematis pullulat (*plica secundaria*), ac in eam, quae

*) Multa sane phaenomena ostendunt, quod haec systematis nervosi pars maxime in plica patitur.

88) L. c.

quae recenter acquisita est et solummodo periculum universalis infectionis minatur (*plica primaria*). Praeterea non inanis plicae divisio a *periodis* suis desumitur, quo sub respectu plicam, in *reconditam, recenter evolutam* et *senescentem* dividimus.

Complicationes.

7. Maxime tandem refert *complicationes* plicae cum aliis morbis rite eruere. Nulla inter eas *venerea* frequentius occurrit, imprimis in Lithuania, ubi syphilis inter rusticos non solum per coitum sed et convivendo (*sibbens* et *scherlievi* instar) propagari solet. Affectio faucium characterem venereum exhibens, vel condylomata circa anum et genitalia, utpote symptomata soli syphilidi propria, praecipue complicationem hujusmodi indicant. Postremo et *scorbutica diathesis* haud raro cum plica societatem init, quod ex gingivarum potissime conditione, nec non ex haemorrhagiis, utpote plicae simplici non familiaribus, palam fit.

§. CXLVII.

P r o g n o s i s.

Periculum.

1. Plica morbum rebellem, vix unquam radicitus evellendum sistit. Homines eo detenti, rarissime provectam aetatem attingunt. Evidens hinc in plica defectus incolarum in solo polonico *una* invenitur ratio; reliquas alio loco enumeravimus ⁸⁹).

2. Debita

89) Acta mea clinica. Vol. III. p. 37.

2. Debita evolutio trichomatis, magnum qui-Semiotica. dem levamen reliquorum malorum, vel eorum pro tempore absolutam cessationem sperare, at nunquam promittere sinit. Vidimus enim aliquoties morbum irrita plicae evolutione continuasse, imo hinc inde auctum fuisse. Cum emolumento contingere solent sudores habituales, urina crassa, haemorrhoides modice fluentes et erysipelas periodicum; e contra de gravi morbo testantur sensuum vitia, diuturna cerebri et nervorum mala et inprimis affectiones systematis lymphatici.

§. CXLVIII.

C u r a.

1. Plica publici regiminis attentione quam Prophylactica publica maxime digna est, nec eam *Borussia* sprevit ⁹⁰⁾. Dolemus tantum in regionibus plicosis plurima adhuc rerum adjuncta legum medicinalium executioni obstare. Interea sequentes proponimus: 1. Ineatur, quantum fieri potest, *calculus* incolarum plica laborantium, saltem rusticorum et pauperum, quavis in provincia sive urbe. 2. Constituatur *medicus* unice negotiis de plica, in toto imperio moderantis intentus. 3. Erigatur *nosocomium*, vel dicetur pars nosocomii pro quodam plicoserum numero, ut morbus accuratissime examinari utque nova in eo curando pericula institui possint. 4. Esto ad latus hujus nosocomii *bibliotheca*.

90) FORMEY med. Ephem. t. B. 4. St. p. 71.

theca, libros et dissertationes omnes continens, quae hucusque de plica publici facta fuere juris; item *museum pathologicum*. 5. Stabiliatur ab initio *praemium* medicum et annuum optimis circa plicam observationibus et promittatur elapso decennio *remuneratio* insignis quaedam meliori de hoc morbo operi. 6. Conscribatur *liber popularis*, quo vulgi attentio ad plicam dirigatur, praeconceptae opiniones deleantur et legibus medicinalibus promulgandis via quodammodo paretur. 7. Excitentur, quicumque circa plicae curam sive peculiare auxilium, sive aliquod secretum possident, ad illud aut humanitatis aut remunerationis gratia patefaciendum. 8. Revocetur praecipue attentio parentum, ut in filiis matrimonio jungendis stirpis plicosae rationem habeant. 9. Vetentur rusticis plicosis matrimonia tum inter se, tum cum sanis. 10. Emendetur quousque possibile servorum conditio. 11. Remuneretur herus, qui ex proprio praedio plicam extirpaverit. 12. Subjiciantur se vero examini praedia, ceteris paribus maxime plicae obnoxia. 13. Recludantur mendicantes plicae affecti. 14. Vetetur plicosis introitus ad balnea publica, erigaturque ipsis proprium balneum. 15. Occupent plicosi loca segregata in scholis. 16. Necentur aut separentur ab aliis animalia domestica plica laborantia. 17. Moneantur medici et chirurgi, ne *vaccinam* ab infantibus de plica suspectis desumant, utque in *nutricibus* eligendis semper plicam

plicam coram oculis habeant. 18. Adficiantur gravi poena homines plicam consulto et dolose aliis communicantes ⁹¹⁾. Tandem venditio vestium et pileorum obsoletorum prohibenda, vel saltem severae inspectioni subjicienda.

2. Aeger de recondita plica suspectus, tinea-
C. p. re-
conditae.
 tur se a refrigerio, evitet esum carnis suillae, piscium sale conditorum; abstineat a capillorum et unguium abscissione, immo a pectinis usu nec non ab itineribus in regiones plicae evolutioni non faventes ⁹²⁾. Conducunt balnea, tum vaporis, tum alia tepida, imprimis sulphurea. Item remedia excretionem alvinam sollicitantia et quidem potissime *radix rhei palmati, supertartras potassae, electuarium lenitivum* etc. Aegre prodeuntibus haemorrhoidibus *aloe* succurrit ⁹³⁾. Econtra iis tumidis molestisque, *hirudines* ano applicitae, conspicuum levamen afferunt. Simul, ut urinae secretionis et transpirationis summa ratio habeatur, oportet. Primo scopo *baccae juniperi communis*,
al-

91) Lex Borussica a. 1802.

92) Sunt Poloni, qui per universam fere Europam, ut a celebrioribus medicis adversus rebelles morbos chronicos auxilium quaerent, iter instituerunt, verum continuo in pejus ruebant, donec ad patriam reduce salutarem experirentur plicae evolutionem.

93) Pilulas sequentes saepe utiliter praescripsimus: R. Extracti rhei drachmas duas. Extracti aloes succotrinae aquosi drachmam unam. M. f. pilulae granorum trium. Cap. ad vesperam sex.

alteri *sulphur* optime inserviunt. Jungimus *sulphur extracto* vel *hellebori nigri* ⁹⁴⁾, vel *conii maculati* ⁹⁵⁾, quae remedia reliqua narcotica virtute longe superant. *Opium* vix unquam prodest, *Mercurio* hic locum non esse multiplici experientia edocti sumus, enim vero, excepta complicatione luis venereae, aperte nocet. Evidenter quoque sub illius usu externo ulcera plicosa exacerbantur. *Antimonium* nisi levamen afferat, saltem innocens remedium sistit. Nullum vero ex allatis pharmacis virtutem *herbae vincae pervincae* antecellit ⁹⁶⁾. Vulgus *herbam lycopodii*, non quidem *clavati*, ut fertur, sed *selaginis vincae* aequiparare solet, at remedium hujusmodi facile drastice exerit virtutem ac emesin excitat. Utimur tamen eo in decocto, sed extus ad partem capillatam capitis fovendam ⁹⁷⁾, cui scopo et *vincae pervincae*

94) R. Extracti hellebori nigri drachmam unam. Sulphuris puri drachmas duas. M. f. pilulae granorum trium. Cap. ter de die tres.

95) R. Extracti conii maculati drachmam unam. Sulphuris puri drachmas duas. M. f. pilulae granorum trium. Cap. ter de die quinque.

96) R. Herbae vincae pervincae uncias tres. Aquae fortis fervidae libras tres. Stent in digestionem per noctem. Mane ebulliant per quartam horae partem. Colatura D. S. decoctum nychthemeri spatio hauriendum.

97) R. Herbae lycopodii selaginis uncias duas. Coque
c. s. q.

vincæ et arbuti uvæ ursi *) decocta inserviunt. Res acriores, quas nonnulli ad trichoma eliciendum in usum ducunt, e. c. *decoctum farinæ sinapis nigrae, tinctura meloes cantharidum*, plerumque nocent. In genere, quæ nimium jam humorum affluxum ad caput promovent, evitanda. Extra huiusmodi periculum, *sinapismus* vel *vesicatorium* nuchæ admotum pro tempore symptomata lenit. *Ulcera artificialia*, quamvis multam ac foedam largiri soleant evacuationem, raro conducunt. Multum levaminis *emplastrum* sive *de pice Burgundica*, sive *de galbano crocatum*, sive aliud simile **) secundum longitudinem totius columnæ vertebralis appositum affert.

3. Tempore, quo plica evolvitur, aut quo ea C. p. recen-
 tix evoluta est, pharmaca haud saepe locum inve- ter evol-
 niunt. Optime enim sola natura evolutionis opus- tae.
 absolvit aut firmat. Interim urgente nimio humo-
 rum ad caput affluxu, ac febre vigente, hirudines
 ad tempora, balnea pedum, et lenia alvum pur-
 gantia adhiberi possunt. Econtra, deficientibus
 ad

c. s. q. aquae per dimidiam horam. Colatura librae
 unius d. s. usui externo.

*) R. Herbae uvæ ursi uncias. Coque per dimidiam
 horam c. s. q. aquae. Col. librarum D. Sr. pro usu ex-
 terno.

**) R. Emplastri vesicatorii drachmas sex. E. conii ma-
 culati. E. assae foetid. aa. uncias duas. Malaxetur.

ad plicam perfecte expellendam viribus, *vesicatorium* vel *sinapismus* ad nucham, lotio capitis cum *vino calido* et usus internus remediorum *antimonialium* cum *camphora* aut *möscho* prosunt.

C. P. senescentis.

4. Plane absoluta plicae evolutione, symptomata universalia plus minusve aut evanescent, aut perstant. Hoc in casu methodus adversus plicam reconditam iterum in usum ducitur; alias, ut aeger vel a reliquiis morbi liberetur, quaestio est: *an trichoma abscindere liceat, nec ne?* — Licet abscindere, si plica fuerit omnino evoluta, antiqua, sicca, inodora, a capite distans et si sani capilli succrescant; — alias summo periculo stipatur illius resectio, vidimusque inde strabismus, amaurosin, contractionem musculorum, suppressionem urinae, convulsiones, et maniam. Inter ea haud raro mala, quae abscissioni plicae adscribuntur, morbo plicoso per se adscribenda forent. Sicuti enim plurimae tum febrium intermittentium, tum luis venereae reliquiae, cinchonae et mercurio, etiamsi debito modo administratis, tribuuntur; ita saepe relate ad abscissionem plicae contingit. Caeterum, re dubia, plicam potius relinquimus, quam abscindimus. Indicata rescissio forficum ope absolvitur, prudensque consilium est, non una vice totam plicam, sed repetitis vicibus varias illius partes abscindere, neglecta enim hac cautela, caput facile refrigeratur. Periculum hujus-

hujusmodi optime evitatur, si gossypii quantitas, illi resectorum capillorum pondere aequalis, capiti, donec usque crines sani succrescant, imponatur. Quocunque in casu caput, comâ adscititiâ, qua et latens optime absconditur plica, obtegi debet. Nec ungues, priusquam crescere desinant ac desquamantur, abscindendi sunt. Ulceribus plicosis cum successu sive *emplastrum*, sive *infusum*, sive *unguentum*.⁹⁸⁾ *conii maculati* applicatur. Ad incommoda a plica praepostere resecta fuganda, *insitio plicae* pluries a LAFONTAINE utiliter adhibita est, propria autem hac in re destituimur experientia, Idem de cura plicae primariae fateri adigimur, immo ignoramus, an unquam infectionem universalem impedire licuerit,

98) R. Axungiae porcinae unciam unam. Pulveris herbae conii maculati drachmam unam. Olei hyoscyami drachmas duas. M.

CAP. XXXVII.

De morbo rubro Cayennae, morbo Crimensi, Radesyge Norvegiae, Herpete Aleppi, Rosa Asturica, Yaws et Pian.

§. CXLIX.

Morbus ruber Cayennae.

Definitio. 1. *Morbus ruber Cayennae* ⁹⁹⁾ malum sistit in Cayenna endemium, maculis rubris ac ulceribus, cutem et ossa depascentibus, insignitum.

Scriptores. 2. BAJON ¹⁰⁰⁾, FORSTER ¹⁾ et SPRENGEL ²⁾ optime hunc morbum descripsere.

Symptomata. 3. Malum cum maculis rubris, flavis, diffluentibus, sensuque orbatis, faciem, aures, collum et universum demum corpus defoetantibus, adoritur. Maculae hae cito diffunduntur ac facta epidermidis

⁹⁹⁾ *Mal rouge de Cayenne.*

¹⁰⁰⁾ *Histoire de Cayenne.*

¹⁾ *Observations made during a voyage round the World.*
p. 485.

²⁾ *Handbuch der Pathologie.* 3. Th. p. 520.

dis desquamatione pulvere farinaceo cooperiuntur. Urina est turbida, fere oleosa. Ad faciem cutis crassa fit atque ad anres et labia tubera in conspectum veniunt. Sociae fiunt eruptiones pustulosae, in ulcera sordida, foetida, obscure rubentia, fungosaque transiturae. In summo morbi gradu, caries, citissime serpens, ossa emolliens et in carneam quasi substantiam commutans, superaccendit. Europaei hoc malo lenius, scilicet sine ulceribus et carie, affligi solent.

4. Morbus hic pro specie leprae, scorbutoDiagnosis. punctae, habetur.

§. CL.

Morbus Crimensis.

1. *Morbus Crimensis* 3) malum endemium Definitio. t, in Crimea et Astracania prope flumen JAİK obveniens, facie sublivida, maculis rubris et crustis universum corpus defoedantibus stipatum.

2. De hoc morbo GMELIN 4), PALLAS 5), Scriptores, FALK 6) et RICHTER 7) rationem reddiderunt.

3. In-

3) Крымская болѣзнь. — Incolae morbum vocant: серная Немошь.

4) *Reise durch Russland.* 2. B. p. 169.

5) *Reisen.* 1. B. p. 362.

6) *Beyträge zur topographischen Kenntniss des Russischen Reiches.* St. Petersburg. 1785. 1. Th. S. 176.

7) *Op. c.* p. 248.

Symptomata. 3. Incipit morbus in facie cum maculis subob-

scure rubris, sensu orbatis et crustis prurientibus obductis. Aeger de magna debilitate, gravitate artuum, et frequenti horripilatione conqueritur. Facies tumescit et maculae rubrae super universum sparguntur corpus. Post plurimos sive menses sive annos tubera dura apparent, quibus apertis ulcera rodentia, crustis bruneis oblecta sequuntur. Ulcera haec interdum exsiccantur, at, tractu temporis non sine erosione partium contiguarum, recrudescunt. Immunia manent pars capillata capitis, superficies interna manuum et pedum, fovea subaxillaris, podex, et poples.

Caussae. 4. Caussa potius in principio leproso quam scorbutico, quod GMELIN et PALLAS accusant quaerenda videtur.

Diagnosis. 5. Morbus Crimeae magnam cum eo Cayennae similitudinem habet, praeter quam quod hic plurima loca, ipsaque ossa afficit.

Prognosis. 6. Laesis post nonnullos annos visceribus, aegri tabe pereunt.

Cura. 7. Herba *anabasis aphyllae* pro unico habetur remedio. Sic et *balneum in lacte equino*.

§. CLI.

Radesyge.

Definitio. 1. Morbus endemius Norwegiae, Islandiae, Grönlandiae, Lapponiae, ulceribus faucium, maculis

culis rubris nasi, eruptione universali instar herpetis, stipatur, *Radesyge* vocatur ⁸⁾).

2. De hoc morbo scripsere: BÜCHNER ⁹⁾, Scriptores. HEMPEL ¹⁰⁾, MUNK ¹¹⁾, MOELLER ¹²⁾, CALLIEN ¹³⁾, ARBO ¹⁴⁾, MANGOR ¹⁵⁾, MÜHLERT ¹⁶⁾, PFEFFERKORN ¹⁷⁾, HENSLER ¹⁸⁾ et VOUGT ^{*}).

3. In-

- 8) *Lepra Norwegica*. SWEDIAUER. — NORWEG. *Radesyge*, *Spedalskhed*. ISLAND. *Liktrae*. GERM. *Der nordische Aussatz*.
- 9) *Nachricht von der Spedalskhed in Bergenstift*. Bergen 1786. Vide HENSLER *vom abendkündischen Aussatze*. Excerpt. p. 110.
- 10) *Nachricht von der Spedalskhed in Bergenstifte*. Rendsburg. HENSLER l. c. p. 117.
- 11) *Tode medio. chirurg.* Journal. 5. B. 1. St. p. 62.
- 12) *Ibid.* p. 45. et HENSLER l. c. p. 119.
- 13) *Chirurgie* 1. B. p. 368.
- 14) *Afhandling om Radesygen*. Kopenh. 1792.
- 15) *Undevretning om Radesygens Kiendetege*. Kopenh. 1792.
- 16) *Bidrag til oplysning om Radesygen natur*. Kopenh. 1799.
- 17) *Ueber die Norwegische Radesyge und Spedalskhied*.
- 18) *Vorrede zu ARBOS und MANGORS Abhandl.* Altona 1797.
- *) *Observationes in exanthema arcticum, vulgo Radesyge dictum*. Gryphiae 1811. Et: HECKERS *Annalen der gesammten Medicin*. 3. B. 3. Heft.

Sympto-
mata.

3. Ingruit morbus symptomatibus catarrhalibus. Accedunt gravitas et dolores, veluti rheumatici, articulorum, cum anorexia, debilitate, dolore capitis, coryza, sensu compressionis oculorum, lacrymatione, deglutiendi difficultate, tumoribus tonsillarum, palati orisque cavitatis. Sequuntur rubor violaceus faciei tumidulae et praesertim maculae obscure rubrae ad nasum. Praeviis per menses et annos hisce symptomatibus, tandem impetigines adpectu herpeticae, crustosae, cum desquamatione furfuracea epidermidis in conspectum veniunt. Ad faciem potissime, sed et ad reliquum corpus, maculae griseae, sensu orbatae, in ulcera transiturae, occurrunt. Idem cum tuberibus cupreis, serum cruentum primum fundentibus, variisque in locis, praecipue autem in facie prorumpentibus, contingere solet. Ulcera tum fauces, tum oris cavum, tum nasum occupant ac lente hasce partes destruunt. In genere fundus eorum obscure fuscus, violaceus, impurus, margines veluti erosi, tuberibus duris, squamis venisque varicosis circumdati cernuntur. Nunc dolent, nunc doloris expertia sunt, vixque unquam foetent.

Gaussae.

4. *Radesyge* per immediatum salivae, sudoris, et ichoris ex ulceribus pullulantis contactum communicatur. Morbi germen a nebulis frigidis, a prava vivendi vestiendique ratione evolvi videtur.

5. *Rade-*

5. *Radesyge* pro morbo nunc scorbutico, nunc *Diagnosis.*
venereo habita est, donec HENSLER illius indolem
leprosam demonstraverit ¹⁹⁾.

6. Morbus proventus nullam sanationem ad-*Prognosis.*
mittit.

7. Methodus antiscorbutica levamen afferre *Cura.*
solet.

§. CLII.

Herpes Aleppicus.

1. Vesica rubra, pruriens, in crustam desi-*Definitio.*
nens, relicta foeda cicatrice, deciduam, potissi-
mum in facie obvia, et in urbe Aleppo endemia,
herpes nuncupatur Aleppicus ²⁰⁾.

2. Quicumque urbem *Aleppo* per aliquod tem-*Observa-*
poris spatium inhabitat, neque canibus exceptis ²¹⁾,
huic morbo, ab HASELQUISTIO ²²⁾ et SCHULTZIO *)
optime descripto, obnoxius fit. Causa in aqua-
rum conditionem rejicitur; — jure nec ne? Po-
tius de indole leprosa suspicio adesse videtur.

¹⁹⁾ L. c. in praefat.

²⁰⁾ Signum aleppicum. GERM. *Die Flechte von Aleppo.*

Das Aleppische Zeichen.

²¹⁾ FERRIERES. SAUVEBOEUF'S *Reisen in die Turkey.*
p. 511.

²²⁾ *Schwedische Abhandlungen.* 12. B. p. 140.

*) *Leitungen des Höchsten.* 5. Th. p. 230.

§. CLIII.

Rosa Asturica.

Definitio. 1. Morbus in vallibus Oveti endemius, pel-
lagrae sat similis, *Rosa* dicitur *Asturica* ²³⁾.

Scriptores. 2. Notitiam hujus morbi potissime THIERY ²⁴⁾
et TOWNSEND ²⁵⁾ debemus.

Sympto-
mata.

3. *Rosa asturica* inter homines vulgares, ver-
nali tempore, sub forma maculae rubrae, superfi-
cie aspera instructae, ad dorsum manuum et pe-
dum comparet. Locus affectus vehementer dolet,
superficies sensim sensimque crassior evadit ac in
crustas cum fissuris transit. Crustae hae, quam-
vis plerumque siccae sint, attamen foetorem spar-
gunt. Media aestate eae decidunt, relicta cute
glabra et depressa. Vitiligo ista crustam quoque
anno pejorem largitur. Temporis tractu altera im-
petigo ad collum supervenit, quae a regione cla-
viculae ad sternum, latitudine duorum digitorum,
descendit. Interea partes superiores corporis tu-
mefiunt ac vires ita decrescunt, ut aeger toto cor-
pore contremiscat et in pedibus stare impar sit.
Sensus caloris interni nocturnum fugat somnum.
Et sese in aquas praecipitandi desiderium animad-
vertitur. Tandem deletio sensuum officio, miser,
prae-

23) *Lepra asturica* SWEDIAUERI. HISPANICE. *Mal de la rosa.*

24) *Réceuil périodique d'observations de médecine.* Vol. 2.
P. 337.

25) *Voyage en Europe fait dans les années 1786 et 87.*

praevis amentia, delirio, sopore, aut tabe, aut hydrope perit.

4. Aquarum conditio, defectus panis fermentati, abusus fructuum, pro caussis rosae asturicae haberi solent.

5. Characteres leprae adeo evidentes hoc in morbo sunt, ut eum eo magis pro morbo *leproso* declarare possimus, quo lepra in Asturia adhuc ita communis sit, ut viginti illi dicata inveniantur nosocomia ²⁶). *Rosa asturica* solum a *pellagra* differt, quod in illa *crustae*, in hac solummodo *squamae* obveniant.

6. Frequentiae incolarum ita *rosa asturica*, uti *pellagra*, *plica*, *radesyge* etc. obstat.

7. Nitratem potassae et lenia purgantia ab iniuria porrecta, morbum sublevare feruntur.

§. CLIV.

Y a w s.

1. Morbus variolis similis, sed chronicus, in Africa, in insulis Indiae occidentalis, nec non in India orientali endemius, *Yaws* vocatur.

2. *Yaws* *) Arabibus sub nomine SAFATH notum fuisse contenditur ²⁷). De hoc morbo non minus

²⁶) *Annalen der Reisen, Geographie und Geschichte von A. KUNN Jahrgang 1809. p. 83.*

*) Aethiopes Guineae GATTOO vocant.

²⁷) *Beyträge zur Geschichte der Medicin. 3s St. p. 92.*

minus quam de PIANs, inter alios *) scripserunt SCHILLING ²⁸⁾, MACPHERSON ²⁹⁾, TODE ³⁰⁾, LUDFORD ³¹⁾, SPRENGEL ³²⁾, ADAMS ³³⁾ et ALIBERT **).

Symptomata.

3. Evolutionem morbi dolores osteocopi nocturni praecedunt. Aeger insomniis terrificis et saepe febre cum pulsu debili ac virium decremento, excruciat. Praeterea ipse malacia ita laborare solet, ut cretam, terram, carbonem etc. appetat. Supervenit melancholia, desperationi affinis. Interea caput ad deformitatem usque intumescit, quo facto pustulae variolis simillimae, polline furfuraceo circumdatae, primum ad collum, circa laryngem, in conspectum veniunt. Pustulae hae et alia dein loca, potissime inguina et axillas occupant. Eruptio autem lente perficitur. Tandem elapsis plurimis interdum mensibus, symptomata supra allata, exceptis doloribus osteocopis, facile in cariam

*) LOEFFLER, VALENTIN, PEYRILHE, uti videre est apud ALIBERT. l. c.

28) Diatribe de morbo in Europa penitus ignoto. Ultrajecti. 1769.

29) Diss. de Frambaesia. Glasgow. 1785.

30) Diss. de Frambaesia. Hafn. 1789.

31) Diss. de Frambaesia. Edinb. 1791.

32) Diss. de morbo Yaws dicto et de vena medinensi. Halae 1797.

33) *Memoirs of the medical society of London.* 6. Vol. No. 10.

**) Op. c. 8. livraison. p. 153. Tab. 35.

cariem abeuntibus, cessant. Perstantibus diu pustulis, pili in viciniis canescunt, ac ipsae pure albo, tenaci, spisso, rodente, replentur. Pus huiusmodi venas erodendo vicinas, gravibus haemorrhagiis, ansam porrigit. Caeterum pustulae neque dolent, neque sensu omnino destitutae sunt. Ulcera *yaws*, nec faucibus parcentia, margines furfuraceas exhibent ac pus tenax, album largiuntur. Ad articulos ex eorum plurimis unum permagnum ulcus ³⁴⁾ nasci solet. Sequitur inde facile rigiditas et curvatura articuli ³⁵⁾. Ad plantas pedum ulcera comparent callosa excrescentiis carneis juncta ³⁶⁾, venis varicosis circumdata, gressumque impediunt. Varices, impedita *yaws* evolutione, copiosius occurrunt. Quo citius ulcera proserpunt, eo citius febris, symptomatibus nervosis et saepe hydrophobia juncta, in diarrhoeam, choleram aut hydropem transitura, sequitur. Non raro morbus in lepram squamosam transit, alias sponte sanatur.

4. SCHILLING viscerum hic detexit suppurationes ³⁷⁾. Autopsia cadaverum

5. Contagium, contactu et coitu communicatum, potissimam *yaws* sistit causam. Et muscarum

34) Vulgo: *Mama-Yaws*.

35) ALLAMAND in Nov. act. nat. cur. Vol. IV. p. 38.

36) Vulgo: *crabbe-yaws*.

37) SCHLEGEL thesaurus pathol. Vol. II. p. 230.

rum quarundam *) culpa, quae prius ulceribus insedendo pure imbuuntur et dein sanos inficiunt, morbus propagatur. Sunt qui climatis aestum et alimenta accusent **). Aetas infantilis praecipue ad hunc morbum proclivis est.

Diagnosis. 6. Sicuti transitus *yaws* in lepram, satis de origine leprosa hujus morbi testatur, ita illius spontanea sanatio, omnem *syphilidis* suspicionem excludit. Patet inde etiam *yaws* nequaquam cum *sibbens*, vel *scherlievo*, utpote affectionibus evidenter venereis, confundi debere.

Prognosis. 7. Prognosis ex descriptione symptomatum elucet. Addendum tantum est, hominem eundem semel in vita *yaws* subijci.

Cura. 8. *Mercurium* hic nocere PEYRILHE autumat***). BAJON illius usum commendat, dummodo eruptio jam contigerit ³⁸⁾. Laudatur *arsenicum* ³⁹⁾, et usus topicus *sulphatis zinci* ⁴⁰⁾. Ita balnea, victus facilis digestionis, et decocta lignorum. Infantes curantur, mercurium nutricibus exhibendo.

*) Mouches - framboesia.

**) ALIBERT l. c. p. 163.

***) ALIBERT l. c. p. 165.

38) Mémoire 2.

39) ADAIR in med. Comment. v. Edinburgh. 9. B. p. 36.

40) KEUTSCH in Nord. Archiv. 4. B. 2. St. p. 88.

§. CLV.

P i a n s.

1. Morbus in oris maritimis Guineae oriun- Definitio.
 dus, aethiopibus inprimis proprius, *Yaws* similis,
Pians audit.

2. Praeviis pruritu summo cutis, febre, vi- Sympto-
 rium prostratione et macie, species eruptionis her-
 peticae furfuraceae, dolore rodente stipatae, ad
 partes genitales sese prodit, ac interdum vel ad in-
 guina et axillas propagatur. E medio hujus impe-
 tiginis, efflorescentia rubra, magnitudine acus,
 exsurgit, quae dein albescit ac serum flavum acre
 largitur. Ulcera haec saepe ad magnitudinem pal-
 mae manus extenduntur ac superficiem partium
 genitalium destruunt. Cooperiuntur excrecentiis
 fungosis, fructus mori, vel rubi idaei figuram re-
 ferentibus *). Crines nunquam albescunt. Ex
 confluxu plurimorum ulcerum magnum oritur 41).
 Peracta eruptione cutanea, symptomata praegressa
 evanescent; ea vero impedita, dolores sequuntur
 osteocopi, nocturni, qui tandem in exostoses ac
 ossium molliem abeunt. Progrediente morbo
 cutis quoque ad plantas pedum et interdum ad
 manus crassa redditur, sociis dolore, rigiditate et
 impetigine herpetica ad digitos. In Cayenna hoc
 malum SAUAVAS dicitur. Transit plerumque in ul-
 cera

*) ALIBERT op. c. Tab. 36.

41) Vulgo: *mama-pians*.

cera indolis cancrasae 42). Saepe ad ungues ulcuscule comparent, coloris cerasorum rubrorum, admodum dolentia 43), quae, nisi ungues rescindantur, destructionem ossium post se trahunt. Inter ulcera pedum etiam rhagades, marginibus siccis stipatae, saniemque fundentes oriuntur. Nunquam *pianis* a natura sanatur, cui si relinquatur, hydrops, colica, paralysis, mala varia nervorum et tabes sequi solent. Saepissime *pianis* in morbum rubrum 44) transit. Haud infrequenter vel cum syphilide societatem inire solet.

Causae.

3. Eadem ratione *pianis* propagatur ac *yaws*.

Diagnosis.

4. *Pianis* a *syphilide* differre, docere videtur morbi origo, symptomatibus *universalibus* stipata, cui solummodo serius vitium parziale superaccedit. Dein vel exitus morbi, sibimet ipsi relictis, multum, ni fallimur, ab eo luis venereae differt. Nichilominus utpote omni experientia hac in re destituti, proprium iudicium libenter suspendimus. Cl. SPRENGELIUM 45) secuti sumus, sequentem inter *yaws* et *pianis* statuentem differentiam.

Yaws.

42) Vulgo: *Crabben*.

43) Vulgo: *Guignes*.

44) *Mal rouge*.

45) L. c. p. 541.

Yaws.

1. Orditur a *doloribus* ossium.
2. Eruptio sub forma *variolarum* ad collum contingit.
3. Pustulae *pus* largiuntur.
4. Crines circa pustulas canescunt.
5. Sanatur unius naturae auxilio.

Pians.

1. Orditur a *pruritu* cutis.
2. Eruptio sub forma *herpetis*.
3. Efflorescentia *serum* exudat.
4. Crines non mutantur.
5. Sponte haud sanatur.

Caeterum non ignorandum, medicos anglos et gallos, in regionibus tropicis et India orientali praemin exercentes, quot quot sunt, *yaws* et *pians* pro uno eodemque morbo habere ac nomine *Frambaesia* comprehendere, cui, utpote barbarae voci, nomen *Thymiosis* substituit Cl. SWEDIAUER⁴⁶⁾. Et ALIBERT *yaws* et *pians* pro speciebus unius ejusdemque morbi habet *).

46) A *Σύμμα*, tubera carnosae et verrucosae. op. c. Vol. II. p. 79.

*) L. c.

CAP. XXXVIII.

De Vitiis Transpirationis.

§. CLVI.

De Argumento in Genere.

Transpira-
tio et su-
dor. I. Cutim universam vaporem exhalare, nunc
sensus nostros fugientem (*transpiratio insensilis*),
nunc sub forma liquidi obvium (*sudor*), constat.

Transpira-
tio insensi-
lis. 2. *Transpirationis insensilis* doctrina potissi-
me SANCTORIO ⁴⁷⁾ debetur. Eam multis experi-
mentis PETRUS MOSCATI locupletavit ⁴⁸⁾. Legatur
de hoc argumento SPRENGEL ^{*)} et Cl. MARCUS ⁴⁹⁾.
Dum autem omnes circa *copiam* materie transpi-
rationis conveniunt scriptores, magna inter eos
circa illius *qualitatem* occurrit opinionum diversi-
tas ⁵⁰⁾. Sic gaz acidi carbonici e cute exhalationem,
quam

47) *Stadica medica.*

48) Dolemus experimenta haec necdum publici juris fa-
cta esse.

*) L. c. p. 60.

49) L. c. p. 6.

50) Pulchre auctorum opiniones JURINE exposuit (*Encyclo-
pédie méthodique*. 38. Livraison. Vol. I. Part. 2.
Air. Hygiene. Chap. 1. art. 2. §. 1.)

quam admittunt W. CRUIKSHANK ⁵¹⁾ et ABERNETHY ⁵²⁾, hanc FOURCROY ⁵³⁾ alique ⁵⁴⁾ negant.

3. *Sudoris* indoles opera FORDYCE ⁵⁵⁾ et FOURCROY ⁵⁶⁾ longe magis innotuit. Sudor.

4. Potest autem transpiratio peccare, tum *de-* Aberrationes.
fectu, tum *copia*, tum *qualitate*.

§. CLVII.

Transpirationis defectus.

1. *Transpiratio deficiens* sive *suppressa* ple- Varia origo.
rumque *symptoma* aliorum morborum sistit; at,
constituit interdum vel *morbum per se*.

2. Si enim ex siccitate cutis ad transpirationis Observat.
defectum concludere licet, vitium hujusmodi ob-
venit apud individua quarundam familiarum hae-
reditario jure, apud feminas steriles ⁵⁷⁾, apud se-
nes, maniacos, opifices calcem pertractantes, apud
homines impuros et eos, qui vitam sedentariam
ducunt. Nullibi vero major cutis siccitas animad-

ver-

51) *Experiments on the insensible perspiration of the human body, shewing its affinity to respiration.* Lond. 1795.

52) PEDELLII *Diss. de diaphoretica methodo.* Hal. 1797.

53) *Eléments d'histoire naturelle et de chimie.* T. IV.

54) PRIESTLEY. VOLTA.

55) Vid. SWEDIAUER op. c. Vol. I. p. 218.

56) L. c.

57) MOREAGNI *Epistol.* XLVI. 3.

vertitur, quam in hydrope et in diabete. In defectu transpirationis ad tempus, plerumque praeter cutis siccitatem etiam illius temperatura augetur. Medemur defectui transpirationis, per balnea tepida et vaporis, per frictiones cum oleo, per motum corporis, potum calidum leniter aromaticum, et per remedia specifico modo in cutis secretionem agentia (*Diapnoica, Sudorifera*). Interea causam transpirationis suppressae semper coram oculis habere ac nunquam oblivisci debemus, dari homines nullo pacto ad sudorem dispositos et casus, in quibus res, in genere transpirationem supprimentes, e. c. affusio ope aquae frigidae, sudorem eliciunt, quod HALLERUM non latuit ⁵⁸⁾.

§. CLVIII.

Transpiratio copia et qualitate peccans.

In genere.

1. *De transpiratione copia peccante*, de sudore scilicet, multorum morborum adventitio symptomate nonnullorumque malorum causa occasionali, pluries disseruimus ⁵⁹⁾.

Hyperhidrosis.

2. Hic autem agitur de sudoris excretionem profusa, nisi morbum specificum, saltem essentielle symptoma constituyente, scilicet de *Hyperhidrosi* ⁶⁰⁾.

13. Sudor

58) Elem. Physiologiae T. V. p. 70.

59) P. I. Vol. I. §. XII. 4. §. XXIV. 2. §. XLI. §. XLIX. 9. Libro praesente Cap. III. Cap. XXVIII.

60) Ab Ὑπέρ, quae praepositio in compositione vim vocis, quacum copulata est, auget, ac ἰδρώς, sudor.

3. Sudor nimius nunc est *universalis* (*Hyperhidrosis* proprie dicta), nunc *partialis* (*Ephidrosis* ⁶¹⁾). Sudor unius lateris a SCHMIDIO ⁶²⁾, a G. FRANCO ⁶³⁾ describitur. Sudoris ad volam manus per octo annos durantis GILIBERT meminit ⁶⁴⁾. Judaeum noscimus, cui saepe sudor ad spatium triangulare inter pollicem et digitum indicem manus sinistrae prorumpit. Sub gravi dolore arthritico brachii, totum hoc membrum sudore cooper-
tum vidimus. Forte hydrops saepe nil aliud est nisi effectus *sudoris interni*. Quocunque in casu sudor differre solet, tum quoad *consistentiam*, tum quoad *odorem*, tum quoad *saporem*. Nunc enim *sudor tenuis* vaporis instar manat, nunc *limpidus* per membra decurrit, nunc *lacteus* ⁶⁵⁾, aut *oleosus* ⁶⁶⁾ cutem obducit. Nec exempla *sudo-*
ris

61) Ἑφίδρωσις. HIPPOCRATES. Profusio sudoris in parte.

62) Eph. N. Cur. Dec. I. an. VI. obs. 126. p. 287. Vid. et aliorum observationes Dec. II. an. X. obs. 194. — Dec. III. an. II. obs. 52.

63) Ibid. Dec. I. an. IV. obs. 100.

64) Adversaria medico practica prima. p. 233.

65) PAULLINI obs. phys. med. in appendice. Misc. Nat. Cur. Dec. II. an. V. obs. 18.

66) SCHULZ in Misc. Nat. Cur. Dec. I. an. VI. obs. 170.

ris arenosi ⁶⁷⁾, *salini* ⁶⁸⁾ desiderantur. *Odore* specifico ingrato sudor sive transpiratio aethiopum ⁶⁹⁾, lapponum ⁷⁰⁾, lithuanarum ⁷¹⁾, menstruantium, hominumque capillis rufis instructorum insignitur. Allium et cepas judaeorum polonorum sudor olet. Ipsius sudoris acidi, a cibis, meminit BONNET ⁷²⁾. Acidum spirat et sudor puerperarum, lactantium, infantum ubera sugentium, et, ut diximus, aegrorum, quibus miliaria imminet. Nec de odore specifico sudoris in lepra, pellagra, variolis, iterum loqui opus est. Plurima exempla *sudoris urinosi* fasti medici exhibent ⁷³⁾, plurimaque nobis obvenerunt. *Vel cadaverosi odoris* ob-

servatus

67) BARTHOLINUS *histor. anat. rara*. Cent. I. obs. 34.

T. II. p. 55. HORSTIUS *mon. ad med.* Part. I. p. 123.

— Eph. N. C. Dec. II. an. IX. obs. 84.

68) WEIKARD *Entwurf einer einfachern Arzneykunde*. p. 106.

69) THIBAUT DE CHAVALORI *Voyage à la Martinique*. p. 44. FORSTERS *Reisen um die Welt*. 3. Th. p. 170.

— HALLER in *prælect. acad.* T. III. §. 425. p. 297.

70) Odorem olei balaenarum spirant.

71) GILBERT l. c.

72) *Theatr. tabidor. exerc.* 29.

73) HALLER *Grundriss der Physiologie mit Anmerkungen von WRISBERG, SOEEMMERRING und MECKEL*. Berlin 1788. p. 160. — BOERHAAVE *Prælect.* T. 3. p. 316. — SALMUTH *lib. II.* obs. 82. RAULIN *observations de médecine* p. 200. — ZEVIANI *del flato iposondriaco*. p. 157. — CAROL. PISO obs. 126.

servatus est sudor ⁷⁴). Ita sudor odorem cantharidum habens *). Ad *colorem et saporem* quod attinet, sudor observatur nunc pallide flavescens, croceus ⁷⁵), viridis ⁷⁶), coeruleus ⁷⁷), ruber ⁷⁸),
ater

74) Act. Hafn. III. obs. 19.

*) BRERA *Giornale di medicina pratica*. 1812.

75) Sudor croceus, qui febrem acutam terminavit, describitur ab ACOLUTHIO (Eph. N. C. dec. II. an. IV. obs. 169). Pinguedinosum et croceum sudorem unde lintea tingebantur, descripsit SCHULZIUS (Eph. N. C. Dec. I. an. III. obs. 170). Item HILDANUS (c. VI. 77).

76) PAULLINI Cent. I. obs. 38.

77) FOURCROY l. c. p. 363. — De sudore coeruleo dextri hypochondrii refert DOLAEUS (Eph. N. C. Dec. I. an. VI. obs. 67). WINCLER (Collect. acad. T. III. p. 263.), CONRADI (*Handbuch der pathologischen Anat.* p. 292).

78) Jam ARISTOTELES sanguinei sudoris mentionem fecit (IV. a. 9. Lib. III). Vide praeterea: LANGELOTT Collect. acad. T. 3. p. 255. — SCHWENK haematologia 130. — MALDONATUS T. 1. in Evang. Matth. c. 26. — FERNELIUS lib. 6. path. 4. — TULPIUS II. 31. — HORSTIUS P. II. obs. 15. — BARTHOLINUS hypomn. 4. de cruce Christi. — LIBAVIUS Diss. de lacrymis cruentis §. 4. — BECKER med. mir. c. 5. — JOHNSTON thaumat. nat. c. X. c. 3. — G. FABRICIUS Lib. III. annat. Mis. theatr. Europ. T. II. p. 115. — MERCURIALIS lib. IV. — LANZONI Eph. N. C. Dec. III. an. I. obs. 109. et cent. I. et II. obs. 20. — EBERHARDUS Diss. de sudore nimio. p. 23. — In juvene sudoris sanguinei exemplum habetur in Eph. N. C. Dec.

ater ⁷⁹⁾, phosphoricus ⁸⁰⁾, nunc insipidus, sal-
sus ⁸¹⁾, subdulcis ac mellitus ⁸²⁾. Hinc in-

Dec. II. an. X. obs. 179; atque simile infantis recent-
ter nati l. c. obs. 65. — Lege porro: SEHILLING de
sudore sanguineo, post graves convulsiones et spasmo-
dicos affectus erumpente, feliciter tandem sublato, in
act. phys. med. Vol. VIII. obs. 116. p. 425. LEDE-
LIUS Eph. N. C. Dec. VI. an. II. obs. 34. p. 63. —
Sudor rubicundus sub coitu viri, ita ut proprium et
uxoris indusium tingeret, describitur in Eph. N. C.
Dec. II. an. VI. obs. 47. — A motu sub axillis su-
dorem coloris minii observavit MAURIT. HOFFMANN
ibid. an. III. obs. 27. — Aliud exemplum habetur in
eodem opere Dec. I. an. III. obs. 46. — Vide postre-
mo operis praesentis P. I. Vol. I. §. XLIX. 3.

79) Talem describit HODGERSIUS de nupera peste Londi-
nensi; alium adduxit OLAUS BORRICHIIUS in Act.
Hafn; alium LANGELOTTUS de sudore atro et sangui-
neo in Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. VI. obs. 10. —
Praeterea sudoris nigri exempla habentur apud ZACU-
TUM LUSITANUM (P. III. obs. 73.) et GALEATIUM
(Comment. Bonon. Vol. VI. p. 6). De sudore pe-
dum nigro, sub usu malatis ferri observato, sed se-
posito etiam remedio continuato, Dr. CORTI Placen-
tinus, et J. P. FRANK rationem reddidit.

80) HENKELIUS in Act. physic. med. Vol. V. obs. 94.
p. 332.

81) Sudor vel in sano homine salsus est, atque princi-
pia urinae similia largitur (HALLER praelect. acad. in
Boerhaav. Institut. T. III. §. 425. not. 1).

82) Huc spectat ephidrosis mellea RHODII (c. 3. obs. 68)
et oleoginosa pinguis MOLLENBRUCKII (Miscell. curios.

germ.

de liquida epota *immutata* per sudorem secedunt ⁸³).

4. Sudorem vel post mortem erupisse fecerunt ⁸⁴). In genere post hyperhidrosin, cadavera, ^{Autopsia} suppurationes conspicuas viscerum, inprimis pulmonum, morbos renum, potissime calculos urethrae orificium obstruentes ⁸⁵), cancrum uteri ⁸⁶) et liquorem extravasatum, cerebrum comprimentem, exhibere solent. ^{cadaverum.}

5. Dispositio ad sudorem interdum haereditaria est ⁸⁷). Sudorem autem ipsum excitant calor ⁸⁸), potus tepidus copiosus, aromaticus, remedia, quid quid dicat CULLENIUS ⁸⁹), specificae in cutem agentia, e. c. salia volatilia, opium, camphora,

germ. an. II. obs. 19), quas SAUVAGES citat (Nosol. Vol. II. p. 37). Et sudor colliquativus phthisicorum, quem muscae tam avide prosequuntur, dulcis videtur.

83) Fertur per cutim exivisse epota cerevisia (SALMUTH c. 2. 28), vinum rubrum (BARTHOLINUS c. 4. h. 61) aliaque liquida (MARCELLUS DONATUS de medic. histor. mirab. Lib. IV. c. 27. p. 261).

84) Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. III. obs. 83.

85) SALMUTH Lib. II. obs. 32.

86) BICHAT *Anat. générale*. T. II. p. 562.

87) TULPIUS obs. med. lib. III. obs. 42. p. 253.

88) De sudore regionibus tropicis endemio legatur HALLER (l. c.).

89) Mat. med. Vol. I. p. 573.

camphora, acetum etc., saburrae ⁹⁰⁾, suppurationes ⁹¹⁾, contagium febris sudatoriae ⁹²⁾, variolarum, motus corporis animique, praesertim subsequente jam quiete ⁹³⁾, pudor ⁹⁴⁾, terror, somnus ⁹⁵⁾, cessatio menstruorum *), coitus etc. — Res sudoris *qualitatem* immutantes ex dictis ⁹⁶⁾ elucet. Pertinent huc et pharmaca nonnulla e. c. ruta graevolens ⁹⁷⁾.

Diagnosis.

5. Sententiae HIPPOCRATIS: „in qua parte sudor est, in ea morbus est ⁹⁸⁾“ — et HALLERI: „sudor a sanissimo homine alienus et semper violentus

90) Ephidrosis a saburra SAUVAG. vide et BIANCHI (histor. hepat. Ep. 137) et MARTEAU DE GRAND VILLIERS (*Journal de médecine* 1762. p. 29).

91) 4.

92) P. I. Vol. I. §. XLi.

93) Hinc ARISTOTELES: „Non in currendo, agitandoque corpus, sed postea quum cessatum est, plus sudoris evadit“ (Problem. Sect. III. probl. 24). — „Neque intentus, neque contento spiritu, sed potius relaxatus, sudor provenit“ (l. c. probl. 1).

94) ALEX. APHRODISIAEUS. Probl. Lib. I. prob. 10.

95) „Qui dormiunt, magis sudant“ (ARISTOTELES l. c. probl. 15).

*) TISSOT *Oeuvres*. T. II. *Prém. Partie* p. 118.

96) 3.

97) Rutam sudores olentes reddere, ARISTOTELIS est observatio (l. c. probl. 13).

98) Apher. lib. IV. No. 38.

lentus est 99)“ — restricte intelligi debent: sunt enim sudores saepe indicium absolutae sanitatis 100). Nec mirum est, *sudorem habitualement salutarem* esse, cum de sudore critico nullum extet dubium. *Morbosum* dicimus sudorem, qui ex la-be sive diathesi aliqua originem ducit ac corpori detrimentum affert. Hujusmodi sunt: sudor *diatheseos inflammatoriae* aut *rheumaticae* effectus 1) summam morbi vim indicans; — sudor *febris intermittens perniciosae diaphoreticae* symptoma 2), sub medio paroxysmo oriens, ac ita saeviens, ut aeger tandem exhaustus, extremitatibus frigidis, facieque cadaverosa decumbens, nisi succurratur, intereat; — *sudor gastricus* nonnullis febribus praesertim biliosis proprius 3). *Sudorem atonicum* communissimum esse, sudores in regionibus tropicis, in convalescentia, in typho, in phthisi, in

N n 2

agone

99) L. c.

100) „Quemadmodum plurimis hominibus certis temporibus diarrhoea utilis esse solet; ita etiam sudores nonnullis familiares sunt et proficui (SCHULZIUS in Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. VI. obs. 167).“ Revera plures aetatis propectae homines; summa cum virium recreatione sudantes; novi; ac feminam nosco Vilmensem; quae, nisi profuse sudet aut fluore albo laboret, plurimis malis nervosis vexatur.

1) P. I. Vol. I. §. LXIII. 3. §. LXIX. 2.

2) Ibid. §. XXIV. 2.

3) Adde, quaeso, hanc observationem §. LX. P. I. V. I. p. 231. lineae primae.

agone et in paralyſi ⁴⁾ docent. Sudor *qualitate* peccans, plerumque ſuppreſſioni aliarum evacuationum, inprimis urinae, tribuendus eſt. Praeterea *diathesis arthritica* maxime in ſudoris conditionem influit. Sudor viridis, coeruleus et coccineus, originis nunc *ſcorbuticae* ⁵⁾, nunc *ſpasmoticae* ⁶⁾, nunc *plethoricae* ⁷⁾ videtur. Morpiones in ſuperciliis et axillis interdum ſanguinem inſtar ſudoris elicere, diximus ⁸⁾.

Prognosis. 6. „In genere ſudores, quo profuſius per cutem ſtillant, ac quo magis a naturali tenuitate, colore, odore, ſapore recedunt; eo majus vel de ſolidorum fluidorumque turbis, vel de ſecretionis cutaneae vitio, atque de humorum utilium jactura, teſtimonium largiuntur. Qui interim ad pedes, axillas, in multis ſudor prorumpit, hic, licet foetidus ac ingratus, ſanitatē non ita, ut incaute ſuppreſſus, offendit⁹⁾.“

Cura. 7. Sudor ſive aliarum excretionum vicarius, ſive habitualis, ſive cum virium recreatione contingens,

4) KIRKLAND *a commentary on apoplectic and paralytic affection*. Lond. 1792. p. 4.

5) Ab ecchymomate ad ſudorem cruentum gressus modo requiritur.

6) E. c. ab animi pathemate.

7) De ſudore ſanguineo a menſtruorum aberratione alio loco (P. IV. Vol. I. art. de Meniſcheſi) ſermo erit.

8) Cap. XXX. cap. CXVII. 4.

9) J. P. FRANK *Epitom. Lib. V. P. I. p. 35.*

tingens, nunquam cohiberi debet. Sudor ex *diathesi inflammatoria*, venae sectione, temperatura modica, quiete corporis animique, acidis vegetabilibus et alvi purgatione curatur. *Febris pernicioſa diaphoretica*, sub paroxysmo *opium* cum *aethere*, dein *corticem cinchonae* exposcit. Sudor gastricae indolis alvum evacuantibus subacidis moderatur. *Sudoris atonici* fere certum auxilium *opii* cum *tinctura aromatica sulphurica* conubium sistit ¹⁰⁾. Interea et *opium* nec non reliqua diaphoretica e. c. *salvia officinalis* ¹¹⁾, *camphora* hic prodesse solent. Hanc praecipue in sudore, cancrum sive uteri, sive mammae comitante, utilem invenimus. Caeterum et tonica sive adstringentia, praecipue *vinum* ¹²⁾, *alcohol* ¹³⁾, *corticis cinchonae infusum frigidum*, *acidum sulphuricum alcoholisatum*, *serum lactis aluminosum*, *aquae gaz acido carbonico saturatae*, imprimis simul *ferruginosae*, haud negligi debent. Nec *balnea* sive *marina*, sive *martialia*, nec *frictiones cutis*, nec *unctio* cum *oleo* et *rebus aromaticis* ¹⁴⁾, spernenda sunt. *Adstringentia*, consilio *Aeginaetae*

10) P. I. Vol. I. §, LVI. 4. not. 95.

11) SWIETEN-Commentar. T. II. p. 370.

12) SYDENHAM Sect. V. cap. 2. p. 291. (Vinum malacense).

13) Rustici et milites, aestivos sudores sub laboribus et itineribus, cremato aqua nupto compescere solent.

14) CELSUS lib. III. cap. 6.

*tac*¹⁵⁾, extus adhibere, nunquam ausi sumus. Potius absorbentia e. c. *semina lini*, quo lecti aegrorum sudore madescantium resperguntur¹⁶⁾, aut *furfures*¹⁷⁾ suademus. Tandem non inane consilium erit, reliquas evacuationes, inprimis urinae secretionem, promovere.

CAP. XXXIX.

De Vitiis Tactus.

§. CLIX.

Generatim.

Argumen-^{1.} ti digni-
tas. Nullus extat sensus adeo diffusus ac *tactus*,
cujus doctrina praeterea elementa doctrinae reli-
quorum sensuum amplectitur. Mirum hinc est,
quod adeo sint pauci, qui de tactus vitiis scripse-
rint, cum librorum circa morbos olfactus, audi-
tus et praecipue visus tanta jam adsit copia, ut
bibliotheca effici possit.

2. Dividi

15) Lib. II. cap. 46. p. 22.

16) Sic apud *Bengalos* mos est (*Lettres curieuses et édi-
f. antes des missions étrangères. T. XV. p. 414*).

17) Sudorem habitualement pedum, admodum molestum,
furfuribus, quibus tibialia respergebantur, sine detri-
mento sensim sensimque fugatum vidimus.

2. Dividi potest tactus in *externum* et *inter-* Divisio.
num. *Tactu externo* impressiones ad externam
 corporis superficiem contingentes recipiuntur ac
 sensorio communi traduntur. *Tactu interno* idem
 relate ad impressiones ex internis partibus profi-
 ciscentes, contingit. Hic duntaxat de externo tactu,
 utpote in systemate cutaneo locato, sermo fit.

3. Tactus nunc morbose *augetur*, nunc *Vitia*.
deletur, nunc alio modo *pervertitur*, quo
 fit, ut objecta externam superficiem tunc
 afficientia, impressionem vel majorem, vel mino-
 rem, quam par est, vel erroneam excitent, quae
 impressio, sensorio communi tradita, sensatio-
 nem producit nimiam, deficientem, vel per-
 versam.

§. CLX.

Tactus auctus et perversus.

1. Tactus, sive potius cutis sentiendi facultas *T. auctus*.
augetur a frigoris tum *externi* ¹⁸⁾, tum *interni* ¹⁹⁾
 modico gradu, a vehemente distensione ²⁰⁾, ab
 inflammatione, ab exanthematibus ²¹⁾ et impetigi-
 nibus

18) Levis contusio, leve vulnusculum maximum sub
 aura frigida excitat dolorem.

19) Aegri sub stadio frigoris febrium intermittentium
 aliquando etiam mitem cutis attactum respuunt.

20) Homines quaestioni submissi, distensa jam cute, a
 minimo attactu crudeles experiuntur cruciatus.

21) Cap. XI. §. LI. 4.

nibus nonnullis, ab hysteria ²²⁾ et, quod mirum est, ab ipsa interdum paralysi ²³⁾.

Tactus per-
versus.

2. De tactu perverso aut abnormiter affecto, testantur, — ne de dolore, quem aegri in membris amputatis hinc inde percipere credunt ²⁴⁾, loquamur, — tactus duplex interdum in hypochondriasi observatus ²⁵⁾, sensus ardoris aut frigoris, sine ulla temperiei cutis mutatione tum apud hypochondriacos, tum apud hystericas in variis cutis partibus obveniens, formicatio iisdem familiaris ac in raphania gentilitia et tandem *pruritus* sive *prurigo*, de qua speciatim.

22) Judaea Vilmensis hysterica, cutis attactum tam aegrefert, ut sub ipsa pulsum exploratione, primum anxiosa, pallida fiat, ac diutius continuata brachii pressione, in lipothymiam incidat.

23) A. 1813 in nobilissimo doctissimoque viro, Viennae hemiplegia decumbente, tantam lateris affecti sensibilitatem observavi, ut neque attactum neque frictiones perferre potuerit.

24) LAMORIER de doloribus artuum imaginariis post amputationes reliquis. Vide *Mémoires de l'Acad. de Montpellier* 1737. — Act. med. Berolin. Dec. II. Vol. VIII. p. 59. — FABRIC. HILDANUS Cent. III. obs. 14. 15. — LODERS *chirurg. Bemerkungen*. 1. B.

25) Nova acta nat. cur. Vol. III. obs. 86. — STURM de sensu unius geminato. Alt. 1686.

§. CLXI.

Prurigo.

1. Pruritus molestus, nullius alterius morbi Definitio comes, sed malum per se constituens, *pruriginis* nomen obtinet.²⁶⁾

2. Prima hujus morbi recta descriptio PLINIO Scriptores. debetur ²⁷⁾. Secuti sunt AVICENNA ²⁸⁾, MERCURIALIS ²⁹⁾, HAFENREFFER ³⁰⁾, SENNERT ³¹⁾, SOMMER ³²⁾, LOESCHER ³³⁾, LORRY ³⁴⁾ et WILLAN ³⁵⁾.

3. Prurigo nunc *universam* corporis superficiem, nunc *unam* tantum illius partem detinet. In *prurigine universali* aegri interdum tantos experiuntur cruciatus, ut cutim unguibus dilacerent aut strigilem pro scalptu adhibeant, Malum verus

Symptomata.

26) CNESMUS a GRAEC. Κνᾶειν, fricare. — SCABIES proprie dicta, — GERM. *Jucken*. — GALL. *Démangeaison*. ANGL. *Itshing*, *scalding*. ROSS. Свѣрбѣхъ. POLON. *Swierzbiączka*.

27) Nat. histor. lib. XX Cap. 17, lib. XIII. Cap. I. et lib. XXVII. cap. 4.

28) Lib. IV. Fen. 7, tract. 3.

29) L. c. lib. II. cap. 3.

30) L. c. lib. I. cap. 4.

31) Prax. med. lib. V. p. 3. sect. I.

32) De affectibus pruriginosis senum. Altdorf. 1727.

33) De pruritu senili. Wittenberg, 1728.

34) L. c.

35) L. c. p. 44.

sus noctem, prope ignem et post lautum pastum, inprimis saevire solet. Saepe pruritus sensum nunc insectorum super cutem reptantium, nunc puncturae a formicis, nunc ustionis socium habet. Examinatis locis prurientibus non nisi vestigia, quod aeger scalpserit, percipiuntur. *Prurigo partialis* inprimis ad anum, praeputium, urethram, scrotum et pudenda muliebria occurrit, quibus ultimis in locis torminibus magnis, a LORRY egregie descriptis ³⁶⁾, ansam dat.

Causae.

4. Aetas juvenilis et senilis ad pruriginem universalem disponit; item tempus vernale. Excitatur ea, ne de pediculis morbum peculiarem producentibus ³⁷⁾ loquamur, a plethora ³⁸⁾, a cibis nocuis ³⁹⁾, dulcibus ⁴⁰⁾, a liquoribus fermentatis ⁴¹⁾, ab hepatis affectione ⁴²⁾, a transpiratione suppressa, ab immunditie, a mala consuetudine ⁴³⁾,

ac

³⁶⁾ L. c. p. 450.

³⁷⁾ Cap. XXX. §. CXVII.

³⁸⁾ Ex omitta habituali venae sectione et ex suppressis haemorrhoidibus pluries universalem molestissimumque pruritus observavi.

³⁹⁾ E. c. mytilis (P. I. Vol. I. §. LIX. 3), GALEN. de sympt. caussis 2. 6.

⁴⁰⁾ AVICENNA 4. 7. 3. 6.

⁴¹⁾ LORRY l. c. p. 27. — TISSOT *Oeuvres* T. XII. p. 72.

⁴²⁾ Hinc inde prurigo futurum indicat icterum.

⁴³⁾ Infantes, potissime qui scalpendi consuetudinem contraxerunt,

ac imaginatione ⁴⁴⁾, a vitio arthritico, scorbutico etc. — *Pruriginē partiali* ansam porrigunt, — *ad anum* ascaris vermicularis, sodomia, corpora peregrina deglutiita et ad intestinum rectum perducta ⁴⁵⁾ vel eo intrusa ⁴⁶⁾, haemorrhoides, menstrua suppressa ⁴⁷⁾, vitium arthriticum, — *ad praeputium* neglectus munditiei, secretio materiae acris circa glandem, coitus cum feminis fluore albo acri laborantibus, pili praeputium inter et glandem haerentes, veneris protractum desiderium, — *ad urethram* in maribus angustia canalis, pili intrusi ⁴⁸⁾, calculus vesicae, in feminis abscessus ⁴⁹⁾, vitium cancrosum, fluor albus, in traxerunt, quo primum ei vel tantillum indulgent, mox sine fine scalpere coguntur.

44) A solo pediculi *adspectu* saepe pruritus nascitur universalis.

45) Acum deglutitam post quindecim dies summum anī pruritum excitasse observavi.

46) Sic sutor prope Viennam habitans, vitio sodomiae deditus, mense Julii 1813 tenaculam sex pollices cum dimidio longam, tres pollices latam, ponderis unciarum quinque et drachmarum sex in intestinum rectum sibi introduxit. Quamvis ea jam in regione iliaca perciperetur, et symptomata enteritis praesto fuerint, attamen summa dexteritate tenacula a cl. KERN feliciter extracta est.

47) Pruritus tunc plerumque ad perinaeum extendi solet.

48) TULPIUS obs. lib. II. 42. — A. VOGEL de cognoscendis c. h. affectibus §. 409.

49) Nobilis femina Vilmensis a. 1811. de insigni circa urethrae

in utroque sexu blennorrhoea imminens, lues venerea. — *ad scrotum* equitatio tempore aestivo, sudor copiosus, syphilis, — *ad muliebria* evolutio partium genitalium sub pubertate ⁵⁰⁾, ascaris vermicularis, graviditas, varices, aphthae, cessatio menstruorum et vitium venereum, praecipue sub forma condylomatum ⁵¹⁾. Quaecunque tandem in parte prurigo ex imminente sanatione ulcerum, ex fonticulis ⁵²⁾, ex latente insecto ⁵³⁾, ex applicatione fasciarum oriri potest.

Diagnosis. 5. *Prurigo* a *pruritu* *symptomatico* ex absentia alterius morbi cutanei distinguitur. WILLAN vocabulum *pruriginis* latiori sensu accipit, ad pruritum scilicet designandum, qui morborum cu-

tis

urethrae orificium conquerebatur pruritu, non sine repetito urinam deponendi dolorifico nisu. Examinata parte affecta, abscessus detectus est, qui ad maturitatem perductus et sponte ruptus, pruritu terminum statuit.

50) PECHLINI obs. 24.

51) Cantatrix a. 1812 intolerabilem ac continuum vaginae accusabat pruritum, omnibus localibus remediis rebellem. Locus affectus minima atque copiosa condylomata exhibuit, quae simul cum pruritu, ope curae universalis antisiphiliticae fugata fuere.

52) Pluries ex fonticulis vehementem partium contiguarum, quin immo semel universi corporis pruritum observavi, ita ut eorum sanationem, etiamsi nolens, suscipere coactus fuero.

53) A cimice sub cutis epidermide diu haerente pruritum describit HAEN (Opusc. inedita. P. I. p. 3).

tis vix definiendorum praecipuum constituit symptoma. At clare tamen idem auctor *psydracium*, *urticariam* et *phthiriasin* sub pruriginis nomine describit, quod magnae rerum confusione ansam porrigere debet. Cavendum autem est, ne vestigia unguium aut instrumentorum, scalpendi gratia admotorum, pro morbo cutaneo habeantur. In genere *accurata partis prurientis autopsia requiritur.*

6. *Prurigo universalis* in aetate juvenili, ma- Prognosis.
lum facile debellandum, at, saepe periodice rediturum, sistit. Non ita in senio, nam pruritus, quem dicunt senilem, nisi a diarrhoea aut ab urinae profluvio, ut vidimus, pro tempore saltem, mitigetur, aut evanescat, morbum terribilem et rebellem constituit. Quosdam econtra inter limites prurigo haec salutaris esse solet. Idem de *prurigine partiali* dicendum est, quae caeterum pro varia caussae indole, varios quoque agnoscit exitus.

7. In juvenibus plethoricis robustisque ho- Cura.
minibus nil certius pruriginem profligat, quam *cucurbitulae scarificantes*, *balneum fluviale*, et abstinencia a cibis aromatibus conditis nec non a liquoribus fermentatis. Eundem effectum quacunque in aetate *hirudines* ad anum, sive ad perinaeum praestant, si pruritus ex haemorrhoidibus vel menstruis suppressis originem duxerit. In prurigine ex *imo ventre* ortum habente, *victus*
modicus,

modicus; blandus; *lacteus* ⁵⁴), *lac* ipsum, sive *asininum*, sive *caprinum*, item *serum lactis* ⁵⁵), *lenia purgantia*, *aquae minerales saponaceae et salinae* potiora praebent auxilia. Pruriginem ex *transpiratione suppressa*, corporis debitum exercitium, *cucurbitulae siccae*, *decocta lignorum* ⁵⁶), *sulphur* et *balnea tepida* debellant. Haec et prurigini ab *immunditie*, praecipue adhibito simul saponem, medentur. Saepe balnea tepida ab initio pruriginem augere ac dein tandem extinguere, non ignorandum est. *Pruritus senilis* victum, quousque leges consuetudinis id ferunt, blandum, nutrientem, gelatinosum, praecipue ex jusculis ranarum, viperarum ac remedia alvi et urinae excretionem excitantia exposcit. Latente vitio scorbutico, *juscula antiscorbutica* ⁵⁷), et *decoctum turionum juniperi communis* prosunt. Si aeger fuerit arthriticus inter remedia generalia, imprimis *extractum stipitum solani dulcamarae*, cum *sapone vel soda* aut *potassa* ⁵⁸), aut *acidum sive sulphuricum*

54) AVICENNA T. I. p. 347. a.

55) GALEN. de simpl. medic. fac. p. 10.

56) §. VI. 28. not. (20).

57) Ibid. 31. not. (25).

58) WILLAN l. c. p. 50. *Natrum depuratum* dispensatorii Londinensis, vel *oleum tartari per deliquium* adhibet; e. c. ter de die a guttis decem ad guttas viginti, in *vasculo decocti cujusdam lignorum*.

icum ⁵⁹⁾, sive *nitricum* ⁶⁰⁾ praescribenda forent. *Externa remedia*, si excipiamus *balnea sulphurica*, pruritus potius adaugent et non nisi caute adhiberi queunt. Veteres quidem ea potissime commendant, at potius adversus morbos *cum* pruritu quam contra legitimam pruriginem. Sunt autem hujusmodi remedia, vel *lotiones* cum *decocto foliorum nicotianae tabaci*, *radicis veratri albi*, *arctiilappae*, *seminum delphinii staphidis agriacae*, *acetato*, *urina* ⁶¹⁾, et lacte, — vel *unctiones* ope *olei*, *cerae*, *mellis* addito sive *sulphure*, sive *opio*. Et applicatio *pellis recentis ovis* ⁶²⁾ tentari meretur. Ita fatus animalis recenter mactati. Nec *ulcera artificialia* praetermitti debent. *Prurigo ani*, nisi ea ab ascaridibus vermicularibus vel ab haemorrhoidibus oriatur, quod in casu ibi *clysteres cum lacte et aloe* ⁶³⁾, hic applicatio *hirudinum* conducunt, caute et non nisi *emollientibus remediis* vel *aceti lotionibus* ⁶⁴⁾ curanda est: alias enim gravissima mala, nec excepta morte improvisa ⁶⁵⁾, sequi possunt.

59) WILLAN l. c.

60) Optimos ab hoc remedio in pruritu senili expertus sum effectus.

61) AVICENNA T. I. p. 330.

62) Idem l. c. p. 373.

63) R. Lactis vaccini libram semis. Aloes hepaticae scrupulum unum. D. S. pro clystere.

64) WILLAN l. c. p. 58.

65) *Memoirs of the medical society*. Vol. 3. p. 348.

sunt. Si lues venerea subesset, cura universalis indicatur. *Prurigo praeputii* munditiem ac lotionem cum *solutione acetatis plumbi* exoscit. — *Prurigo urethrae*, ex angustia hujus canalis, per *candelas* (Bougies) — ex abscessu, per *cataplasmata* — ex materia irritante, per *balnea* — ex vitio cancroso, per *lotiones* cum *decocto herbae malvae*, *hyoscyami nigri* vel *conii maculati*, — ex syphilide, per *curam mercurialem* abigitur. Cura *pruriginis scroti* illi *pruriginis ani* similis est. Praeterea, nisi epidermidis adsit excoriatio, lotiones cum *aqua phagedaenica* laudantur ⁶⁶⁾. *Pruriginem muliebrium* pro re nata cum *balneis tepidis*, *hirudinibus*, *mercurio* curamus.

§. CLXII.

Tactus deletus.

Generatim 1. Sensus tactus saepius in paralysi, in gangraena, in vesaniis deletur. Quoniam autem hic abolitio hujus sensus *secundaria* est, *primaria tactus anaesthesia* ⁶⁷⁾ pro abolitione sensus tactus, superstitibus motu, nutritione et animi facultatibus, definienda est.

Causae. 2. Summum frigus tum externum ⁶⁸⁾, tum inter-

66) R. Mercurii sublimati corrosivi scrupulum semis. Solve in aquae calcis unciiis octo. D. usui externo.

67) Ab α privativo, et ἀσθησις, sensus.

68) Et ante gangraenae formationem membra congelata tactu corbari solent.

internum ⁶⁹⁾ absolutam interdum tactus anaesthesia producit. Idem malum nonnunquam cutim paralyticorum et in locis *non* paralyticis detinet ⁷⁰⁾. Pluries abolitionem tactus a caussa rheumatica conspeximus ⁷¹⁾. Ita a compressione mechanica ⁷²⁾, sive ab extensione ⁷³⁾, potissime a pinguedine, a sero ⁷⁴⁾. De anaesthesia tactus in morbis leprosis saepius mentio injecta est. Anaesthesia tactus adversus stimulos nunc mechanicos, nunc chemicos major animadvertitur. Hinc inde ea simulatur ⁷⁵⁾.

3. Anaesthesiae tactus *cura*, pro varia morbi *Cura*, indole, varia est. Praesente vitio rheumatico acuto, methodum antiphlogisticam, nec *venae sectione*

69) P. I. Vol. I. §. XXII. 2.

70) Aeger (L. B.) paralyti extremitatum inferiorum laborans, utrum temperies cubiculi calida sit sive frigida, non percipit, nec percipit incisionem cutis ad lumbos, fonticulorum gratia factam. Vide REIL's *Fieberlehre* 4. B. p. 56.

71) Observationes nostras huc spectantes publici juris reddidit auditor quondam noster, M. ZUKOWSKI, in Diss. de anaesthesia tactus. Vilnae 1812.

72) Vir ebrius cum per integrum noctis curriculum brachio suo superincumberet, superstite motu, tactum ibi omnino amisit.

73) Sensus pluries in oedemate pedum deletur.

74) BOERHAAVE Comment. Sect. 416. Instit. med.

75) E. c. homo incombustibilis; ii, qui epilepsiam simulant.

ne excepta, praesertim vero *cucurbitulas scarificantes* ad partem affectam utilissimam invenimus. Valde hic nocent unguenta irritantia. Profecto in morbo *vesicatorium* conducit. In malo chronico, *balnea calida*, tum simplicia, tum composita, *frictiones* ac praecipue *electricitas*, forte et *magnetismus* sic dictus *animalis*, commendari merentur.

CAP. XL.

De Polypionia.

§. CLXIII.

Textus cellulosi momentum. Definitio.
Scriptores.

Textus al-
lulosi mo-
mentum. **T**extus cellulosus subcutaneus ob extensionem suam, ob nexum ⁷⁶⁾ et ob consensum ⁷⁷⁾ cum reliquis corporis humani partibus magni est momenti.

76) *Corpora extranea* per universum textum cellulosum sine difficultate migrantia (VOIGTEL op. c. 1. B. p. 78) et *metastases* cellulosae cum singulis partibus, visceribus non exceptis, nexum abunde patefaciunt.

77) BICHAT *anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine.* Paris 1801. T. I. p. 54.

menti, quod jam ex morbis nonnullis hucusque recensitis⁷⁸⁾ elucet, et magis adhuc ex recensendis apparebit. Huc pertinent, utpote proprii textus cellulosi subcutanei morbi, *Polypionia*, *Anasarca*, *Emphysemæ*, et *textus ipsius cellulosi induratio*.

2. Collectio abnormis adipis, potissime in Definitio. textu celluloso cutis et interstitiis musculorum subjacentium, motum corporis aliasque functiones impediens, *polypioniam*⁷⁹⁾ efficit.

3. De hoc morbo legi merentur THIERY⁸⁰⁾, Scriptores. BORDEU⁸¹⁾, LORRY⁸²⁾, JANSEN⁸³⁾, BICHAT⁸⁴⁾, EVERARD HOME *).

O o o

§. CLXIV.

78) Ex doctrina scilicet furunculi, anthracis, erysipelatis.

79) Α πολύ, multum, et πικν, pinguis. *Synonyma*: Polypiotēs, Steatites, Pachytes, Pachysmus, Polysarcia (a GRAEC. πολύ. multum et σαρξ caro. Significat igitur torositatem seu crassitiem musculorum. Vide SWEDIAUER op. c. Vol. II. p. 121), obesitas nimia corpulentia morbosa. GERM. Zu grosse Fettigkeit, Vollleibigkeit. GALL. Corpulence, Obesité. ANGL. Corpulence. Ross. Тучность. POL. Otyłość.

80) An in textu celluloso frequentius morbi et morborum mutationes. Paris. 1757.

81) Von dem schleimigen Gewebe. Wien 1772.

82) Mémoir. de l'Acad. R. de méd. a. 1779. p. 97. Et: Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte. 9. B. p. 222.

83) Physiologische und pathologische Abhandl. von dem thierischen Fette. Hal. 1786.

84) L. c.

*) Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1812.

§. CLXIV.

*Symptomata. Autopsia cadaverum. Analysis
chemica.*

Sympto-
mata gene-
ral.

1. Symptomata polypioniae varia sunt, prout
adeptus universum textum cellulosum adimplet, aut
unam solummodo illius partem occupat.

S. polyp.
universalis

2. In *polypionia universalis* corpus enorme saepe pondus acquirit⁸⁵⁾, flaccidum et pastosum fit, nulla musculorum vestigia exhibet, libero et firmo motui impar evadit. Sub ascensu scalarum, montium, dyspnoea percipitur. In genere magnum, inprimis post cibum assumptum, tum quiescendi, tum dormiendi desiderium occurrit. Sub minimo corporis motu en sudor, ingratum, saepe acidulum, spirans odorem. Haud raro vestes caeruleo sive rubro inde tinguntur colore. Loca sudantia, potissime mammae, hydroam sudamen, et ad plicas cutis erythema intertriginem, exhibent. Urina, inprimis post corporis exercitium, cum ardore, turbida, instar solutionis saponis, excernitur, sedimentum lateritium deponit ac ad superficiem a substantia oleosa, iridis colores exhibente⁸⁶⁾, cooperitur. Polypionia laborantes famem et frigus facilius, quam macilenti ferunt, ac tactu, ut diximus,

85) TULPIUS obs. med. lib. III. cap. LV. p. 269. —

BARTHOLINUS histor. anatom. Cent. III. hist. 88.

T. II. p. 180. — Philosophical Transact. Vol. 47.

p. 183. — VOIGTEL l. c. p. 80.

86) LORRY l. c. p. 266.

mus, imminuto instruuntur. Debilis tum coeundi ⁸⁷⁾, tum generandi facultas observatur.

3. *Polypionia partialis* communis apud femi-P. *partialis*. nas ad mammas, podicem et crura est. Apud mares ea saepe ad abdomen observatur. Hinc inde massae adiposae ad cartilaginem ensiformem ⁸⁸⁾, ad pedem ⁸⁹⁾, aliasque partes *) occurrunt, ne dicamus de steatmate, chirurgiae objecto.

4. Adeps non solum in textu celluloso subcu- Autopsia
taneo, sed et circa viscera aliasque partes e. c. cor, cadaverum
omentum morbose colligitur. Variam is conditionem pro varia aetate et sexu ⁹⁰⁾ exhibet. Polypionia saepe hepatis volumen auctum et serum in cavitatibus extravasatum socia agnoscit. Et in intestino colo massae sebaceae, vulgo *scybala*, inveniuntur **).

5. Adipis optima apud FOURCROY habetur ana- Analysis
lysis chemica ⁹¹⁾. Plurima de hoc argumento me- chemica.
moratu

87) De coitu dolorifico ex polypionia lege Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. I. app. p. 128.

88) MORGAGNI op. c. epist. XIX. 58.

89) LORRY l. c. p. 237.

*) Ueber die angeborne Fetthaut-Geschwülste und andere Bildungsfehler. Von PH. FR. WALTHER. Landshut 1814.

90) LORRY l. c. p. 241.

**) HOME l. c.

91) *Elémens d'histoire naturelle et de chimie. T. 4. p. 341.*

moratu digna jam apud LORRYUM inveniuntur, sapienter praeterea monentem, experimenta, cum adipi in laboratoriis chemicis instituta, vix de illius in homine vivo mutationibus rationem, reddere ⁹²).

§. CLXV.

C a u s s a e.

C. praedis-
ponentes.

1. Polypionia quibusdam familiis propria est. Infantes, feminae, praecipue vero evirati, maxime ad eam dispositi sunt. Et temperamentum, quod phlegmaticum sanguineum vocant, et temperies humida calidaque, et diathesis scrophulosa abnormi pinguedinis collectioni favere solent.

C. excitans.

2. Excitatur, saltem in praedispositis, polypionia, a victu copioso, nutriente, tam animali ⁹³), quam vegetabili ⁹⁴), a potu cerevisiae meracioris, e. c. *porter*, ab animi quiete, inprimis absentibus ira, invidia, amore effraeno, zelotypia ⁹⁵), a somno diu protracto, a defectu motus, a

veneris

⁹²) L. c. p. 253.

⁹³) Laniones fere omnes obesi sunt.

⁹⁴) Ex esu fructuum dactylorum recentium arboris Phoenicis dactyliferi pro solo nutrimento cum potu mellito, feminas Maurorum in Africa circa Senegal intra paucos menses obesitatem acquirere, autoptes asserit (SWEDIAUER l. c. Vol. I, p. 123).

⁹⁵) Tantam animi pathematibus adversus obesitatem

vina

veneris abusu, ab haemorrhagiis aliisque morbis, praesertim febribus, ab usu mercurii, a denegata lactatione, nec non a cohibitis secretionibus habitualibus.

3. Causa proxima polypioniae in nimia adi-^{C.proxima}pis secretionem et in imbecillitate tum vasorum lymphaticorum, tum textus cellulosi quaerenda videtur. Quid verò secretioni, aut forte potius productioni *) illi morbosae ansam porrigat, utrum status inflammatorius, an atonia? arduum est determinare. Processus secretionis morbosae, victus lautus, potius ad statum inflammatorium, — e contra, aetas, sexus, temperies, haemorrhagiae, abusus veneris, labes scrophulosa polypioniae faventes, potius ad conditionem atonicam concludi jubent. Forte pro re nata nunc ille, nunc haec polypioniae fundamentum constituit. In utroque casu hepar **) et testiculi evidenter in hunc morbum influere videntur. Ita et diathesis arthritica, teste inprimis urinarum conditione. Polypioniae partialis causam in laxitate variarum partium quaeri-

vim tribuit LORRY, ut in iis causam quaerat, cur homines, animalium domesticorum instar, haud pingues fieri possint.

*) HOME l. c.

**) „Hinc etiam cum bilis secretionem adipis generatio ita cohaeret, ut obesi fiant, quorum hepar turgescit, utque in saginatis anseribus enormem plerumque jecinoris molem animadvertamus.“ (SPRENGEL l. c. p. 49).

quaerimus. De origine autem steatomatis peculiarem infra exponendam ⁹⁶⁾ habemus opinionem,

§. CLXVI.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

Diagnosis. 1. *Polypionia* neque cum simplici *obesitate* ⁹⁷⁾, utpote functionum exercitio haud obstante, neque cum *conditione torosa musculorum* ⁹⁸⁾ confundi debet. Porro ne collectionem morbosam adipis circa cor, aut in omento pro morbis harum partium habeamus, cavendum est.

Prognosis. 2. Qui *polypionia* detenti sunt, raro longaevitae fruuntur. Praeterea a quocunque alio morbo, nisi corporis volumen sensim sensimque imminuatur, gravius affligi solent. Repentina macilentia in primis mali observatur ominis. Morbi *polypioniae* facile supervenientes sunt vitia organica cordis, scirrhus hepatis, pancreatis, pylori, apoplexia et praecipue hydrops anasarca, qui magnam cum ea affinitatem alit.

Cura. 3. Arduum est vel ingruenti *polypioniae* obstare, saltim quin alii morbo, uti inter vanas urbium matronas saepe nimis accidit, ansa porrigatur. Abstinentia ciborum plerumque malum auget, quod et de motu corporis, nutrimenti majorem

rem

⁹⁶⁾ Cap. XLIV. §. CLXXXIX. 7.

⁹⁷⁾ GALL. Embonpoint.

⁹⁸⁾ POLYSARCIA proprie dicta.

rem copiam sollicitante, constat. Victus! vegetabilis tenuis, vinum subacidulum, potus cofeae, frictiones corporis ⁹⁹⁾, balnea frigida, inprimis martialia, atque remedia *evacuationem alvi* praesertim intestinorum crassorum ^{*}) et urinarum promoventia, ne dicamus de aceto et acido nitrico, potissima adversus polypioniam sistunt auxilia.

CAP. XLI.

De Hydropse anasarca et de Oedemate.

§. CLXVII.

Definitio. Scriptores.

I. Collectio morbosa fluidi seroso — lymphatici *Definitio.*
in textu celluloso subcutaneo, tumorem efficiens mollem, digito prementi cedentem, fovea per aliquod tempus in cute relictæ, cum urina parca, *Hydrops* ¹⁰⁰⁾ nuncupatur *anasarca* ¹⁾. Idem malum

⁹⁹⁾ Antiquissimum hoc in polypionia remedium, adhuc hodie in India adhibetur. (*Bibliothèque Britannique. Sciences et arts. Vol. 44. p. 83*).

^{*}) Hinc *aloës* utilitas.

¹⁰⁰⁾ A GRAEC. ὕδωρ, aqua.

¹⁾ A GRAEC. ἀνά, supra et σὰρξ, caro. *Synonyma. Hydrops*

lum in una solummodo corporis humani parte limitates habens, *oedema* ²⁾ dicitur. Minimus hydropis anasarca gradus *Leucophlegmatia* ³⁾.

Scriptores. 2. Doctrinam hydropis in genere et anasarcae in specie, potissime illustrarunt CAROLUS PISO ⁴⁾, DONALDUS MONRO ⁵⁾, FRANCISCUS MILLMANN ⁶⁾, CAMPER ⁷⁾, LAWRENCE ⁸⁾, MEZLER ⁹⁾, J. P. FRANK ¹⁰⁾, HIRZEL ¹¹⁾, BACHER ¹²⁾ etc.

§. CLXVIII.

drops supra carnem, h. subcutaneus, h. hypodermaticeus PLOUCQUETI, — hydroderma SWEDIAUER. — GERM. *Hautwassersucht*. GALL. *Anasarca*, *oedème*. ANGL. *Anasarca*, *oedematous swelling*. ROSS. подкожная водяная болезнь. POLON. *Nabrzmialsć wodna*.

2) A. GR. Ὠδῆμα, tumor.

3) A. GR. λευκός, albus et φλέγμα, phlegma, pituita.

4) De serosa colluvie.

5) *Von der Wassersucht und ihren besondern Gattungen.*

Leipz. 1777.

6) *Bemerkungen über die Natur und Heilart der Wassersuchten.* Braunschweig 1782.

7) *Diss. de hydrope in collect. opusc. ejusd. Vol. II.*

8) *Diss. de hydrope.* Lond. 1756. *Samml. auserl. Abh. für prakt. Aerzte.* 11. B. 3. St. p. 486.

9) *Von der Wassersucht.* Ulm 1787.

10) *Epit. de curand. hom. morbis. Lib. VI. P. I.* p. 134.

11) *Diss. sistens obs. circa hydrop. maxime anasarca.* Tübing. 1808.

12) *Von der Wassersucht und ihrer Heilart.* Berlin 1781.

§. CLXVIII.

Symptomata. Autopsia cadaverum.

1. Tumor sub cute, prius plerumque extremi-^{S. hydr. anasarca.} tates, praecipue pedes occupat, gradatim ad tibias, dein ad femora et partes genitales ascendit ac tandem per universam corporis superficiem sese extendit, aut, quod rarissime et in hemiplegia solum contigisse legimus ¹³⁾, unum tantum latius detinet. Sunt, quorum facies prima morbi vestigia exhibeat. In nonnullis tumor ab initio mollis cutisque pallida (*Leucophlegmatia* proprie dicta) animadvertuntur; in aliis cutis color haud mutatur. Utroque in casu tumor digito prementi cedit, ac fovea, ocyus serius evanescens, relinquitur. Lente enim fovea incipiente malo sub forma leucophlegmatiae et cito in absoluto hydrope anasarca, multum jam tensa ac elastica reddita cute, evanescit. Progrediente morbo, gravitas membrorum et universi corporis nec non impotentia ad motum percipiuntur, quae singula vespere augeri, mane imminui, quin immo profligari solent. Torpent nervi ac tactus interdum deletur. Haud pauca obstacula sanguinis circulum impediunt, testantibus calore corporis inaequaliter diffuso, et stillicidio cruoris praesertim e naribus. Ad extremum perducto malo, a levissima caussa cutem irritante,

e. c. a

¹³⁾ Ephem. med. phys. nat. cur. in appendice ad annum V. Decad. II. obs. 98. p. 61.

e. c. a decubitu, ab ictu, a linteis rudibus, vel ab ipsa cutis tensione, inflammatio oritur ¹⁴⁾. Non raro serum undique, excepta facie, potissime vero ex pedibus, cruribus et dorso manat ¹⁵⁾, cutisque inflammationem auget. Loca cutis inflammata nunc ecchymomata, nunc phlyctaenas sive vesicas, ad gangraenam pronas, exhibent.

Oedema
capitis.

2. *Oedema capitis*, olim incongrue *hydrocephalus externus* nuncupatum, quod PISO ¹⁶⁾, CAMPER ¹⁷⁾, CALLISEN ¹⁸⁾, LUDWIG ¹⁹⁾ et J. P. FRANK ²⁰⁾ egregie descripsere, tumorem offert ad frontem, palpebras, tempora, verticem et occiput, modo partialem, modo super totum caput, nec excepta, quidquid dicat CALLISEN, infima faciei parte, extensum, aliquando fluctuantem atque subinde transparentem ²¹⁾. *Sedes* fluidi extravasati nunc in ipsa *cellulosa subcutanea*, nunc inter tegumenta *musculosque et galeam aponeuroticam*, nunc

pericra-

14) *Erysipelas* sive potius *erythema oedematodes*.

15) Serum ita a viro, hydrope anasarca affecto depluisse, vidi, ut mihi in cubiculum intranti rivulorum instar obviam veniret.

16) L. c. p. 37. 38.

17) L. c. p. 396.

18) *Wundarzneykunst*. Th. II. p. 378.

19) De hydrope cerebri puerorum. Lips. 1774. Vide BALDINGERI Syllogé opusculor. Vol. V. p. 123.

20) L. c. p. 160.

21) HENRICI REGII prax. med. cap. 13. fol. 57.

pericranium et os calvariae detegitur ²²⁾). Hujus ultimi morbi jam AETIUS ²³⁾ et AEGINETA ²⁴⁾ mentionem injecerunt, docentes: tumorem hic magis tensum magisque circumscriptum esse, digito prementi minus cedere ac plus doloris excitare, quam reliqua capitis oedemata. LUDWIGIUS quidem haec signa a priori desumta esse existimat, at PISONIS ²⁵⁾ casus nostraque experientia ea confirmat.

3. *Oedema scroti* praecipue apud recens natos, in morbis venereis neglectis aut male curatis et post scarlatinam obvenire solet. Pars affecta saepe ita volumine increscit, ut vix inter crura locum inveniat. In pusionibus membranae scroti interdum pellucidae fiunt. Et oedematis, *dimidiam* tantum scroti partem occupantis, habetur exemplum ²⁶⁾. Nec *praeputium* ab oedemate immune est, *phymosin* saepe excitante. Oedema scroti.

4. Gravidae octavo et nono gestationis mense *Oedema vulvae* interdum exhibent *oedema*, a CAMPERO ²⁷⁾, Oedema vulvae.

LU-

²²⁾ Docte de hoc argumento SWIETEN egit (Comment. T. III. §. 1217).

²³⁾ Tetrabibl. II. Serm. II. c. 1. p. m. 265.

²⁴⁾ De re medica, lib. VI. c. III. p. m. 235.

²⁵⁾ L. c. p. 39.

²⁶⁾ POTT *Abhandlung von dem Wasserbruche. Uebers. a. d. Engl. von TODE, p. 48.*

²⁷⁾ L. c. p. 518. 519. §. 27.

LUDOWICO ²⁸⁾, ZACUTO LUSITANO ²⁹⁾, HÜNERWOLFIO ³⁰⁾, MELITSCHIO ³¹⁾ aliisque ³²⁾ descriptum, quo in oedemate labia pudenda adeo augmentantur, ut duas vesicas aqua turgida mentiantur, quibus ostium vaginae ita clauditur ut aegrae urinam vix emittere queant, atque foetus exitus occlusus videatur.

Oedema vagum. 5. Oedema interdum ex una in alteram partem migrasse visum est ³³⁾, unde nomen *oedematis vagi* obtinuit.

Autopsia cadaverum 6. Nullum hucusque cadaver hominis, hydropicis anasarca defuncti, secimus, quin aut phthisin pulmonalem, aut suppurationes aliorum viscerum, in primis renum, aut vitia organica cordis vasorumque majorum, aut obstructions, aut scirrhum viscerum abdominalium, sive uteri, inveniremus. Ad systema cutaneum, quod spectat, serum nunc inter cutem atque carnem, nunc inter musculos musculorumque fasciculos ³⁴⁾, nunc in textu celluloso aut viscerum superficiem cooperiente, aut eorum

²⁸⁾ Miscell. nat. cur. Dec. I. an. III. obs. 206. p. 458.

²⁹⁾ De praxi medica mirab. lib. III. obs. 78. p. 113.

³⁰⁾ Misc. nat. cur. Dec. III. an. I. obs. 113. p. 137.

³¹⁾ STARK'S *Archiv für die Geburtshülfe*. 2. B. p. 96.
3. B. p. 427.

³²⁾ VOIGTEL op. c. 3. B. p. 421. not. 35.

³³⁾ HECKER in *Journal der Erfindungen*. 10. St. p. 99.

³⁴⁾ LA MOTTE *Chirurgie complete*. obs. 126.

orum parenchyma constituyente ³⁵⁾ detegitur. In locis affectis patula ex cellula in cellulam via est, quam latex serosus, interdum gelatinae similis, suo pondere sequitur. Epidermis facile a cute secedit. Musculi pallidi fere macerati cernuntur et vasa lymphatica ut plurimum dilatata, liquore extravasato simili repleta ³⁶⁾.

§. CLXIX.

C a u s s a e.

1. Ad hydropem anasarca et hydropem in genere ^{C. praedis-}
^{praedisponunt} : laxa corporis, praecipue systematis ^{ponentes,}
 cutanei, interdum haereditaria ³⁷⁾, structura ³⁸⁾, atmosphaera humida ³⁹⁾, loca uliginosa ⁴⁰⁾, tractus paucus, depravatus ⁴¹⁾, abusus liquorum fermentatorum, morbi praegressi, inprimis febres intermittentes, miliaria, erysipelas, scarlatina, vario-

35) MORGAGNI op. c. Epistol. XXXVIII. 26.

36) WRISBERG de systemate absorb. in Comment. Soc. R. Goett. Vol. IX. ASSALINI *Essay medical sur les vaisseaux lymphatiques*. Turin 1787. p. 43.

37) Quasdam familias prae aliis ad hydropem praedispositas vidi.

38) Anasarca frequentius apud infantes et feminas, quam apud mares occurrit.

39) HIPPOCRATIS de tumoribus liber. Sect. II. v. 31.

40) *Traité des hydropisies ascite et leucophlegmatie, qui regnent dans les marais de la Vendée*. Paris 1804.

41) Anasarca pauperum, rusticorum, militum communem sistit morbum.

variolae, dysenteria, diarrhoea, cholera, scorbutus.

C. excitantes.

2. *Excitatur* h. anasarca et hydrops in generibus a causis supra allatis, diu aut inconsueta vi agentibus, a transpiratione suppressa, ab impetiginibus intempestive fugatis ⁴²⁾, ab animi pathematibus, potissime a terrore ⁴³⁾, a moerore ⁴⁴⁾, ab ira ⁴⁵⁾, a melancholia ⁴⁶⁾, a sanguinis jactura ⁴⁷⁾ ejusque retentione, e. c. a suppressione haemorrhoidum ⁴⁸⁾, lochiorum ⁴⁹⁾, menstruum ⁵⁰⁾, a cohibitis aliis consuetis evacuationibus ⁵¹⁾, ab usu

prae

42) HIRZEL l. c.

43) *Commerc. litter. Noric.* 1743. p. 193.

44) FR. HOFFMANN op. c. Vol. III. c. 14.

45) LUDOLFF *miscell. T. VI. p. 12.* — DE MEZA in *collecti soc. med. Havn. Vol. I.*

46) HAEN *rat. med. P. VI. p. 60.*

47) Quotidiana haec observatio a FORESTO (*Lib. 19. obs. 35. 42.*), FR. HOFFMANNO (*l. c. obs. 3*), RIVERRIO (*obs. commun. 15. p. 556*), SCHENKIO (*obs. lib. 3. obs. 9*), LISTERO (*Exercitat. med. de hydropse, aegra 2.*) etc. confirmatur.

48) *Acta Berolin. Dec. III. Vol. 4.* — HUFELAND *Journal. 22. B. 2. St. p. 123.*

49) *Mémoires de la Soc. R. des Sciences.* 1702. p. 285.

50) Suppressis a frigore menstruis, h. anasarca inde observavi in nosocomio Vindob. an. 1800.

51) Cohibitis sive diarrhoea, sive sudore colliquativo, citissime oedemati crurum ansa porrigitur.

praepostero mercurii ⁵²⁾, arsenici ⁵³⁾, a venenis vegetabilibus ⁵⁴⁾, a suppurationibus, obstructionibus, scirrhis viscerum, a dilatatione vasorum sanguiferorum aliisque obstaculis in functiones arteriarum, venarum, vasorum lymphaticorum et praecipue renum, influentibus ⁵⁵⁾.

3. *Causam proximam* h. anasarca et hydropis C. proxima in genere explicare conati sunt: VAN HELMONT ⁵⁶⁾, HEWSON ⁵⁷⁾, MEZLER ⁵⁸⁾; FORD ⁵⁹⁾, MONRO ⁶⁰⁾, SCHVLZ ⁶¹⁾, HALES ⁶²⁾ aliique, at constat tantum, morbum huiusmodi originem nunc in perversa atque aucta secretione seri, nunc in imminuta vasorum lymphaticorum absorbendi potestate, nunc in impedita lotii secretione, nunc in plurimis simul quaerendam esse, quibus singulis, docen-

52) Eph. N. C. Dec. I. an. I. obs. 30.

53) BANG in collect. Havn. No. 56.

54) GMELIN *Pflanzengifte*. p. 15.

55) Sic CAMPER oedemia scroti recens natorum ex detussatione pedum in utero materno, et oedema vulvae ac crurum in gravidis a compressione venarum saephaenarum et iliacarum derivat.

56) Opp. omn. cap. ignotus hydrops. No. 5.

57) *Experimental inquiries*. part. II.

58) L. c. p. 64 — 66.

59) *Medical communications*. 2. Vol. art. 14. p. 123.

60) L. c. p. 123.

61) Diss. de elasticitatis effectibus. v. HALLERI disp. anat. Vol. III. p. 670.

62) *Haemastatik exp.* 14.

docentibus causis tum praedisponentibus, tum excitantibus, vel impedimenta mechanica, vel diathesis sive atonica, sive rheumatica, sive inflammatoria, vel ipse forte processus inflammatorius, ansam porrigere solent.

§. CLXX.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.

1. *Hydrops anasarca* similitudinem alit cum *cutis turgore*, tum aetati juvenili, praesertim illico post diuturnum somnum proprio, tum obveniente sub animi pathematibus ⁶³⁾, tum ante menstruationem et tempore graviditatis ⁶⁴⁾, nec non cum *emphysemate*. *Oedema* cum *abscessibus*, cum effusione sive *urinae* ⁶⁵⁾, sive *lactis* ⁶⁶⁾, sive *lymphae* *) confundi potest.

Divisio.

2. *Stabilita hydropis anasarca*, vel *oedematis* praesentia, inquirendum est: utrum mala haec, *primaria*, an *secundaria* sint? Si fuerint *secunda-*

63) Turgent mihi uxor, inquit PLAUTUS (Most. III. 2. 10.).

64) J. P. FRANK l. c. p. 136.

65) Ex urina sibi viam ad crus parante hoc, uti in oedemate, tumidum conspexi, quod adstantes in errorem duxerat.

66) HUFELAND's Journal der prakt. Heilkunde. 25. B. 19. St. p. 108.

*) HULL Essay on the phlegmatia alba. 1800.

cundaria, morbi, ex quo pullulant, originem ac indolem determinare restat. Hic solum de hydropo anasarca et oedemate, utpote quae morbum per se constituunt, sermo erit.

3. H. anasarca sive oedema *ex atonia*, post ^{H. anas. et oed. ex atonia.} morbos graves, imprimis post cruoris jacturam, apud homines constitutionis debilis, sub temperie humida, sine febre, locum habere solet. Morbus lente et a pedibus incipiens in altum crescit, aegri aspectus cachecticus est, ac urina, pauca quidem, sed caeterum normalis observatur. Haud raro praeter atoniam indicia diatheseos periodicae, scrophulosae, scorbuticae, arthriticae, spasmodicae etc. occurrunt.

4. Communissimus est h. anasarca *ex diathe-* ^{H. anas. et oed. ex rheumate.} *si rheumatica*. Morbus hic praegressis symptomatibus nunc catarrhalibus, nunc rheumaticis, plerumque derepente oritur, nec facile a pedibus incipit, ac saepe febriculam, imprimis horis vespertinis, sociam agnoscit. Urina non raro rubella, interdum cum grumis sanguineis ad fundum, vel cum sedimento puriformi, observatur. Ad h. anasarca rheumaticum verisimiliter saepe et h. anasarca, erysipelati et scarlatinae succedens, spectat.

5. *Hydr. inflammatorii* existentiam STOLL ⁶⁷⁾ ^{H. a. et oed. ex diath. inflammatoria.} J. P. FRANK

P p 2

67) Ratio medendi Tom. IV. p. 89.

J. P. FRANK ⁶⁸⁾, aliique ⁶⁹⁾, jure statuerunt. In nullo autem hydrope indoles inflammatoria tam saepe quam in hydr. anasarca observatur. Morbus hic homines sexus utriusque, liquoribus fermentatis abutentes, praevia haemorrhoidum sive menstruorum suppressione, aliquando post scarlatinam, aggreditur. Febris quidem raro adest, at pulsus cum plenitudine et vi micat, quae vero pulsum vis non semper ob tumorem brachii arteriam obducentem, rite percipi potest. Interdum epistaxis aut signa inflammationis chronicae viscerum, imprimis pulmonis, occurrunt.

§. CLXXI.

P r o g n o s i s.

Generatim 1. H. anasarca et oedema, prout morbos per se aut aliorum morborum symptomata constituunt, diversam agnoscunt prognosin.

H. anas. et oed. primarium. 2. Cui atonia locum dedit, sive h. anasarca, sive oedemati, illud facillime debellatur, imprimis absente aliarum diathesium complicatione. Neque difficulter curatur h. anasarca, sive oedema, ex diathesi periodica pullulans. Contrarium de h. anasarca sive rheumatico, sive inflammatorio, saltem nisi illico recta adhibeatur medendi ratio, valet.

3. Prog-

68) L. c. p. 324.

69) HIRZEL l. c. — PITT in *Recueil des actes de la Société de santé de Lyon*. T. I, p. 406.

3. Prognosis h. anasarca sive oedematis *sym-*^{II. anas. et}
ptomatici ab indole et gradu morbi primarii dedu-^{oed. secun-}
 citur. *Gravidarum* oedema plerumque, at non
 semper, absoluto partu evanescit. Oedema capitis
recens natorum, dummodo non complicetur cum
 hydrope cerebri, haud semper periculosum est.
 Mali ominis oedema sive h. anasarca, quae suppu-
 rationibus viscerum aut morbis cordis vasorumque
 majorum superveniunt, observatur, praecipue si diu-
 retica auxilium recusent, quo scilicet in casu pro-
 ximum praesagiunt interitum. In morbis arthriti-
 cis et in mania ⁷⁰⁾ modicum pedum oedema ali-
 quando salutare est. Ne vero *subitanea* aquarum
 evacuatio sive per urinam, sive per exulceratio-
 nes, relictæ cute flaccida et membra, ac si aliena
 esset, circumdante, pro bono habeatur signo, ca-
 vendum est. Levamen enim, quod ita affertur
 pro tempore solum locum obtinet, ac plerumque,
 imminentem annuntiat mortem.

§. CLXXII.

Clau. r. a.

1. Qualiscunque sit hydropis anasarca sive oedematis natura ⁷¹⁾, *duae* sese exhibent *indicatio-*^{Indicatio-}
nes, una scilicet fontem morbi destruendi, alte-^{nes.}

ra

70) Hippocr. in Coac. et aphor. V. sect. 3.

71) Haec paragraphus circum circiter *therapiam genera-*
lem hydropum continet.

ra effectus illius abigendi. Occlusa ad illam via, ad hanc conamina restringuntur.

C. morbi
atonici.

2. *H. anasarca ex atonia* victum facilis digestionis, nutrientem et diureticum exposcit e. c. carnes succulentas, assatas, earumque juscula, radices apii petroselini, dauci carotae, scorzonerae humilis, brassicae sive napae, sive rapae, herbas cichorei endiviae, turiones asparagi officinalis etc. Praeterea conducunt *vina*, secretioni urinae faventia, e. c. Rheni, Austriae, Chabli etc. vel *medicata* ⁷²⁾. Potum enim aegrotantibus habita ratione sitis et consuetudinis concedimus, in celeberrima illa quaestione: *utrum hydropicis strenua a potu abstinencia imperanda sit nec ne?* potius HIPPOCRATEM ⁷³⁾, BALLONIUM ⁷⁴⁾, DEL PAPA ⁷⁵⁾, et MILMANNUM ⁷⁶⁾, quam CELSUM ⁷⁷⁾, VAN HELMONT ⁷⁸⁾, MARCELLUM DIGNATUM ⁷⁹⁾ et MON-
ROUM

72) R. Baccarum juniperi communis contusarum uncias tres. Radicis amomi zingiberis unciam unam. Vini albi calidi libras duas cum dimidia stent in digestionem per nychthemeron. Colatura detur.

73) Opp. Edit. CHARTER. Vol. VII. p. 654.

74) Opp. T. III. p. 101.

75) Consultat. medic. T. I. p. 41.

76) L. c.

77) De medicina lib. III. c. 21. No. 33.

78) L. c.

79) De medica historia mirabili. Cap. 21. Lib. IV.

ROUM ⁸⁰⁾ sequentes. *Motus corporis*, in aliis hydropis speciebus commendatus ⁸¹⁾, excepta vectigine et navigatione ⁸²⁾, vix in h. anasarca institui potest. Illum supplent *frictiones* cum pannis laneis, fumo aromatico imbutis ⁸³⁾, leniter tamen, ne tensa inflammetur cutis, institutae. *Oleum* ⁸⁴⁾ nunquam pro frictione adhibuimus. *Temperatura* cubiculi sit potius calida, aerque siccus. Nec debitum *animi regimen* ⁸⁵⁾ negligendum est. Ad *pharmaca* spectant: *bacca juniperi communis* ⁸⁶⁾,
radix

80) L. c. p. 195.

81) HIPPOCRATES l. c. Vol. X. p. 471. — MARCELLUS DONATUS l. c. cap. XXI.

82) HOLLERUS Scholiograph. ad cap. 39. De morbis internis. — FORESTUS lib. IX. obs. 32. p. 377.

83) E. c. ex pulvere thuris, mastichis, succini aa. drachma una. (SWIETEN Comment. T. IV. §. 1235).

84) FORESTUS Lib. IV. Schol. ad obs. 35.

85) Quantum animi pathemata in hydropem influant, Cl. PROCHASKAE observatio docet, utpote qui, cum hydropicam a cataracta liberasset, aegram ex adspectu filiorum tantum expertam esse gaudium testatur, ut urinae, diureticis rebelles, copiose fluerent.

86) Hoc remedium praecipue a SWIETENIO commendatur (l. c. §. 1243). Sub forma tum infusi, tum roob praescribi potest, e. c. R. Roob Juniperi uncias quatuor. Diluantur in infusi sive in aquae destillatae juniperi libris duabus. Adde (nisi aeger valde sensibilis sit) spiritus simplicis juniperi uncias duas. D. S. ter de die vasculum cofeanum semis. — De juniperi in hydrope praestantia lege et Act. Nat. Cur. Dec. I. an.

9 et 10.

radix scillae marinae ⁸⁷⁾, quorum remediorum diuretica virtus, absente diarrhoea, ope *salis medii* ⁸⁸⁾ augetur. Praeterea *complicationum* ratio habenda est. Si *periodici* quid subsit, *cor- tex cinchonae* optimum constituit remedium ⁸⁹⁾. Sic *mars* in chloroticis ⁹⁰⁾. In *scrophulosis*, infarcto inprimis hepate, *mercuro* ⁹¹⁾ locus est. In *scorbuticis* praecipue *radix acori*

9. et 10. obs. 18. p. 63. Dec. II. an. 5. obs. 168. p. 345.

87) R. Radicis scillae, vel extracti ejusdem granum unum; sacchari grana decem. D. S. ter de die pulverem talem cap.

88) E. c. R. Infusi baccharum juniperi libram unam. Nitratis potassae drachmam unam. Oxymellis scillitici unciam unam. M. Vel: R. Supercarbonatis potassae (sal tartari) scrupulum unum. Aceti scillae drachmam unam. Infusi juniperi libram unam. Roob ejusdem unciam unam. — Vel R. Pulveris radices scillae granum unum. Nitratis potassae, supertartratis potassae aa. grana octo. M. Cap. ter de die pulverem talem, superbibendo infusum baccharum juniperi.

89) P. I. Vol. I. §. XXXI. 3. not. 80.

90) E. c. R. Tincturae malatis ferri drachmas duas. Aquae cinnamomi uncias duas. D. S. ter de die cochleari colean. cap. superbibendo infusum baccharum juniperi. Vel: R. Tincturae aethereae martialis Klaprothii drachmas duas. D. S. ter de die gutt. quindecim in vasculo semis infusi juniperi.

91) R. Pulveris calomel. grana sex; — radices scillae grana duodecim. Elaeosacchari cinnamomi drachmas duas. Divide in duodecim partes aequales. S. ter de die pulverem.

acori calami ⁹²⁾ et *acidum nitricum* ⁹³⁾ excellere solent. *Arthriticis* praeter vinum medicatum remedia adversus h. anasarca rheumaticum commendanda, et lenia evacuantia, diureticis nupta ⁹⁴⁾, conducunt. Maxime vero *spasmorum*, in h. anasarca influentium, ratio habenda est, quorum indicia dum animadvertuntur, ad *opium* ⁹⁵⁾, *digitalem purpuream* ⁹⁶⁾, *aetherem nitricum alcoholisatum* ⁹⁷⁾,
solanum

92) R. Radicis-acori calami uncias duas. Baccarum juniperi uncias quatuor. D. S. species pro infuso parando.

93) P. I. Vol. I. §. LV. 15. not. 33.

94) R. Tincturae rhei aquosae uncias duas, Aquae juniperi uncias quatuor. Syrupi zingiberis unciam semis. D. S. Omni tertia hora cochlearia duo majora. Vel R. Extracti rhei aquosi drachmas duas. Extracti Aloes aquosi, extracti scillae marinae aa scrupulum unum. M. f. pilulae No. LX. D. S. ter de die pilulam unam cap. superbibendo infusum ex baccis juniperi et radice zingiberis paratum.

95) R. Pulveris radice scillae scrupulum unum. Opii grana tria. Elaeosacchari macis drachmas tres. D. in XX. pulveres, S. Bis de die cap. pulverem.

96) R. Tincturae digitalis purpureae drachmas duas. D. S. ter de die a gutt. X—XX.

97) R. Aquae juniperi uncias sex. Spiritus nitri dulcis scrupulum unum. Syrupi scillae unciam unam, D. S. Omni tertia hora cochlearia duo majora. Vel: R. Tincturae digitalis purpureae drachmam unam. Spiritus nitri dulcis drachmas duas. M. D. S. ter de die gutt. XXX.

solanum nigrum ⁹⁸⁾, *helleborum nigrum* ⁹⁹⁾, confugiendum est. Praesente inertia viarum urinarum praesertim vesicae, sicuti in senibus contingere solet, *herba rubi chamaemori* excellens suppeditat remedium ¹⁰⁰⁾. Ita *therebinthina*.

C. morbi
rheumati-
ci.

3. *H. anasarca* sive *oedema rheumaticum* si febrem, notas inflammatorias exhibentem, comitem habeat, instar morbi inflammatorii curandus est. Potissima hic auxilia sunt: *nitras potassae* ¹⁾, *supertartras potassae* ²⁾, *radix ononidis spinosae*

98) Colaturam ex octo foliis solani nigri in libra una aquae fontis fervidae emergentem, CIRILLO summo cum fructu spatio nychthemeri exhibebat Neapoli.

99) Celeberrimae *pilulae* BACHERI virtutem, qua pollent, potissime extracto hellebori nigri debere videntur. Eas cum MILMANNO simplicius sic praescribimus. R. Extracti hellebori nigri — extracti myrrhae aa. unciam semis. Pulveris cardui benedicti drachmas tres. f. pilul. grani unius. Sr. ter de die decem pil. cap.

100) Egregia quidem haec atque in Rossia vulgata herba, praecipue segnem in paralysi vesicam ad contractionem excitat atque remedium potius ischuriae, quam diureticum proprie dictum sistit; at sub allata rerum positione, quocunque id demum fiat modo, urinam mirifice movet.

1) Nullibi nitrum vires suas diureticas evidentius exercet, quam in hydrope rheumatico.

2) Aeternae gratiae MENGHINIO, qui usum cremoris tartari in medicinam introduxit, (acta Bononiensia T. IV. p. 260) agenda sunt. Plerumque cum nitro jungi-

sae ³⁾ et *digitalis purpurea* ⁴⁾. Serius ad *antimonium* ⁵⁾, *liquorem acetatis ammoniae* ⁶⁾, roob
sam-

jungimus; R. Pulveris cremoris tartari, nitri aa scrupulum semis. M. cap. ter de die dosin.

3) Exhibetur uncia una radices ad colaturam librae unius cum aqua decocta. Et radices tum *apii petroselini*, tum *asparagi officinalis* simili pacto praescribi queunt, si praesentia febris vel constitutio irritabilis aegri juniperum excludant.

4) *Digitalis purpurea*, de cujus usu generali in hydrope legantur WITHERING (*An account of foxglove*. Birmingham 1785), SIMMONS (*Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte*. 11. B. 1. St. p. 99), LETTSOM (*Memoirs of the medical society of Lond.* Vol. 2. art. 3. p. 145. 176), DARWIN (*Experiments etc.*) in hydrope anasarca longe minus, quam in aliis hydropis speciebus efficax est, ac morem hodiernum, alia praestantiora remedia digitalis caussa negligendi, vehementer reprobamus. Interea nonnunquam hic pulchre ea agit, praecipue aliis remediis juncta. R. Foliorum digitalis purpureae drachmam unam, infunde per dimidiam horam c. s. q. aquae fontis fervidae. Col. librae unius adde liquoris terrae foliatae tartari drachmas tres. Oxymellis scillae unciam unam. M. S. Omni quarta hora cochl. duo majora.

5) Exhibetur granum unum tartari emetici in libra una decocti ononidis. Nec nocet, si vomitus inde moveatur, quem in hydrope anasarca excitare jubent SCHENK (obs. med. rar. libr. VII. lib. III. obs. 5), et BRISBANE (*select cases in the practice of medicine*. Lond. 1772. p. 51).

6) SWIETEN comment. Vol. 4. p. 224.

sambuci nigrae ⁷⁾, *sulphur* ⁸⁾, *pulverem ipecacuanhae cum opio* ⁹⁾ et ad *balnea tum vaporis* ¹⁰⁾, tum *tepida* recurrendum est. Haec ultima praesertim conducunt, si morbus ex impetigine praepostere fugata originem ducat ¹¹⁾. Et *vesicatoriis* caute adhibitis locus est ¹²⁾.

C. morbi
inflammato-
rii.

4. In *h. anasarca inflammatorio*, exemplo HIPPOCRATIS ¹³⁾, AEGINETAE ¹⁴⁾, FR. HOFFMANNI ¹⁵⁾, MONROI ¹⁶⁾, LAWRENCEI ¹⁷⁾, RICHARDI A HAUTESIERK ¹⁸⁾, STOLLII ¹⁹⁾, FRANKII ²⁰⁾ aliorumque, *venam tundimus*. Praeterea tum in *nitate*

7) QUARIN animad. pract. p. 16.

8) Ad drachmam unam cum melle (*Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie*, Vol. 6. et HUFELAND'S *Journal* 4. B. 3. St. p. 202).

9) MUDGES in *medical transactions of London*, Vol. 2.

10) MONRO l. c. p. 83.

11) BANG (*Act. Soc. med. Havn.* Vol. I. p. 24). KAEMPF (*Enchirid. medic.* p. 123).

12) STOLL (*rat. med.* T. 3. p. 306), HIRZEL l. c.

13) De victu acutorum, Sect. 62.

14) Lib. III. c. 48.

15) De hydrope, obs. 9.

16) L. c. p. 48.

17) L. c.

18) *Récueil d'observations de médecine*, Vol. 2, p. 418.

19) L. c.

20) L. c. p. 324.

trate potassae, tum in *digitali purpurea*, tum in *diaceta severa* ²¹⁾ auxilium quaerimus.

5. Quamvis *h. anasarca ex scarlatina* plerum- <sup>E. h. anas.
ex scarla-
tina.</sup> que notas rheumaticas offerat, tamen nonnunquam vel inflammatoriam, vel atonicam induit naturam. Non mirum igitur est, pro re nata hoc in morbo nunc *diapnoica*, nunc *venae sectionem* ²²⁾, nunc *juniperum* ²³⁾, nunc *balnea* ²⁴⁾ profuisse. In genere *decocto radice ononidis spinosae* cum *nitratae potassae* intus, et exterius illinitio *unguenti oxydi mercurii grisei* cum *pulvere foliorum digitalis purpureae*, et *vesicatoriis* ²⁵⁾, mirabili cum eventu utimur.

6. Ne interea quis nimis stricta divisioni no- <sup>Remedia
empirica.</sup> strae *h. anasarcae* adhaereat, rogamus: in morbo enim rebeli, saepe *empirice* tum indicata, tum alia remedia praescribere libet. Nec usum *urinae animalis* e. c. asinorum, ovium, vaccarum, utpote a gravissimis auctoribus tam in hydrope in genere,

21) Jejunia juvasse RUSH testatur. (l. c.).

22) TARGIONI TOZZETTI.

23) Infusum juniperi cum tinctura rhei aquosa et aethere nitrato utiliter adhibuerunt BANG (Act. Hafn. Vol. II. p. 88) et AASKOW (ibid. Vol. III. p. 108).

24) AASKOW l. c.

25) E. c. R. Unguenti mercurialis drachmas duas. Pulveris foliorum digitalis purpureae drachmam unam. M. illiniatur ad magnitudinem nucis avellanae semel, sive bis de die regioni epigastricae.

genere, quam in h. anasarca in specie commendatum²⁶⁾, silentio praetereundum esse censemus.

Auxilia
chirurgica.

7. Irrita diureticorum aliorumque remediorum virtute, licetne sive ad *scarificationes* sive *incisionem* confugere? Favebant huic methodo HIPPOCRATES²⁷⁾, AETIUS²⁸⁾, PROSPER ALPINUS²⁹⁾ aliique³⁰⁾; at rite MEAD³¹⁾, HEISTER³²⁾, BOEHMER³³⁾ et J. P. FRANK³⁴⁾ monent, eam, saltem in h. anasarca, vix aliquid praestare ac saepe nimis gangraenae ansam ponigere.

C.oedemat.
capitis.

8. Felici autem successu in *oedemate capitis*, tum *scarificationes* ope lanceolae institutae, tum *cauterium*

26) AVICENNA Canon. lib. III. fen 14. T. 4. c. 10. — MORGAGNI op. c. epist. XXXIIX. No. 30. — LEMERY *mémoires de l'Académie R. des sciences* a. 1707. — PASTA *Lettera intorno ad alcuni rimedii poco o nulla usati dai medici, ma di molta virtù ed operazione per la cura di diverse ragguardevoli indisposizioni* (Raccolta d'opuscoli scientifici e fisiologici. T. 31. Venez. 1744. p. 312).

27) De locis in homine c. 9.

28) Sermo X. cap. 30.

29) De medicina Aegyptiorum Lib. III. c. 13. p. 102.

30) SWIETEN l. c. §. 1242. — HALLER elem. physiol. T. I. p. 75.

31) Praecepta et monita med. cap. VIII.

32) Chirurg. T. II. Cap. de oedemate.

33) De segura hydropem curandi methodo. Goettingae 1779. p. 4.

34) L. c. p. 419.

cauterium consilio CELSI ³⁵⁾ postico capiti admotum fuisse legimus ³⁶⁾. Cavendum autem est, ne cum oedemate *tumores*, qui a partu laborioso ad cranium foetuum oriri solent, confundamus, quique aperti convulsiones letales post se trahunt, et rite docente ZWINGERO ³⁷⁾, tuto cum sacculis herbis aromaticis repletis foveantur ³⁸⁾.

9. *Oedema scroti recens natorum*, cultrum re-C. oedemat. scroti.
 puens, sive fotum ex herbis aromaticis siccis, sive subfumigia ³⁹⁾, consilio SWIETENII ⁴⁰⁾, panno laneo suscepta ac scroto applicita, exposcit. In adultis vero tumore ad extremum perducto ac spontaneam gangraenam minitante, docente POTT, aquae potius per *punctionem*, quam per incisionem e scroti cellulosa educi possunt.

10. *Gravida oedemate vulvae* affecta variet C. oedemat. vulvae.
 decumbendi rationem oportet. Ad scarificationes

hic

³⁵⁾ Lib. IV. c. 2.

³⁶⁾ LANZWERDII *armamentar. chirurg. obs.* 33. fol. 253.

— CAROLUS PISO *op. c.* p. 39. — J. P. FRANK *l. c.* p. 161. 422.

³⁷⁾ *Paedogatraeica practica. obs.* 3. Basil. 1722.

³⁸⁾ *Mémoires de l'Acad. R. de chirurg.* Vol. V. p. 64.

³⁹⁾ R. Benzoei, olibani, sarcocollae, resinae quajaci aa unciam semis. Camphorae drachmam semis, mastiches unciam unam, salis ammoniaci scrupulos duos. M. f. pulvis, cujus incensi vapor suscipitur.


⁴⁰⁾ L. c. p. 281.

hic confugere inutile est; nam vulnuscula sic inflata illico sanantur. A cataplasmate nullum obtinetur levamen. Caeterum, quamvis id plane impossibile videatur, partus irritato tumore locum nihilominus habet;

C. oede-
mat. pe-
dum.

11. *Oedema pedum* horizontalem crurum positionem, quietem, subfumigia ex baccis juniperi, et, nisi magnum jam acquisiverit volumen, *fascias* exposcit. Interea cauti estote, ne eas in *salutari oedemate* adhibeatis! ⁴¹⁾ *Scarificationibus* tunc tantum locus est, cum oedema ex ulceribus pedum praepostere sanatis originem duxerat.

41) Letales inde secutas esse apoplexias, experientia J. P. FRANK docet.



CAP. XLIII.

De Emphysemate.

§. CLXXIII.

Definitio. Scriptores. Divisio. Autopsia cadaverum.

1. **C**ollectio morbosa sive aëris, sive gaz, in tex. Definitio. tu celluloso cutis, intumescientiam elasticam, sub pressione crepitantem efformans, *emphysema* dicitur ⁴²⁾.

2. Scriptores de pneumato-pathologia in ge-Scriptores. nere, quorum alibi mentio fiet ⁴³⁾, et emphysematis doctrinam illustrarunt. Praeterea huc pertinent OETINGER ⁴⁴⁾, LA LOUETTE ⁴⁵⁾ et TIMMERMANN ⁴⁶⁾.

3. Emphy-

42) Ἐμφυσάω, inflo. *Synon.* Tympanitis universalis, pneumatosi. GERM. *Luftgeschwulst*, *Windsucht unter der Haut*. GALL. *Bouffisure*. ANGL. *Emphysema*. Ross. Воздушная болѣзнь. POLON. *Nadętość*.

43) P. III. Vol. I. cap. de affectionibus flatulentis.

44) De aëre microcosmi factitio. Tubing. 1737. Vid. HALLERI Diss. pract. T. III.

45) *Abhandlungen, welche an die Pariser Academ. d. Wissenschaft. einges. worden. Uebers. v. BEER.* Leipz. 1754.

46) Diss. de emphysemate. Rintel. 1765.

Divisio. 3. *Emphysema in universale et partiale dividitur.*

E. universale. 4. In *emphysemate universali*, cujus stupendum vidimus exemplum, cujusque similia descripserunt G. HUNTER ⁴⁷⁾, HERBIN ⁴⁸⁾, GRIMM ⁴⁹⁾, BAILLIE ⁵⁰⁾ et SWEDIAUER ⁵¹⁾, corpus ad insigne volumen crescit ac percussum tympani madidi instar resonat. Plerumque simul respirandi difficultas cum periculo suffocationis occurrit.

E. partiale. 5. *Emphysema partiale* ad caput ⁵²⁾, ad collum ⁵³⁾, ad pectus ⁵⁴⁾, ad abdomen ⁵⁵⁾, ad tibias ⁵⁶⁾, vel per universum corpus sub forma tumorum elasticorum *vagans* ⁵⁷⁾ observatur.

6. Observa-

47) *Einige medic. chirurg. Bemerkungen. Aus d. Engl.* I. Thl.

48) *Journal de médecine.* T. 50. p. 431.

49) *Nov. act. phys. med. N. C. T. III.* obs. 17.

50) *Transactions of a society of medical and chirurgicall knowledge.* Vol. I. No. 11.

51) *London medical Journal.* Dec. 1781. p. 408.

52) *ACRELL chirurgische Vorfälle.* 1. B. p. 43.

53) J. P. FRANK *Epitome lib. VI. P. I.* p. 50.

54) *Emphysema ad pectus in aegro, qui abscessu pulmonis, extus comparente, ac carie costarum stipato, laborabat, conspexi.*

55) MORGAGNI *epist. XXXVIII.* No. 25.

56) SYDENHAM *Diss. ep.* p. 41.

57) MARCELLUS DONATUS *de medica historia mirabili lib. I. cap. 6.* — FEL. PLATER *praxis. T. III.* p. 259.

— FABR.

6. Observationes MORGAGNII ⁵⁸⁾, VERNEYI ⁵⁹⁾ C. autopsia. et HEISTERI ⁶⁰⁾ docent, dissecta cute, cujus cellulosa septem pollicum interdum exhibet ambitum ⁶¹⁾, serum nullum, at aërem, interdum cum foetore, donec totum corporis volumen subsideat, exire. Saepe vestigia vulnerum, praecipue laryngis et pectoris, fractura et caries costarum, nec non inflammationes et gangraenae deteguntur.

§. CLXXIV.

C a u s s a e.

1. Cellulosa, ubi paucio adipe instructa est, e. C. praedisponentes. gr. ad capitis partem posteriorem, ad latera thoracis, praecipue caussis emphysema excitantibus, aditum concedit.

2. Sunt autem hujusmodi caussae nunc me. C. excitantes. chanicae, nunc aliae. Ad primas spectant, praeter indicata vulnera ⁶²⁾ et fracturas costarum
Q q 2 rum

— FABR. HILDANUS cent. V. obs. 70. — RAULINIUS *des maladies vaporeuses*, p. 221. — DANIEL HOFFMANN *Commerc. literar.* a. 1737. hebd. II. — MORGAGNI l. c. — J. P. FRANK l. c. p. 52.

58) Op. c. ep. XVIII. art. 23. 25.

59) *Mémoires de l'Académie des sciences* 1704.

60) *Medic. chirurg. Wahrnehmungen*.

61) HERBIN l. c.

62) Leve vulnusculum integumentorum calvariae ad emphysema excitandum sufficit. (BOERHAAVE comment.

rum⁶³), earum percussio⁶⁴), pondus magnum capiti impositum⁶⁵), lapsus⁶⁶), luxatio humeri⁶⁷), operationes chirurgicae⁶⁸), labor partus⁶⁹) et tussis efrena⁷⁰). Porro emphysema pro causa et febres epidemicas⁷¹), peste non excepta⁷²), agnoscit, ita febres suppressas⁷³), cynanchen⁷⁴), erysipelas

ment. ad instit. Vol. VI. p. 87). Item vulnera laryngis (VILLARS *cours de chirurgie* Vol. 2. p. 170) et pectoris (BERGER de tympanitide p. 26. — CHESOLDEN *anat. of the human body*. Edit. 6. p. 130).

63) LE DEAN obs. 29.

64) TIMMERMANN l. c.

65) ACRELL l. c.

66) BOERHAAVE l. c.

67) BICHAT in DESSAULT's *ausserl. chirurg. Wahrnehmung*. N. 253.

68) A castratione emphysema describitur apud MONRO (*Essays of a society of Edinbourgh* Vol. 5).

69) SIMMONS (*Medical communications*. Vol. I. art. 4. p. 176) et BLAGDEN (*Medical facts and experiments*. Vol 2).

70) HOLYCKE *Memoirs of the Academie of Boston*. Vol. 2.

71) MECKELS *Neues Archiv der prakt. Arzneykunde*. 1. Th. p. 230. — J. P. FRANK l. c. p. 46.

72) PUGNET *mémoire sur les fièvres pestilentiennes du Levant*.

73) MANNIUS Trip. Heitersbacensis. T. I. Tübing. 1755.

74) SAUVAGES nosol. Vol. II. p. 469.

sipelas ⁷⁵⁾, scarlatinam ⁷⁶⁾, scorbutum ⁷⁷⁾, hysteriam ⁷⁸⁾, gangraenam ⁷⁹⁾, putredinem foetus ⁸⁰⁾ et refrigerationem corporis ⁸¹⁾.

3. Concesso aëris externi aditu in textum cel.C.proxima lulosum, emphysematis, ortus facile ex illius, per majorem temperiem expansione intelligitur. Aliàs morbi origo, nisi ea ex secretionemorbosa fluidi aëriiformis explicari voluerit ⁸²⁾, profunda caligine circumdatur, ad quam dissipandam gaz emphysema constituens, analysi chemicae submittendum, et cum aëre tum in piscium vesica natatoria ⁸³⁾, tum in vasis circulo sanguinis dicatis ⁸⁴⁾ contento, non neglecto

75) THOMANN Ann. Wiceburg. I. p. 176.

76) WENDT Annal. p. 25.

77) *Fränkische Anmerkungen*, 3. B. p. 417.

78) J. P. FRANK l. c. p. 50.

79) HUNTER *medical obs. and. inquir.* Vol. 2. p. 63.

80) *Cases and remarks in surgery.* Lond. 1779. p. 141.

81) HEISTER l. c. — Act. Nat. Cur. Vol. V. obs. 52.

82) HUNTER *Essay upon digestion.* Lond. 1786. BAILLIE l. c. p. 202.

83) FOURCROY *Annales de chimie* Vol. I. p. 47. — GOTTH. FISCHER *Versuche über die Schwimmblase der Fische.* — BIOT, *mémoires de physique et de chimie de la société d'Arceuil.* Vol. I. — RUDOLPHI *entozoorum hist. natural.* T. I. p. 242.

84) LETTRE in *mémoires de l'Academie des sciences* an. 1714. — SIGISMUND RICHTER de tympanitide specimen inaugurale. Argent. 1783. §. 6.

neglecto examine hypothesium circa gaz animale ⁸⁵⁾, comparandus foret. Ipsa forsitan doctrina combustionis spontaneae, de qua infra ⁸⁶⁾, lucem inde accipere posset.

§. CLXXV.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.

1. *Emphysema* ab *hydrope anasarca*, ab aliis tumoribus et ab *inflatione artificiali cellulosa* distinguendum debet.

Distinctio
ab hydrope
anasarca.

2. *Hydrops anasarca*.

- a. Pondus specificum corporis auctum est.
- b. Urina pauca.
- c. Tumor mollis a compressione foveam retinens.
- d. Tumor ab attactu neque resonat neque crepitat.

Emphysema.

- a. Pondus specificum corporis imminutum.
- b. Urina normalis.
- c. Tumor elasticus nullam a compressione foveam retinens.
- d. Tumor ab attactu plus minusve resonat ac evidenter crepitat.

Aliquando *emphysema* cum *hydrope anasarca* complicatur ⁸⁷⁾.

3. Sicuti

⁸⁵⁾ *Essay sur le gaz animal considéré dans les maladies, ou renouvellement de la doctrine de Galien concernant l'esprit flatueux, par VIDAL. Marseilles 1809.*

⁸⁶⁾ §. CLXXIX.

⁸⁷⁾ BAILLIE l. c.

3. Sicuti hydrops anasarca ab emphysemate ^{Distinctio} distinguitur, ita et *oedema* a *tumoribus aëreis*. ^{ab aliis tu-} moribus. Sciendum enim est, hos ultimos aliquando pro *abscessu* ⁸⁸⁾ aut *tumore glandularum* ⁸⁹⁾ habitos fuisse.

4. Non solum animalia domestica, aëre per ^{Distinctio} cellulosa^m introducto, tum ut obesiora videantur ^{ab inflatio-} ^{ne artifi-} ^{ciali.} ⁹⁰⁾, tum ut revera pinguiora evadant ⁹¹⁾, tum ut lactis secretio in iis augeatur ⁹²⁾, inflantur; sed et *mendicantes* hoc artificio *ad morbum simulandum* utuntur ⁹³⁾, ne de Guineensibus illud ad rheumatismum et tabem sanandam usurpantibus ⁹⁴⁾ dicamus, de quibus singulis legatur TIMMERMANN ⁹⁵⁾.

88) LE THULIER obs. med. pract. Paris. 1732.

89) P. III. Vol. I. cap. de struma et bronchocele.

90) HALLER element. physiol. T. I. Sect. 2. p. 12. 13.

91) PLINIUS hist. nat. lib. VIII. c. 64.

92) MAUCHART eph. nat. cur. cent. I. obs. 12.

93) HALLER l. c. — Immensam herniam scrotalem vir vagabundus praetereuntium pietati obtulit, quam inquirens Cl. ECKER, friburgensis chirurgiae professor, per aërem scroto inflatum malitiose simulatam fuisse, agnovit.

94) GALLANDAT medic. Abhandl. zum Gebrauche prakt. Aerzte. p. 20. — TACKENBERG in Act. Soc. Harle-
mensis T. VI. p. 676. — T. VIII. p. 235. — Samml.
äuserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte. 2. B.

95) De emphysemate artificiali. Giesae 1777.

§. CLXXVI.

*Prognosis. Prophylactica.**Cura.*

Prognosis. 1. Emphysema traumaticum, visceribus nobilibus parcens, haud periculosum est, et aliquando, absorpto, uti videtur, per vasa lymphatica aëre ⁹⁶⁾, sponte evanescit, aliàs letale evadit. Emphysema e caussis internis pullulans, prognosin a morbo, cujus symptoma est, desumit, ac nisi partiale sit, funestam plerumque agnoscit significationem.

Prophylactica. 2. Praepeditur emphysema traumaticum, imprimis in capitis, juguli aut pectoris laesionibus, si accessus aëris, quoadusque possibile est, a vulnere avertatur, sique labia vulneris, priusquam ille expressus sit, non coadunentur.

Cura. 3. Aëri incluso sine temporis jactura exitus concedendus est, quod fit, loca tumefacta, crepitantia, incidendo, atque illius expulsionem oppressionis manuum promovendo. Parti incisae cucurbitulae siccae superimponuntur. Quid affusio aquae frigidae hic valere possit, tentandum foret. Urgente suffocationis periculo, consilio HEWSONI ⁹⁷⁾, ad *paracentesin thoracis* confugiendum est, quam operationem GOOCH ⁹⁸⁾ et KE-

LIE

⁹⁶⁾ SOEEMMERRING de morbis vasorum absorbentium.

⁹⁷⁾ *Medical observations*. T. 3. p. 372.

⁹⁸⁾ *Medicinische und chirurgische Bemerkungen*.

LIE 99) feliciter instituerunt. In emphysemate ex
caussa interna remedia indoli morbi primarii ac-
commodanda sunt.

§. CLXXVII.

De Combustione spontanea.

1. Corpus humanum nonnunquam vel spon- Notio.
te, vel admoto modico calore comburi, observa-
tiones DUPONTI ¹⁰⁰⁾, ADOLPHI ¹⁾, MORTIMERI ²⁾,
BIANCHINI ³⁾, SCHRADERI ⁴⁾, MERILLI ⁵⁾, BARTHO-
LINI ⁶⁾, WILMERI ⁷⁾, SCHERFII ^{*}), SWEDIAUE-
RI ⁸⁾, AIME-LAIRII ⁹⁾, SNIADOCKII ¹⁰⁾, aliorum-
que ¹¹⁾ docent.

2. Flamma

99) *Medical and chirurgial observations*. P. 2. p. 425.

100) *Diss. de corporis humani incendiis spontaneis*. Lugd.
Bat. 1736.

1) *Diss. de eructatione flammante*. Lips. 1746.

2) *Philosophical Transactions* 1745. No. 476.

3) *LESKE auserl. Abhandl.* 3. B. p. 209. 226.

4) *Obs. rar. fasc. I.* No. 10.

5) *Journal de médecine*. T. 59. p. 140.

6) *Act. Hafn. I.* obs. 118.

7) *Philosoph. transact.* Vol. 64. No. 35.

*) *KOPF Jahrbücher der Staatsarzneyk.* 5. Jahrg.

8) *Bulletin des séances de la société philomatique.*

9) *Essai sur les combustions humaines produites par un
long abus des liqueurs spiritueuses.* Paris 1800.

10) *O ogniu wszczyniającym się w ciałach żyjących i o ich
pogorzeniu.* *Dziennik Wileński.* T. I. No. 2. p. 70.

11) *Philosophical magazin.* No. 53. — *Commerc. liter.*
Norimb. 1731. *Hamburger Magazin.* 1. B. 3. St.

Phaenomena.

2. Flamma vel ex ore assurgit, vel potissime truncum, non exceptis ossibus, sub maximo foetore in massam cineream convertit. Lintea et plumae vicinae ab igne non attinguntur *).

Caussae.

3. Vetulae abusui alcohol deditae huic malo, in Lithuania aliquando obvenienti, praecipue subijciuntur. Ni fallimur, illius origo in evolutione gaz hydrogenii, forte phosphorati, quaerenda est, cui opinioni, analogia, a nobis combustionem spontaneam inter et oedema stabilita, nititur. Nec desiderantur aliae hypotheses ¹²⁾).

Cura.

4. Lac et potus mucilaginosus commendantur ¹³⁾). In Lithuania vulgus flammam in os mingendo extinguit. Aqua certe incendium potius auget.

*) Contrarium contigisse fertur (*Journ. général de médecine, chir. et pharmacie* 1813. Mars),* ast casus hic nequaquam ad combustionem spontaneam pertinere videtur.

¹²⁾ KOPF Diss. de caussis combustionis spontaneae in corpore humano factae. Jenae 1800.

¹³⁾ SWEDIAUER l. c.

CAP. XLIV.

De Induratione textus cellulosi.

§. CLXXVIII.

Definitio. Scriptores.

1. *Induratio textus cellulosi* ¹⁴⁾ morbum recens *Definitio.*
natorum sistit, apyrecticum, rigore et frigore cutis, digiti impressionem respuentis, insignitum.

2. Memorabilem hunc, nobis vigesies circiter *Scriptores.*
visum morbum, ANDRY ¹⁵⁾ et AUVITY ¹⁶⁾ primum
descripserunt. Secuti sunt MOSCATI ¹⁷⁾, REDDE-

LIEN

14) GALLICE *Endurcissement du tissu cellulaire.* GERM.
Verhärtung des Zellengewebes. Ross. Отвердѣніе
клетчатой плевы. POLON. Stwarduienie skóry.

15) *Histoire de la Soc. R. de médecine de l'an. 1784-85.*
p. 207. Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte.
15. B. p. 604.

16) *Mémoires de la Soc. R. de médecine de l'an. 1787-88.*
p. 328.

17) *Giornale fisico.* 1793. Vide WEIGEL's *Italiänische
Bibliothek.*

LIEN ¹⁸⁾, HORN ¹⁹⁾, LODEMANN ²⁰⁾ atque recentiores de morbis infantum scriptores ²¹⁾.

§. CLXXIX.

Symptomata. Autopsia cadaverum.

Symptomata.

1. Ingruit morbus primo, secundo, rarissime tertio a partu die, cum frigore, primum ad genas, dein ad extremitates tum superiores, tum inferiores sese manifestante, ad regionem pubis progrediente et nonnunquam totum dein corpusculum occupante. Partes affectae impressionem digiti respuunt ac tanquam lignae videntur. Cutis tam arcte partibus subjacentibus adhaeret, ut neque moveri, neque attolli possit. Volumen illius, praesertim in extremitatibus inferioribus, auctum est. Flexio articularum et depressio maxillae inferioris conceditur. Aegrotuli vagitus languidos et flebiles edunt. Thermometrum extrinsecus cuti admotum frigoris praesentiam confirmat, aut saltem temperaturam retinet cubiculi. Color cutis sublividus, exceptis plantis pedum et cruribus, ubi rubellus est, obvenit. Suctio plerumque aegre perficitur.

18) *Samml. kleiner Abhandlungen und Beobachtungen über die Rose und Verhärtung des Zellengewebes neugeborner Kinder.* Lübeck 1802.

19) *Neues Archiv* II. 2. p. 201.

20) HUFELAND's *Journ. d. prakt. Heilkunde.* 1810. 103 St. p. 57.

21) *P. I.* Vol. I. §. IX. 5.

perficitur et multi cum difficultate deglutiunt. Faeces et urina rite, sed in pauca quantitate excernuntur. Pulsus debilis, haud febrilis. Jam tertio sive quarto morbi die maxima aegrotularum pars moritur.

2. Dissecta cute multum seri coagulabilis ob-^{Autopsia}
^{cadaverum}scure flavescentis effluit. Mucus in textu celluloso contentus granulatus et exsiccatus est. Vasa et glandulae lymphaticae tument. Hepar solito majus ac sanguine atro turgidum. Ita et vasa umbilicalia nec non pulmones, qui nunquam praeter modum ab aëre distenti inveniuntur. Ad *cordis* conditionem nemo satis respexisse videtur.

§. CLXXX.

C a u s s a e.

1. Infantes graciles, gemelli atque a matribus ^{C. praedis-}
^{ponentes,}venereis, phthisicis, hydropicis, vel ebrietati de-
ditis, originem ducentes, praecipue indurationi
textus cellulosi obnoxii sunt. Morbus potissime
in orphanotrophis, tempore hyemali et autumnali,
grassatur.

2. Excitari is videtur tum a frigore, cui infan-^{C. excitans.}
tes expositi plus minus subjiciuntur, tum ab aëre
saepe inquinato orphanotrophiorum, tum a nutri-
tionis debitae defectu.

3. *Causa proxima* indurationis textus cellu-^{C. proxima}
losi nunc in praevium erysipelas ²²⁾, nunc in vi-
tium

22) Cap. VI. §. XXIX. 5.

tium leprosum *), nunc in spasmus ²³⁾ locata est. Ad nos quod spectat, eam a *fracto processu oxygenationis sanguinis* **) et *evolutionis caloris animalis* repetimus, ac in hoc morbo affinitatem quandam cum asphyxiis ex intercepto respirationis opere animadvertimus. Debilis enim infantum indurationi textus cellulosi subditorum constitutio, frigus, nutrimentum pravum et aer inquinatus impedire videntur, quominus arduus ille respirationis processus in recens natis debito pacto locum invenire queat, quo posito, facile defectus caloris et morbo coeruleo proprius ***) indeque transitus partium fluidarum, praecipue adipis ²⁴⁾, in statum solidum explicari potest. Autopsia cadaverum hanc nostram *hypothesin* confirmare videtur.

*) ALARD op. c. p. 215. Opinio haec plane a vero aberrare videtur.

23) Textus cellulosi indurationem ad tetanum immerito me olim revocasse (*Reise nach Paris, London*, I. Th. p. 72) fateor, uti videri erit in P. II. Vol. I. cap. de tetano.

**) Aut secundum experimenta ALLENI et PEPYSII ab impedita generatione gaz acidi carbonici.

***) ALLEN BURNS *von einigen der häufigsten und wichtigsten Herzenskrankheiten. Aus d. Engl. Lemgo* 1814.

24) LORRY dixerat: „forte adeps influit in certas indurationes cutis. (I. c. in *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte*. p. 297).

§. CLXXXI.

D i a g n o s i s.

1. *Induratio textus cellulosi* cum erysipellate ^{Generatim} recens natorum et cum *tetano* similitudinem alitque procul dubio morbi hujusmodi saepe in recens natis confunduntur.

2. *Erysipelas r. n.*

a. Tertio, quinto, decimo a partu die invadit.

b. Orditur a genitalibus, a cruribus, nunquam a facie,

c. Doloris indicia ab attactu cutis conspiciuntur.

d. Morbus est febrilis.

Induratio t. c.

Distinctio
ab erysipellate recens
natorum.

a. Primo, secundo, rarissime tertio die et nunquam serius in conspectum venit.

b. Orditur a facie.

c. Nulla doloris indicia ab attactu.

d. Febris nulla.

3. *Indurationem textus cellulosi* cum *aphthis* ^{Complicationes.} et cum *lue venerea* complicari posse, observationes ANDRY ²⁵⁾ et GHELIS ²⁶⁾ docent. Ipse hic auctor et speciem *indurationis textus cellulosi chronici recens natorum*, aperte indolis venereae observasse

25) L. 6.

26) *Salzburger medic. chirurg. Zeitung.* a. 1811.

servasse contendit, qua de re ultiores cl. viri expectamus animadversiones.

Aliae cutis
indurationes.

4. Interea animadvertere juvabit, *cutis indurationem corneam* tum universalem, tum partialem, et certe a morbo nostro plane diversam, jam dudum a REGHELLINI ²⁷⁾, VERBURG ²⁸⁾ aliisque ²⁹⁾ descriptam fuisse.

§. CLXXXII.

Prognosis. Cura.

Prognosis

1. Morbi periculum ex ipsa illius descriptione elucet, atque unum tantummodo infantem salvare potuimus, et iste dein ab opere dentionis e medio ablatus est.

Cura.

2. Balnea tepida ex infuso herbae *salviae officinalis*, vel cum farina *sinapis nigrae*, *vesicatoria* ad crura, lenes frictiones cutis, aquae aromaticae cum nonnullis guttis *liquoris succinatis ammoniacae*, aut *vini antimoniaci HUXHAMI*, clysteres tepidi ex infuso *florum matricariae chamomillae*, cochleare parvum unum alterumve vini, praecipua hujus morbi sistunt auxilia. Alia adhuc remedia, sed plane incassum, tentata fuere, quorum meminit HORN ³⁰⁾. Curam magis ad pulmones dirigendam

27) Osservazioni sopra alcuni casi rari. I.

28) De aneurysmate.

29) Philosoph. transact. Vol. 48. part. 2. p. 580.

30) L. c.

dam esse credimus; at experientia adhuc destitui-
mur.

CAP. XLIV.

De Rheumatismo Acuto.

§. CLXXXIII.

Definitio. Sedes.

1. Febris cum dolore et saepe tumore, aut tra-
ctum musculorum sequente, aut ipsos artuum ar-
ticulos sive periosteum occupante, *rheumatismum*
acutum constituit ³¹⁾.

2. Nulla pars vel fibris muscularibus, vel mus-
culis proprie dictis, vel tendinibus, vel ligamen-
tis, vel periosteo instructa, a rheumatismo acuto
immunis est; aggreditur nempe cranium, cervi-
cem, pectus, abdomen, dorsum, lumbos, coxen-
dicem, humeros, extremitates tum superiores,
tum inferiores, non exceptis eorum articulis at-
que visceribus structuram muscularem exhiben-
tibus.

§. CLXXXIV.

31) Rheumatismus CULLENII et BOERHAAVII. Rheuma-
tismus febricosus SAUVAG. — Rheumatismus calidus,
inflammatorius auctorum. — Arthritis rheumatica
SWEDIAUERI, hunc morbum egregie describentis.

§. CLXXXIV.

*Symptomata. Autopsia cadaverum.*Notio fe-
bris.

1. Quacunque in parte rheumatismus acutus suam figat sedem, constanter *febris* occurrit cum pulsu frequente, pleno, forti, saepe duro, cum calore corporis intenso, siti multa, lingua alba et urina rubra. Febris haec, ab initio fere continens, progressu temporis remittens fit, ac lotium sedimentum copiosum lateritium deponens, nec non sudores, nocturnos inprimis, atque profusos, largitur.

R. a. uni-
versalis.

2. Quamvis rheumatismus acutus plerumque ex una in aliam solummodo vagari soleat partem, attamen aliquando etiam ita musculos et articulos *universi corporis* detinet, ut aeger sub vehementi febre fere immobilis reddatur. Quantam inde miser, inprimis sub inani sese movendi conatu, patiatur, quivis intelligit.

R. a. capi-
tis.

3. Interdum praevia intensa febre, praegressaque rheumatica aliarum partium affectione, aut retrocessis in puerperis miliaribus ³²⁾, atrocissimus dolor capitis, potissime ad musculum temporalem, occipitalem, ad galeam aponevroticam et uti videtur, ad ipsum periosteum extensus, oritur. Tantus inde percipitur cruciatus, ut facies desperationis imaginem prae se ferat ac aeger, sub continuo ejulatu, vitae maledicat, mortisque auxilium imploret. Somnus miserum, ambabus mani-

bus

bus caput volutantem, diu noctuque fugit. Nisi mox ab initio recta adhibeatur medendi ratio, nullum malorum conceditur levamen, donec tertia circiter morbi hebdomade, pulsu magis magisque contracto, spasmi, convulsiones, oris retractio in conspectum veniant, et brevi post sub profuso admodum sudore, sopor, stertor, praevia diuturna agonia, vitae finem imponant.

4. *Rheumatismus cervicis* apyrecticus ^{R. a. cervicis.} solos musculos detinens, levioris momenti malum constituit ³³⁾, secus autem, si cum febre acuta ligamenta et periosteum vertebrarum colli afficiat; hoc enim in casu praeter immanes cruciatus, magna inquietudo, pandiculationes, brachiorum torpor, oscitationes, palpitatio cordis, sputa cruenta, lipothymia et interdum improvisa mors occurrunt.

5. *Rheumatismus acutus musculos thoracis*, ^{R. a. pectoris.} potissime intercostales, vel *periosteum costarum* detinens, vulgo sub nomine *pleuritidis spuriae* obvenit. Insignitur morbus febre continua, dolore sterni, costarum, sedem saepe mutante, decubitus, inspirationem impediens, attactum respiciente et neque tussiendo, neque sternutandi facultatem concedente. Sub debita cura malum spatium septem circiter dierum terminatur.

R r 2

6. Si

33) Torticolli. GERM. *Steifer Hals*. Si caput in unam partem trahitur, *caput obstipum* dicitur.

R. a. abdominis.

6. Si rheumatismus acutus *musculos* tum rectos, tum *obliquos abdominis* corripiat, morbus, vulgo *peritonitis muscularis anterior* dictus ³⁴⁾ oritur. Praeter febrem, dolor fixus et ardens ad quandam abdominis regionem, plerumque circa umbilicum accusatur, qui dolor sub inspiratione, tussi, nisu sive truncum erigendi sive corpus in unum alterumve latus vertendi, vehementer augetur. Aliquando locus dolens tumorem durum, circumscriptum, decursum fibrarum muscularium designantem, exhibet. Aeger libenter flexo antrorsum corpore, retractisque cruribus decumbit. Facies non ita mala, uti observatur in inflammationibus viscerum abdominalium, quarum signa hic deficiunt ³⁵⁾.

R. a. dorsi.

7. Musculi *dorsi* nec non *ligamenta vertebra- rum* haud raro rheumatismo acuto subjiuntur. Aeger primo in casu vehementer febricitat, erectum corporis situm tenere nequit ac de insigni ad dorsum dolore conqueritur, verbo symptomata, ab HIPPOCRATE sub nomine *pleuritidis ad dorsum* ³⁶⁾ et a BALLONIO sub eo *pleuritidis dorsalis* ³⁷⁾ descripta, exhibet. Quo profundior et quo propior mali sedes est medullae spinali, eo graviora signa, inter quae, monente jam HIPPOCRATE, suspiria, respiratio

34) J. P. FRANK Epitom. Vol. II. p. 185.

35) BAGLIVI Praxis medica. Lib. I. opp. p. m. 64.

36) Lib. III. de morbis et lib. II.

37) Opp. omn. med. T. IV. p. 289.

respiratio difficilis, sputaque cruenta observantur.

8. Rheumatismo acuto circa *lumbos* urgente, R. a. lumborum. morbus varia a variis auctoribus nomina obtinuit, e. c. ea *peritonitidis muscularis posterioris, inflammationis musculorum psoae et iliaci interni*, uti videre est apud FORDYCE ³⁸⁾, SCHOENMEZEL ³⁹⁾ et FRANK, eum sequentibus verbis describentem: „dolor ad dorsum, saepius vero infra regionem vesicae urinariae ex uno latere, non tam vehemens in multis, subinde autem, quod ipsimet conspeximus, fortissimus comparet. Hic idem, magis obtusus, aut et stupor per inguen ad femur descendit, quod sine magnis tormentis ab aegrotantibus extendi non potest. Interim nec in urina, nec in alvo excernendis difficultas haeret. Post aliquot dies manifestus ac profundus tumor ad psoae aut iliaci musculorum tractum, ad glandularum inguinalium externa, percipitur tactu ⁴⁰⁾.“

9. Rheumatismus acutus *humerum* detinens, R. a. humeri et coxae. ita dolorem, tumoremque loci affecti et immobilitatem brachii, ac rheumatismus acutus *coxae* (*Ischias febricosum, morbus coxarius febricosus*) dolorem tumoremque coxae et immobilitatem cruris producit. Quamvis febris hic non semper uti

38) *Elements of the practice of physic.* p. 265.

39) TREMELI diss. de musculis psoa et iliaco suppuratis. (Delect. opusc. FRANKII Vol. V).

40) Epit. l. c. p. 186.

in reliquis hujus morbi speciebus urgeat, tamen aeger, diu noctuque somno destitutus ac locum decumbendi haud facile inveniens, multum patitur.

R. a. extre-
mitatum.

10. Communissimus est rheumatismus acutus *extremitatum*, saepe illi humeri et coxae socius, in genere sedem suam saepe mutans. Febre stipatur magna, vires et patientiam aegrorum exhauriente vixque ante tertiam hebdomadam profliganda. Praeterea loca affecta tument, erysipelaceo quasi rubore obducuntur, attactum et motum respuunt et interdum, ut vidimus, vesicis ovi anserini magnitudine, a sero flavo admodum distentis, obsidentur, quibus disruptis cutis secedit, relicta ampla exulceratione. Frequenter miliaria obveniunt. Non raro hypochondria, inprimis hepatis regio, tument et sanguis e naribus manat. Si morbus praecipue antibrachium detineat, tumor inflammatorius cutis interdum impedit, quominus ictus arteriae, sub exploratione pulsuum, rite percipiatur.

R. a. inter-
nus.

11. Et *viscera* vel structuram muscularem habentia, e. c. *lingua, diaphragma, cor*, — vel membranis cum fibris muscularibus instructa e. c. *tubus intestinalis, vesica urinaria*, rheumatismo acuto, aliter autem denominato, aliisque locis describendo, obnoxia sunt. Immo, aliquando symptomata *carditidis* et *diaphragmitidis*, sub curriculum

culo rheumatismi acuti extremitatum, observavimus.

12. Post rheumatismum acutum *capitis*, ve- Autopsia
cadaverum
stigia gangraenae musculi temporalis, materiam puriformem sub galea aponeurotica, inflammationem durae matris et arachnoideae, nec non liquorem extravasatum fere gelatinosum, observavimus. Rheumatismo acuto *cervicis* defuncti hominis cadaver secare haud licuit. *Pleuritidis* sic dictae *spuriæ* effectus abscessus est, qui haud raro tegumenta universalia inter et musculos pectoris, vel inter hos et pleuram locatus invenitur, atque hoc ultimo in casu sacci instar in cavitatem pectoris prominet; cum carie interdum costarum. Praegressa *peritonitide musculari anteriori*, in vagina musculorum rectorum abdominis, materiam puriformem aut sanguinem extravasatum, non sine notis gangraenae, tum musculorum ipsorum, tum peritonei, cum LIETAUDIO ⁴¹⁾, deteximus. Gangraena musculorum gemellorum alio loco a nobis descripta ⁴²⁾ invenitur. Post rheumatismum scapularum, musculi hujus loci sero pingui obducti inveniebantur ⁴³⁾. Maximae autem sunt inflammationis musculorum *psoae* et *iliaci interni* in cadaveribus reliquiae, inveniuntur nempe: quod
pus

41) Hist. anat. med. Vol. I. art. II. obs. 3. art. X. obs. 34r.

42) Acta mea clinica. Vol. III.

43) BONETI sepulcr. anat. lib. II. Sect. 4. obs. 5e.

pus sibi viam parat vel in abdominis cavum, vel exterius ad femur, vel ad externam partem glandularum lymphaticarum inguinis, vel ad lumbos, vel secundum musculorum abdominalium cum crista ossis ilei cohaerentiam, vel ad ipsam pelvim, vel ad perineum. Saepe pus in ossibus vicinis cariem producit. Quacunque autem in parte musculi, sive ex caussa rheumatica, sive ex alia, e. g. traumatica, inflammati fuerint, sectiones cadaverum saepe vel musculorum concretionem inter se ipsos aut cum cute ⁴⁴⁾, vel gelatinam eos obducentem ⁴⁵⁾, vel conversionem substantiae muscularis sive in materiam adipo-ceream ⁴⁶⁾, sive in

massam

44) HALLERI Element. physiol. T. IV. Lib. XI. Sect. I. §. 7.

45) DRELINCOURT apud MORGAGNI op. c. epist. LVII, 16.

46) PALLAS in MAYERS Zoolog. Annalen. 1. B. — *Annales de chimie*. T. 5. p. 154. T. 8. p. 17. *Observations sur le changement de la fibre musculaire en substance graisseuse* par MARTINS in *recueil des actes de la société de santé de Lyon*. T. I. l'an. 6. p. 384. et: *Geist der neuesten med. Litteratur in Frankreich von B. A. ZADIG*. Breslau 1798. 1. St. No. 7. cum animadversionibus HARLESSII in REIL's *Archiv für die Physiologie*. 4. B. 2. St. p. 189. — CRELL *chemische Annalen* 1792, 2. B. p. 322. — 1. B. p. 53. 137.

massam spongiosam ⁴⁷⁾, sive in corpus molle, cerebro simile ^{*)}, exhibent.

§. CLXXXV.

C a u s s a e.

1. Ad rheumatismum acutum *praedisponunt*: C. praedisponentes.
consuetudo corpus nimis velamentis obtegi vicissitudinibusque temperaturae non satis se subijciendi, tempus vernale, autumnale, nec non puerperium.

2. Pro caussis *excitantibus* habentur: refrig. C. excitantes.
ratio subitanea aestuantis corporis vel partis illius, frigus humidum et venti ex septentrione et oriente spirantes. Nec animi pathemata, potissime ira et terror hic silentio praetereunda sunt. Idem dicendum est de bile, de alimentis pravis ⁴⁸⁾, de dysenteria et febribus intermittentibus, praepostere adstringentibus remediis vel cortice profligatis, de sudore habituali manuum, axillarum et pedum incaute suppresso, de ulceribus

47) HALLE in RICHTERS *chirurg. Biblioth.* 10. B. p. 280.
— *Edinburg. medic. Bemerkung.* No. 22.

*) *Harlemer Verhandling.* Deel XVI. 2. St. p. 335. —
Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte. 2. B. p. 286.
— POTT *chirurg. Beobacht.* 2. B. p. 331. — BELL
Lehrbegr. der Wundarzneyk. 5. Th. p. 96. — BAL-
FOUR in *med. observ. and. inquir.* Vol. 4. — KÜHN
in SCHMUCKERS *vermischt. Schrift.* 1. B. p. 345.

48) SWEDIAUR l. c. p. 153.

bus et fonticulis exsiccatis, de miliaribus retropulsis ⁴⁹⁾, de menstruis et haemorrhoidibus retentis.

C. proxima 3. *Caussam* rheumatismi acuti *proximam* in diathesin, sive rheumaticam, sive inflammatoriam sive arthriticam locamus. In genere, rheumatismus acutus nobis est *inflammatio* systematis tum musculorum, tum tendinum, tum ligamentorum, tum membranarum ossa ambientium, tum vaginarum nervorum.

§. CLXXXVI.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.

1. *Rheumatismus acutus cum contusionibus, distorsionibus, et luxationibus, cum morbo trichomatoso et cum inflammationibus viscerum confundi potest.*

Distinctio
a contu-
sionibus
etc.

2. Candida aegri circa morbi originem narratio et inprimis exacta partium affectarum investigatio distinctionem *rheumatismi acuti a contusionibus, distorsionibus et luxationibus* facilem reddunt.

Distinctio
a morbo
trichoma-
toso.

3. Consideratio stirpis et status anterioris aegri, absentia sudoris plicae proprii ⁵⁰⁾, genuinum *rheumatismum acutum a stadio evolutionis plicae, cum quo similitudinem alit, distinguere docent.*

Distinctio
a viscerum
inflammationibus.

4. *Rheumatismus acutus capitis, pectoris et abdominis ab inflammatione cerebri, pulmonum* et

⁴⁹⁾ Cap. III. §. 12.

⁵⁰⁾ Cap. XXXVI. §. CXLIV. 3.

et *viscerum abdominalium* per absentiam signorum hisce morbis propriorum, et per impotentiam vel minimum motum instituendi, distinguitur. Interea complicationem hic latere posse, ex autopsia cadaverum satis elucet.

§. CLXXXVII.

P r o g n o s i s .

1. *Prognosis* rheumatismi acuti, morbi in ge-Generatim nere dolorifici taediosique, a sede, quam sibi eligit, quamque vero facile nunc in bonum, nunc in malum mutat, pendet. Exitus agnoscit sequentes, *resolutionem* scilicet, *suppurationem*, *hydro-pem acutum*, *rigiditatem*, *atrophiam*, *paralysin*, *gangraenam* et *rheumatismum chronicum*.

2. Adhibita *mature* recta medendi ratione, Resolutio rheumatismus acutus, excepto eo extremitatum, spatio paucorum dierum profligari solet. Hic enim irritis omnibus auxiliis, hucusque notis, ad tertiam, quartam et sextam usque protrahitur hebdomadem. Solvitur in genere morbus per sudorem, per urinam non solum sedimento lateritio instructam, sed et copiosam, per haemorrhagiam narium et inprimis per somnum, qui nisi redeat, caeteris signis haud fidendum est.

3. Rheumatismum acutum capitis, pectoris, Suppuratio. abdominis et lumborum saepe *suppuratione* terminari, cadaverum docet autopsia. Verum et ille extremitatum aliquando in suppurationem transit,

it *), quo in casu abscessus, saepe sub aponeurosi latens, difficulter dignoscitur. Si obvius magis fuerit abscessus, id proprium habet, quod tumor a compressione fere evanescat eaque cessante redeat. Pus autem quocumque in casu, si diutius delitescat, ossa vicina facile arrodit. Febris suppurationis, saepe reconditam hic suppurationem patefacit.

Hydropsa-
cutus.

4. Si rheumatismus acutus articulos detineat, facile in eorum cavitatibus, praecipue ad genu, serum exsudat, unde *hydrops articularum*, in peculiari paragrapho infra considerandus, oritur. Sed et praeter hoc in rheumatismo acuto, magna ad *exsudationes* observatur proclivitas, ac interdum *hydrops acutus* praecipue *thoracis*, sub illius curriculo animadvertitur, quod probe notandum est. Aliis denique in locis de collectione seri musculos thoracis et abdominis inter ac pleuram et peritoneum mentio fiet.

Rigiditas.

5. Aliquando vigente rheumatismo acuto, materiae puriformis in textum cellulosum sive in vaginas musculorum deposita, ibi solidescit ac *rigiditati* partis ansam porrigit. Idem in articulis contingere potest, ubi scilicet lympham coagulabilem exsudata, nunc cavitatem replet, nunc variis tumo-

*) In quibusdam constitutionibus annuis rheumatismus acutus magis ad suppurationem proclivis est, quam in aliis. Sic hyeme 1814 ad 1815 inter viginti aegros rheumatismo acuto variarum partium laborantes, quatuordecim exempla abscessus inde orti vidi.

morbus ansam porrigit ⁵¹⁾, nunc pseudomembranas generat, et per has ligamenta inter se morbose jungit; quae singula rigiditatem articulorum aut *anchylosin*, sive *acampsiam* ⁵²⁾ post se trahunt.

6. Alias per hanc ipsam, in telam cellulosa^m, sive in musculorum vaginas depositam et solidesc^{entem} materiam puriformem actio vasorum sanguinis circulo dicatorum et nervorum laeditur, unde partes affectae extenuantur (*atrophia partialis*, *melatrophia*) vel sensu sive motu, sive utrisque simul plus minus orbantur (*paralysis sive paresis partialis*). Atrophia
Paralysis.

7. *Gangraena* rarissime rheumatismum acutum sequitur. Saepius autem, ut cadaverum sectiones docent, carnis muscularis, sive potius textus cellulosi ⁵³⁾ in *materiam adipoceream* contingit conversio, quam metamorphosin pro specie *sphaceli*, sine aëris accessu operati, ac putrefactioni animalium sub aquis similis, habemus ⁵⁴⁾.

8. Accidit aliquando, symptomata rheumatismi ^{R.} chronici^{cus}, praeter dolores, saepe periodicos, evanescere, ac morbum *naturam chronicam* induere.

51) P. I. Vol. I. §. LXXVIII. 4.

52) SWEDIAUER l. c. p. 751.

53) *Histoires des phlegmaties* par BROUSSAIS. Paris 1808. p. 25.

54) J. FRANK'S *Reise nach Paris, London*. 2. Th. p. 353.

§. CXXXVIII.

C u r a.

Antiphlogistica.

1. *Venae sectio* una alterave et copiosa in primo morbi limine instituta, rheumatismum acutum capitis, cervicis, pectoris, abdominis et lumborum miraculi instar auferre vel saltem maxime lenire solet. Minor illius virtus in rheumatismo acuto extremitatum observatur. Utroque in casu multae *hirudines* et *cucurbitulae scarificantes* circa partes affectas conducunt. Porro *temperies* esto modica absitque conatus ille, sanae rationi adversus, sudorem vi pellendi. Citra debitam et commodam partis affectae positionem, nil illi imponendum, omnia enim topica auxilia hic irritant doloresque augment. Interne *nitras potassae* a drachma una ad unciam semis nychthemeri spatio adultis ventriculo non admodum sensili instructis, praecipuum sistit remedium. Alvo obstructa, lenia simul *purgantia antiphlogistica* et *clysteres* adhibentur. *Diaeta* et reliquum *regimen*, uti in caeteris morbis inflammatoriis.

Diapnoica.

2. Solum temperato omnino morbi impetu inflammatorio ad *diapnoica* confugere licet. Inter ea *tartras stibii* et *potassae* excellit. Nec nocet, si vomitus aut alvus inde aliquoties cientur, nam praecipue emesis, aliunde non contraindicata, evidenter hic prodest. Quousque febris viget, a reliquis diapnoicis, praesertim a liquore acetatis

ammo-

ammoniae, a pulvere cephaelidis ipecacuanhae cum opio et magis adhuc a *camphora*, nisi forte, sub pulsu molli, debili, in minima dosi et *nitratu potassae* juncta ⁵⁵⁾, abstinendum est.

3. Praemisso larga manu regimine antiphlogistico *sinapismo* aut *vesicatorio*, pro varia morbi sede sive nuchae, sive pectori, sive abdomini, sive lumbis admoto, locus est. Rheumatismus acutus humeri, coxae et extremitatum unice excipitur, quo scilicet in morbo tum indicata remedia, tum balnea tepida aut effectum destituuntur, aut revera nocent. Remedia externa.

4. Non ita lenia *diuretica*, quae in cura rheumatismi acuti extremitatum, praemissis antiphlogisticis iterum iterumque commendamus. Ipse *nitras potassae*, quo magis urinam movet, eo magis prodesse solet. Vehiculo illi inserviunt *decocta radicis sive ononidis spinosae, sive apii petroselini*, et si febris jam pauca fuerit, *infusum baccarum juniperi communis*. Diuretica.

5. Silentio praeterire nequimus, medicum sagacissimum Londinensem, HUGONEM SMITH, quinquaginta circiter abhinc annis, in rheumatismo acuto extremitatum, ob evidentes exacerbationes et remissiones dolorum, non obstante pulsu frequente, pleno et duro, *decoctum corticis cinchonae*, testante Cinchona.

65) R. Emulsionis amygdalinae libram unam. Camphorae granum unum. Nitri drachmam unam. Syrupi emulsivi unciam unam. M.

stante SWEDIAUER ⁵⁶⁾, felicissimo cum successu adhibuisse. Methodus haec a FORDYCE, FOTHERGILL, HAYGARTH, SAUNDERS et quodammodo a nostra experientia confirmatur, dummodo remissio dolorum evidens sit et urina largum sedimentum lateritium deponat.

C.exituum

6. Abscessus incipiens ope *cataplasmatibus emollientibus* ad maturitatem perducendus est, ac dein praesente periculo, quod pus sibi viam in cavitate pectoris, abdominis et pelvis parare, aut inter musculos sub aponeurosibus proserpere possit, mature, secundum chirurgiae regulas ⁵⁷⁾, aperiri debet. Interdum abscessus inopinate evanescit ⁵⁸⁾. *Exsudatio interna usum diureticorum*, radicis *polygalae senegae* et *muriatis hydrargyri* exposcit. *Rigiditati, atrophiae et paralysi* articularum et membrorum, lenem partium affectarum *flexionem, extensionem, frictionem*, vel simplicem, vel cum *sapone ammoniacali* et *unguento oxydi mercurii grisei*, aut cum *oleo olivarum*, cum *sebo animali*, cum *tinctura cantharidum*, cum *unguento nervino* opponimus. Conducunt porro *fasciae, embrocatio, balnea calida*, praecipue *sulphurea*, *fotus animalis recenter mactati, electricitas, moxa* et similia.

§. CLXXXIX.

56) Op. c. Vol. I. p. 151.

57) JOAN. ABERNETHY *surgical and physiological essay*. Lond. 1793. vers. germ. prodit titulu: *Chirurgische und physiolog. Versuche. Ubers. mit Anmerkung. v. Jo. Dt. BRANDIS*. Leipz. 1791. 1801. 8.

58) Sic in clinico Ticinensi a. 1793, abscessum, capitis infantilis magnitudine ad inguen post psoridem ortum

§. CXCI.

Hydrops articulorum.

1. *Hydrops articulorum* ⁵⁹⁾ est tumor albus, ^{Definitio} mollis, aequabilis, elasticus, impressi digiti vestigium haud retinens, a ligamento capsulari circumscriptus, ex collectione morbosa sive seri, sive synoviae oriens, membri flexionem impediens, cum dolore et quadam, ab initio, fluctuatione.

2. Morbus, de quo agitur, jam HIPPOCRATI ⁶⁰⁾ Historia. notus fuerat. Optime de eo scripsere: GESSCHER ⁶¹⁾, EVERS ⁶²⁾, REIMARUS ⁶³⁾, M. HOFFMANN ⁶⁴⁾, NEBEL ⁶⁵⁾, HAEFFNER ⁶⁶⁾, WARNER ⁶⁷⁾, DESPARS ⁶⁸⁾, SCHLICH-
observavi, qui spatio paucorum dierum, nullo subsequente alio incommodo, sponte evanuit.

59) Hydrarthros. GALL. *La loupe*,

60) Liber de locis in hemine.

61) *Hedendaagsche oeffenende Heelkunde*. Amsterd. 1780.

TODE *Arzneykundige Annalen*. 4. Heft.

62) *Von der Anchylosis*.

63) Diss. de tumore ligamentorum circa articulos. Lugd. Bat. 1757.

64) Diss. de meliceria vel articulorum laesorum inundatione. Altorf. 1650.

65) Diss. de synovia ejusque remediis specificis. Heidelberg. 1741.

66) Diss. de hydrope articulorum (WASSERBERG opuse. minor. fasc. 1. 2. 3).

67) *Chirurg. Vorfälle und Bemerkungen*. Leipz. 1787.

68) Specimen practicum de hydrope peritonei saccato (SANDIFORT Thesaur. Diss. Vol. I. p. 451).

SCHLICHTING ⁶⁹⁾ aliique praesertim inter chirurgos.

Divisio.

3. Hydrops articulorum, aliorum hydropum instar, in *acutum* et *chronicum* dividitur.

H. a. acutus.

4. *Hydrops articulorum acutus* ex praevio rheumatismo acuto nascitur, ac liquido sive seroso, sive puriformi, in cavitatem articuli extravasato, originem debet. Celerrime oritur malum ac maximus est tumor, motum impediens ac saepe summopere dolens. Facile morbus chronicam induit naturam ac phaenomena infra recensenda exhibet.

H. a. chronicus.

5. *Hydrops articulorum chronicus* cum sensatione molesta, stupore et dolore plus minus acuto, aliquando dirissimo, ad articulum orditur, cui tandem tumor superaccedit. Ad genu, frequentissimam hujus morbi sedem, tumor anterieus, patellam quasi coronans, eamque protrudens, conspicitur. Serius tumor ad latera genu major fit atque ligamentum capsulare ita distendit, ut duos tresve pollices supra patellam ille ascendisse sit visus ⁷⁰⁾. Est vero tumor hic albus, elasticus, fere indolens, et nisi ligamenta nimis crassa sint, fluctuationem exhibens ⁷¹⁾. Ad summum perducto malo, cutis et partes vicinae inflammantur,

suppu-

69) Hydrops articuli praegrandis dissectis et ipsis ligamentis siccatus. (Act. phys. med. Vol. 8. obs. 27. p. 69).

70) HAFNER l. c. p. 119.

71) SCHMALZ *seltene medic. und chirurg. Vorfälle*. 1784.

suppurantur, exulcerantur, quo facto cutis plura foramina, articulum circumdantia, exhibet ⁷²⁾. Manat ex iis ichor foetidus varii coloris atque valde acris. Tali tunc pacto tumoris adpectus mutatur, ut pro hydrope articuli non amplius cognosci queat. Pars affecta immobilis, rigida, dolens, inaequalis, magis magisque tumida evadit, atque extenuatur, donec, orto oedemate, cuncta febris hecticae, mortem annuntiantis, signa, accedant. POUTEAU hydropis *coxae* meminit ⁷³⁾, sub quo caput femoris ex acetabulo ab aquis expellebatur, reddito crure affecto duobus digitis altero longiore. Nec desiderantur exempla hydropis articulo- rum tum pedis ⁷⁴⁾, tum manus ⁷⁵⁾.

6. Cellulosa cutis articulum ambientis materia ^{Autopsia} albumini simili repleta est, quae ipsa profunde ^{cadaverum} in partes subjacentes penetrat. Hinc inde cutis abscessuli observantur. Aperta cavitate articuli, cunctae glandulae formam, partibus externis similem exhibent. Cartilagine plane emollitae conspiciuntur. Nec semper deest puris aliquid ⁷⁶⁾. Saepissime autem ossa carie detinentur.

S's 2

7. Ad

72) BELL's *Abhandl. von den Geschwüren und deren Behandlung*. 3. B. S. 284.

73) *Oeuvres posthumes*. 2. Vol.

74) BELL. I. c.

75) HAFNER I. c.

76) ALEX. MONRO *sämmtliche Werke*. p. 115. art. 8.

Caussae.

7. Ad causas hydropis articulorum spectant, praeter rheumatismum acutum, contusio, luxatio, vehemens extensio articuli, praesertim sub genuflexione diuturna, metastasis, post febres ⁷⁷⁾, inprimis puerperales ⁷⁸⁾, post variolas et morbillos, vitium scrophulosum, rhachiticum, venereum, plicosum, arthriticum et herpeticum.

Diagnosis.

8. *Hydrops articuli* ab *oedemate*, a *fungo articuli*, a *bursis mucosis*, ab *abscessu* et ab *aneurysmate* distingui debet. *Oedema* foveas a compressione digiti admittit, nullam offert fluctuationem, ac longe minus, quam hydrops articuli partis affectae motum impedit. *Fungus articuli*, paucis exceptis casibus ⁷⁹⁾, extra articulum positus est, ac speciem tumoris cystici offert. Praeterea ut plurimum a causis externis generatur, indolens est, neque cingit neque attollit rotulam, non fluctuat, attactui resistit, motum minus impedit, quam hydrops et longe diutius absque tanto perfertur incommodo ⁸⁰⁾. *Bursae mucosae*, aliquando enorme volumen

77) MALOET huiusmodi hydropem ad genu in actis Parisiensibus a. 1728 descripsit.

78) Ex hac causa hydropem genu refert SIMSON in Act. Edinb. T. IV.

79) SCHMUCKER *vernuschte Schriften*. 1. B. p. 301. — HEISTER Instit. chirurgiae L. IV. cap. 19. — REHMARUS L. c.

80) CAMPER in *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte*. 16. B. p. 600.

volumen acquirentes ⁸¹⁾, ac in viciniis articulo-
rum positae, ob mobilitatem ab hydrope articuli
distinguuntur. *Abscessus articuli* notas praegres-
sae inflammationis et subsequentis suppurationis
extus manifestat, quod in hydrope articuli, nisi
purulento ac ideo abscessui admodum affine, hand
animadvertitur. *Aneurysma*, praesertim arteriae
cruralis, pluries pro hydrope articuli habitum fuis-
se, docent fasti medici ⁸²⁾. Pulsatio tamen illud
ab hoc evidenter distinguit. Ad ipsam hydropis
articuli *indolem* quod spectat, dividendus est mor-
bus in *idiopathicum* et *symptomaticum*. Ille citis-
sime tumorem cum violentissimis symptomatibus
exhibet, hic autem sensim sensimque increscit.
Species hydropis articularum symptomatici, quae
frequentissime obveniunt, et exacte a BELLIO de-
scribuntur ⁸³⁾, sunt indolis *rheumaticae* et *scro-
phulosae*. Hoc ultimo in casu hydrops articuli
praecipue *spinae ventosae* videtur effectus. Nec
impossibilis foret ortus hydropis articuli ex *hydro-
pe ossium* (HYDROSTEON), quo medulla in serosum
ichorem resolvitur ⁸⁴⁾.

9. *Prognosis* hydropis articularum pro varia Prognosis.
caussa et diuturnitate morbi varia est. Caussae

ex-

81) CAMPER l. c. p. 422. — VOIGTEL. op. c. t. B.
p. 122.

82) *Journal de médecine*. Octob. 1781.

83) L. c.

84) VAN WY *Heelkundige Mengstoffen*. D. II. 1. St.

externae nisi violenter egerint, et si cito succurratur, sanationis spem relinquunt. Rebelles magis affectus causae internae inducunt, inter quas vitium scrophulosum, inprimis spinae ventosae nuptum, quammaxime timendum est. In genere, provento admodum in morbo, ligamentorum incrassatio, erosio, ossium caries, membrorum rigiditas et luxationes, singula artis auxilia, praeter amputationem partis affectae, excludunt, quae autem operatio saepissime a corporis extrema macie et a febre hectica contraindicatur.

Cura.

10. In *hydropse articularum rheumatico*, *cucurbitulae scarificantes* circa et supra tumorem applicatae praecipuum constituunt auxilium, non neglectis interne *nitrato potassae*, *decocto radicis ononidis spinosae* et *potu leniter diaphnetico*. Provectiori in morbo infra tumorem *vesicatorium* ponitur, cujus diuturna sustinenda est suppuratio. Sunt, qui ipsi tumori *vesicatorium* admoveant⁸⁵⁾. Praeterea usui *muriatis hydrargyri* et extracti *aconiti napelli* locus est⁸⁶⁾, exhibito pro potu *decocto radicis smilacis sarsaparillae*. Hisce singulis nil juvantibus, summo cum fructu, consilio MON-

ROI

85) WHITE von Geschwüren. — DANIEL ORRED in *medical commentaries*. Vol. 7. p. 315. — VAN WY I. c.

86) R. Calomel grana sex. Extracti aconiti grana duodecim. Sacchari drachmas duas. M. divid. in duodecim partes. D. S. Bis de die pulverem (adulto).

roi ⁸⁷⁾, speciem *moxae*, (ex gossypio, alcohol imbuto ac flagrante) in quadam distantia parti affectae admotam, in usum duximus. Idem de *linimento ex sapone ammoniacali* et *unguento oxydi mercurii grisei* paratum fatemur, cui *camphorae* portio addi potest ⁸⁸⁾. Interea cavendum, ne huiusmodi remedia cutim nimis irritent. Securius tumori imponitur *emplastrum*, vel *de sapone et cumino*, vel *diachylon* cum *gummatibus*, vel *hydrargyri*, vel *conii maculati*. Irrita et horum remediorum virtute, quid *colophonium* valeat, experiendum est ⁸⁹⁾. Hungariae populi partem affectam *fumo juniperi* exponunt et linteis cum hoc fumigatis perfricant, dein *emplastrum ex gummi-resina heraclei gummiiferi et aceto scillae* paratum im-

87) *On dropsy*. p. 167.

88) R. Linimenti volatilis uncias duas. Unguenti mercurialis unciam semis. Camphorae drachmam unam. M.

89) Sumitur optimum et ex rubro diaphanum colophonium, quod in pulverem teritur. Dein cannabis sicca in nidi avium formam adaptatur et colophonium ad digiti altitudinem superinspergitur, quibus alcohol affunditur, donec satis humectatum fuerit colophonium, sic tumori applicandum. Dum aeger de cataplasmatibus huius siccitate conqueritur, super ipsam partem iterum iterumque alcohol affunditur. Post duas tresve dies mutatur apparatus, et sic ad sanitatem usque. (*Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte*. 9. B. p. 413).

imponunt, quae methodus suffragium SWEDIAUR-
 XI obtinuit ⁹⁰⁾. Lithuaniae incolae sacculos ex
cineribus et sale culinari calide tumori admovent.
Hydrops articulorum scrophulosus nullum reme-
 dium, quod *fonticulo* ad basin tumoris admoto
 diuque relicto aequiparari possit, agnoscit. Inter-
 ne simul remedia scrophulis et rhachiidi accom-
 modata porriguntur, inter quae praecipue *oxy-*
datum hydrargyri et antimonii sulphuratum, extra-
ctum conii maculati, decoctum glandum quercus
roboris tostorum, illudque radicis rubiae tincto-
rum nec non acidum phosphoricum ⁹¹⁾, maxime
 commendanda sunt. *Hydrops articulorum idiopa-*
thicus recens affusionem aquae frigidae, praeci-
 pue cum *acetate plumbi*, vel applicationem *aceti*
 exposcit. Proveciori in morbo fomentum ex her-
 bis aromaticis in vino decoctis et calide applici-
 tum, conduxisse est visum. Item *aqua calcis, so-*
lutio saponis, muria haeleum, embrocatio, prae-
 cipue ope *solutionis muriatis ammoniae* et fots
 cum *luto thermali* ⁹²⁾. Auxilia hujusmodi, nec
 non

90) *London medical Journal* 1781. p. 194. Et: *Samml. auserl. Ahhandl. f. prakt. Aerzte.* 7. B. p. 18.

91) R. Acidi phosphorici drachmam semis. Aquae rubi-
 idaei uncias sex. Syrupi ejusdem unciam unam. M.
 D. S. ter de die cochlear unum majus (e. c. pro in-
 fante sex annorum).

92) ITALICE *i fanghi*.

non *thermae* inprimis *sulphureae* et in hydropo articulorum sive rheumatico, sive scrophuloso, adhiberi queunt. Latenti vitio venereo *mercurius* opponitur. Quodsi vero indicatio morbum per resolutionem sanandi in vanum secuta fuerit, ad *manum chirurgicam* recurrendum foret. Ad haec spectant primum *punctura* sive *sectio articuli*, dummodo (quod raro in scrophulosis sperare licet) ligamenta et ossa adhuc illaesa sint, alias enim, rite animadvertentibus CALLISEN ⁹³), HAFFNER ⁹⁴) et ORRED ⁹⁵) etc., malum ab aëris accessu augmentum capit. Vulnus capsulae articulari influctum per turundas apertum tenetur, ac injectionum ope purificatur. Morbo ad extremum perducto, ac jam jam consumptis ligamentis, capsulis et ossibus, *amputatio membri* super articulum hydropicum, unicum sistit auxilium, neque a macie corporis, neque a febre, neque a sudoribus, neque a diarrhoea colliquativa contraindicatum, immo, monente BELLIO ⁹⁶), aegri tabe laborantes facilius, quam vegeti hanc operationem sustinent. Quid de crudeli, a PARCK proposita

93) *Theoret. und prakt. Arzneykunst.* p. 483.

94) *L. c.* p. 158.

95) *Medical commentaries* Vol. 7, p. 315. — *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte.* 11. B. p. 178.

96) *L. c.* p. 310.

posita ⁹⁷⁾, *separatione articuli sentiendum sit,*
chirurgorum decisioni relinquimus.

97) *An account of a new method of treating diseases of
the joints of the knee and elbow, in a letter to POTT.*
Lond. 1783.

ADDENDA ET EMENDANDA.

P. 7. Not. *) laudatum est BATEMANNI liber de morbis cutaneis, Auctori nondum visus. Dum typis exscribatur haec Auctoris Voluminis I. secunda pars, prodiit versio germanica, a Curtio Sprengelio correctâ, animadversionibusque eruditissimis aucta, sub hocce titulo: *Praktische Darstellung der Hautkrankheiten, nach WILLANS System bearbeitet v. THOM. BATEMAN, Arzt in London. Aus d. Engl. übers. v. ABR. HANEMANN, Arzt in Hamburg. Mit Vorr. u. Anmerk. v. KURT SPRENGEL. Mit 1 illum. Kupf. Halle 1815. 8.*

Pag. 189. Nota 57. Illustr. KREYSSIGII libri eruditi et vere practici titulum p. 84. quidem laudatum, velim repetitum: *Abhandlung über das Scharlachfieber nebst Beschreibung einer sehr böartigen Frieselkrankheit. Leipz. 1802.*

P. 303. commemoratum est opusculum illustris SACCO, qui vaccinationi per totum Italiae regnum ab iis, penes quos tunc temporis summa rerum erat potestas, praepositus erat, vere aureum, quod et in nostram linguam translatum fuit a laudati paulo ante CURT. SPRENGELII filio Guilielmo, optimae spei juvene, et virtutum patris strenuo aemulo, Titulus libri est: LUDW.

SACCO's, *Gener. Directors d. Vaccination im Königr. Italien, u. ersten Arztes am grossen Krankenhause zu Mayland, neue Entdeckungen üb. d. Kuhpocken, die Mauke und die Schaafpocken.* Leipz. 1812. 8. Mit 4 illumin. Kupferpl.

Pag. 553. Not. 31. Erysipelas dedermatosum leg. E. dermatodes, a graeco vocabulo *δερματώδης*, cutaneus.

P. 354. lin. 6. ab ima paginae parte: superoxigenati leg. superoxygenati.

P. 355. Not. 37. graphytes leg. graphites.

P. 357. Not. 40. *πύργος*. Debat abbreviata vox suppleri *πίργος*.

P. 368. paragraphi XCIV. inscriptionem leg.: *Cornua cutanea* etc.

P. 383. lin. 4. ab imae paginae parte leg. *unguis lapsus*.





